

Direction océanographie et dynamique des écosystèmes
Laboratoire Environnement Littoral et Ressources Aquacoles d'Arcachon

Juillet 2014– RST/LER/AR/LER/14.003

lframer

Evaluation de la qualité des zones de production conchylicole

Département de la GIRONDE

Edition 2014



Evaluation de la qualité des zones de production conchylicole

Département de la GIRONDE

Edition 2014

Fiche documentaire

| | | |
|---|--|--|
| Numéro d'identification du rapport : RST/LER/AR/LER/14.003 Diffusion : libre : <input checked="" type="checkbox"/> restreinte : <input type="checkbox"/> interdite : <input type="checkbox"/> | | date de publication : nombre de pages : 50 annexes : 1 bibliographie : Non illustration(s) : Cartes et tableaux langue du rapport : F |
| Validé par : Jean Côme PIQUET, Didier CLAISSE Adresse électronique : littoral.lerar@ifremer.fr Web : http://wwz.ifremer.fr/laboratoire_arcachon | | |
| Titre de l'article : Evaluation de la qualité des zones de production conchylicole. Département de la GIRONDE - Edition 2014. | | |
| Convention Surveillance DGAL Rapport intermédiaire <input type="checkbox"/> Rapport définitif <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Auteur(s) principal(aux) : METEIGNER Claire | Organisme / Direction / Service, laboratoire IFREMER / Océanographie et dynamique des écosystèmes / Laboratoire Environnement Littoral et ressources Aquacoles, Laboratoire d'Arcachon | |
| Collaborateur(s) : outils AURIGE : Ifremer/DYNECO/VIGIES Analyses bactériologiques : Laboratoire LER/PC DE LA TREMBLADE LABSA Prélèvements terrain : I. AUBY F. D'AMICO L. GOURIOU C. METEIGNER H. OGER M. RUMEBE L. RIGOUIN M-P. TOURNAIRE | | |
| Cadre de la recherche : Réseau de contrôle microbiologique REMI et Réseau d'observation de la contamination chimique ROCCH Projets Surveillance Microbiologique : REMI (A050201) - Surveillance Chimique : ROCCH (A050301) | | |
| Résumé Après un rappel des objectifs, du fonctionnement et de la méthode d'interprétation des résultats du réseau de contrôle microbiologique REMI et du réseau de surveillance chimique ROCCH, ce rapport inclut un bilan national et décrit le programme annuel du département de la Gironde. Il présente l'ensemble des résultats obtenus, en particulier l'estimation de la qualité microbiologique et chimique des zones de production de coquillages classées pour la période 2011-2013. La qualité a pu être estimée pour 10 zones de production conchylicole. Suivant les seuils microbiologiques du règlement (CE) n° 854/2004, sur le Bassin d'Arcachon 2 zones suivies sont estimées de qualité A pour le groupe 3, 2 zones suivies sont estimées de qualité B pour le groupe 3 et sont classées de qualité A et 6 zones suivies sont estimées de qualité B pour les groupes 2 et 3. L'étude des tendances met en évidence une diminution de la contamination microbiologique sur 7 points de suivies. L'année 2013 a été marquée par 4 épisodes d'alerte microbiologique de niveau 0, 5 épisodes d'alerte microbiologique de niveau 1 et 1 épisode d'alerte microbiologique de niveau 2. | | |
| Mots-clés : REMI, <i>E. coli</i> , contamination bactériologique des coquillages, ROCCH, contaminants chimiques, milieu marin, classement sanitaire des zones de production, département de la Gironde | | |

Sommaire

| | |
|--|-----------|
| Introduction | 9 |
| 1. Surveillance microbiologique et chimique des zones de production conchylicoles | 11 |
| 1.1. Organisation | 11 |
| 1.2. Principes techniques du REMI | 11 |
| 1.3. Principes techniques du ROCCH | 13 |
| 1.4. Evaluation de la qualité sanitaire d'une zone de production | 14 |
| 1.4.1. Evaluation de la qualité microbiologique | 14 |
| 1.4.2. Evaluation de la qualité chimique..... | 15 |
| 2. Bilan 2013 de la surveillance REMI et ROCCH | 18 |
| 2.1. Bilan de la surveillance sanitaire et des classements de zone | 18 |
| 2.2. REMI | 19 |
| 2.2.1. Bilan de la surveillance en alerte | 19 |
| 2.2.2. Qualité microbiologique des zones conchylicoles..... | 20 |
| 2.2.3. Qualité chimique des zones conchylicoles..... | 20 |
| 3. Les réseaux REMI et ROCCH dans le département de la Gironde | 21 |
| 3.1. Situation de la production dans le département..... | 21 |
| 3.2. Programme de suivi des zones classées..... | 22 |
| 3.3. Bilan de la surveillance..... | 24 |
| 3.3.1. Bilan de la surveillance régulière | 24 |
| 3.3.2. Bilan de la surveillance en alerte | 24 |
| 3.3.3. Bilan des études de zones | 24 |
| 3.4. Présentation des résultats..... | 25 |
| 3.4.1. Coquillages fousseurs..... | 26 |
| 3.4.2. Coquillages non fousseurs..... | 30 |
| 3.5. Evaluation de la qualité des zones classées..... | 42 |
| 4. Discussion | 44 |
| 4.1. Qualité microbiologique..... | 44 |
| 4.1.1. Niveau de qualité | 44 |
| 4.1.2. Evolution de la fréquence d'échantillonnage..... | 44 |
| 4.1.3. Tendances générale | 44 |
| 4.2. Qualité chimique..... | 46 |
| 5. Conclusion | 48 |
| Annexe | 49 |

Introduction

Le milieu littoral est soumis à de multiples sources de contamination d'origine humaine ou animale : eaux usées urbaines, ruissellement des eaux de pluie sur des terrains agricoles, faune sauvage (figure 1). En filtrant l'eau, les coquillages concentrent les microorganismes présents dans l'eau. Aussi, la présence dans les eaux de bactéries ou virus potentiellement pathogènes pour l'homme (*Salmonella*, *Vibrio* spp, Norovirus, virus de l'hépatite A) peut constituer un risque sanitaire lors de la consommation de coquillages (gastro-entérites, hépatites virales).

Il en est de même pour la contamination chimique. Les apports au milieu littoral sont toutefois d'origines plus diverses car il faut ajouter aux activités agricoles (traitements chimiques) et urbaines, les activités industrielles. Le transport des contaminants suit également des voies très diversifiées, depuis les ruissellements, les déversements, les apports fluviaux, jusqu'aux transports atmosphériques sur de très longues distances et aux précipitations (figure 2). Les coquillages accumulent également les contaminants chimiques présents dans le milieu, avec des facteurs de concentration très élevés (phénomènes de bioaccumulation et de bioconcentration). Dans la chaîne trophique, les contaminants chimiques contenus dans les proies sont ingérés et accumulés par les prédateurs. Ce phénomène de bio-amplification est à l'origine des très fortes concentrations pouvant être mesurées dans des prédateurs de fin de chaîne, comme le thon ou certains oiseaux aquatiques.

Créé en 1989, le **REMI**, réseau de contrôle microbiologique des zones de production de coquillages, a pour objet d'effectuer la surveillance sanitaire des zones de production exploitées par les professionnels et classées par l'Administration. Sur la base du dénombrement dans les coquillages vivants des *Escherichia coli* (*E. coli*), bactéries communes du système digestif, recherchées comme indicateurs de contamination fécale, le REMI a pour objectifs :

- d'estimer la qualité microbiologique sur la base des niveaux de contamination des coquillages et de suivre l'évolution de ces niveaux de contamination ;
- de détecter et suivre les épisodes inhabituels de contamination.

Créé en 1974, le **RNO** est devenu le **ROCCH** en 2008. Strictement environnementale au départ, la surveillance a été progressivement adaptée au suivi sanitaire des zones conchylicoles à partir de 2008. Plus de 60 points nouveaux ont été créés et de nouvelles espèces ont été introduites dans la surveillance afin de mieux couvrir les zones de production et les espèces réellement commercialisées. Plusieurs points du RNO historique situés hors zone conchylicole, sont également suivis car situés dans des lieux stratégiques par leur influence sur les zones de production voisines.

Le ROCCH a pour objectifs d'estimer la qualité chimique des coquillages et de suivre l'évolution de leur niveau de contamination. Ces évaluations sont basées sur la mesure des concentrations en métaux (Hg, Cd, Pb), dioxines, PCB DL (PCB de type dioxine), PCB non DL, et HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques). Une présentation de ces différentes substances réglementées figure en annexe.

Le classement et la surveillance microbiologique et chimique des zones de production de coquillages répondent à des exigences réglementaires (Règlement CE n°854/2004, arrêté du 6 novembre 2013).




Figure 1 : Les sources de contamination microbologique



Figure 2 : Les sources de contamination chimique

1. Surveillance microbiologique et chimique des zones de production conchylicoles

1.1. Organisation

La surveillance est mise en œuvre par neuf Laboratoires Environnement Ressources (LER) Ifremer répartis dans 12 implantations (Boulogne, Normandie – Port-en-Bessin, Bretagne Nord - Dinard , Bretagne Occidentale - Concarneau, Morbihan Pays de Loire sites de La Trinité-sur-Mer et Nantes, Pertuis Charentais sites de La Rochelle et La Tremblade, Arcachon, Languedoc Roussillon – Sète, Provence Azur Corse sites Toulon et Bastia). Ils opèrent, en 2013, le suivi sur 385 points REMI et 135 points ROCCH.

Tous les laboratoires sont engagés dans une démarche d'assurance qualité. Pour le REMI, les laboratoires interviennent dans les prélèvements, les analyses, le traitement des données et la diffusion des résultats. Ceux réalisant des analyses de dénombrement des *E. coli* dans les coquillages vivants (quatre LER, laboratoires départementaux ou privés) sont agréés par le Ministère de l'Agriculture et de la Pêche.

Pour le ROCCH les laboratoires réalisent les prélèvements, la préparation des échantillons avant transmission pour analyse à l'Unité "Biogéochimie et Ecotoxicologie" de l'Ifremer à Nantes. Celui-ci est agréé pour la mesure des métaux et sous-traite l'analyse des contaminants organiques au laboratoire national de référence.

Les modalités d'intervention de l'Ifremer dans le cadre du REMI et du ROCCH sont définies dans les documents de prescription.

Les Cahiers ROCCH¹ et REMI² (cahiers des spécifications techniques et méthodologiques) définissent les principes généraux et les modalités pratiques de mise en œuvre opérationnelle de la surveillance sanitaire des zones de production et de reparcage. Ils définissent notamment les stratégies d'échantillonnage (localisation, fréquence de prélèvement), les modalités de réalisation des prélèvements, des analyses, les règles de traitement et de diffusion des données. La bancarisation des données dans la base de données nationale Quadrigé², ainsi que les modalités de contrôle des données avant mise à disposition du public sont définies dans une procédure spécifique.

L'inventaire cartographique des points de prélèvement et des listes des zones classées et surveillées présente les points de prélèvement REMI et ROCCH et les listes des zones classées pour chaque LER par département avec l'indication du classement sanitaire défini par arrêté préfectoral, des points de surveillance, de leur fréquence de prélèvement respective et du coquillage prélevé. L'inventaire cartographique des points de surveillance actif est également disponible sur Envlit : <http://envlit.ifremer.fr/resultats/surval>.

1.2. Principes techniques du REMI

Le REMI s'articule en deux volets : la surveillance régulière et la surveillance en alerte.

- Surveillance régulière des zones classées A, B et C

Les prélèvements de coquillages s'effectuent sur des points pérennes, dont les coordonnées sont définies géographiquement. Ces points sont jugés représentatifs de la contamination dans les zones de production classées (en général un point de suivi est défini par zone classée). Ce point doit être

¹ <http://envlit.ifremer.fr/content/download/81452/559176/version/3/file/DPROCT1B.pdf>

² http://envlit.ifremer.fr/content/download/81153/555588/version/1/file/Cahier_REMI_dpimcsN_2012.pdf

placé de telle sorte qu'il permette la mise en alerte sur la zone : il est donc situé dans un secteur exposé à un risque d'insalubrité dû à un éventuel apport contaminant. L'espèce de coquillage prélevée est définie pour chaque zone classée et suivie. Rappelons ici que sur la base de l'arrêté du 6 novembre 2013³, une zone peut être classée pour 3 groupes de coquillages distincts en regard de leur physiologie :

- groupe 1 : les gastéropodes (filtreurs), échinodermes et tuniciers,
- groupe 2 : les bivalves fouisseurs,
- groupe 3 : les bivalves non fouisseurs.

La fréquence de base du suivi est mensuelle, mais dans certains cas la fréquence peut être bimestrielle. La détermination de la fréquence d'échantillonnage est basée sur une approche statistique de la répartition des résultats acquis durant les trois dernières années calendaires. La fréquence peut être bimestrielle lorsqu'il n'existe pas de risque significatif de conclure à tort sur la qualité de la zone, et inversement, la fréquence est mensuelle lorsqu'il existe un risque significatif de conclure à tort sur la qualité estimée de la zone. La fréquence est par conséquent adaptée au classement, au risque de dégradation épisodique de la qualité sanitaire de la zone classée. L'approche statistique permet d'aboutir à une grille de lecture (tabl. 1) permettant, suivant la moyenne géométrique des résultats obtenus en surveillance régulière pour la zone (x), d'identifier la fréquence de suivi sur la zone.

| | | | | | |
|-----------|---|----|----|-----|-----|
| Qualité | A | AB | B | BC | C |
| x_G | | 13 | 40 | 200 | 750 |
| Fréquence | B | M | B | M | B |

Tableau 1 : Détermination de la fréquence d'échantillonnage en fonction de la qualité de la zone et de la moyenne géométrique (X_G) des résultats.

Si la zone n'est exploitée qu'une partie de l'année (cas notamment des gisements naturels classés administrativement), la fréquence peut être adaptée à la période d'exploitation. Afin que la surveillance puisse être la plus efficace possible, l'administration informe le laboratoire Ifremer des périodes d'ouverture et de fermeture des gisements.

L'évaluation de la contamination, basée sur la recherche des bactéries *Escherichia coli*, est exprimée par le nombre de germes cultivables dans 100 g de chair et de liquide intervalvaire.

Les résultats obtenus sont saisis dans la base de données Quadrige. A l'issue des contrôles qualité, ces données sont mises en ligne et directement téléchargeables depuis le site Ifremer Environnement : <http://envlit.ifremer.fr/resultats/surval> .

- Surveillance en alerte

Organisé en niveaux d'alerte, le dispositif peut être déclenché de façon préventive en cas de risque de contamination (niveau 0), ou en cas de contamination détectée, par exemple en cas de résultat supérieur au seuil d'alerte dans le cadre de la surveillance régulière (niveau 1), et peut être maintenu en cas de contamination persistante (niveau 2). En 2013, les seuils de mise en alerte définis pour chaque classe sont :

- Zone A \geq 230 *E. coli*/100 g CLI
- Zone B \geq 4 600 *E. coli*/100 g CLI
- Zone C \geq 46 000 *E. coli*/100 g CLI

³ Arrêté du 6 novembre 2013 relatif au classement, à la surveillance et à la gestion sanitaire des zones de production et des zones de reparcage des coquillages vivants.

Le déclenchement du dispositif d'alerte (niveau 0 ou 1) se traduit par :

- l'émission immédiate d'un bulletin d'alerte (niveau 0 ou 1) vers une liste définie de destinataires comprenant notamment des administrations (Direction des Pêches Maritimes et de l'Aquaculture, Direction Générale de l'Alimentation, Préfecture, Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM), Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP)), de façon à ce que l'autorité compétente puisse prendre les mesures adaptées en terme de protection de la santé des consommateurs ;
- la réalisation dans les 48 h de prélèvement(s) sur le ou les points de suivi de la zone concernée (sous réserve de possibilité d'accès aux points).

Si le résultat (ou la série de résultats si la zone comporte plusieurs points de suivi) est inférieur(e) au seuil d'alerte, le dispositif d'alerte est levé. S'il est supérieur au seuil et qu'il y a persistance de la contamination (niveau 2), cela se traduit par l'émission immédiate d'un bulletin d'alerte vers une liste définie de destinataires comprenant, en plus des destinataires précédemment cités, des administrations centrales : Direction Générale de la Santé, Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes. La surveillance est renforcée, la fréquence de suivi des points de la zone est hebdomadaire (sous réserve de possibilité d'accès aux points), jusqu'à la levée de l'alerte qui intervient suite à deux séries consécutives de résultat inférieur au seuil d'alerte.

L'efficacité du dispositif d'alerte peut être significativement améliorée par des informations préventives transmises par les partenaires des services administratifs intervenants sur le littoral (Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM), Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP)), ainsi que par les professionnels de la conchyliculture. Il s'agit en particulier de toute information sur des circonstances pouvant conduire à une augmentation du risque sanitaire (rejets polluants, incident sur un réseau d'assainissement, événement météorologique, épidémie constatée ou présumée d'origine coquillière).

1.3. Principes techniques du ROCCH

En matière de chimie, l'emprise géographique des contaminations peut être beaucoup plus large que pour la microbiologie et concerner plusieurs zones de production classées. De même, les évolutions sont plus lentes et ne varient pas significativement d'une année sur l'autre. Par contre, à contamination égale du milieu, les concentrations en polluants chimiques dans les coquillages varient de façon importante en fonction des saisons (en fait, en fonction de leur cycle physiologique et reproductif). Par exemple, cette variation peut atteindre un facteur 2 à 4 entre l'hiver et l'été pour le cadmium dans les huîtres.

Les cinétiques de contamination/décontamination par les contaminants chimiques étant beaucoup plus lentes que pour les micro-organismes ou les phycotoxines (de l'ordre de plusieurs mois), il est primordial de s'assurer que le temps de séjour des coquillages sur le site de prélèvement soit suffisant pour refléter le niveau de contamination de la zone.

Les prélèvements de coquillages s'effectuent sur des points pérennes, dont les coordonnées sont définies géographiquement. Ces points sont jugés représentatifs de la contamination dans les zones de production classées. Après 32 ans de surveillance du milieu marin, l'expérience locale du ROCCH montre que certains points situés hors zone peuvent être représentatifs de la ou les zones voisines.

L'espèce de coquillage prélevée est définie pour chaque point de prélèvement. Sur la base de l'arrêté du 6 novembre 2013, une zone peut être classée pour 3 groupes de coquillages distincts en regard de leur physiologie :

- groupe 1 : les gastéropodes (filtreurs), échinodermes et tuniciers,
- groupe 2 : les bivalves fouisseurs,
- groupe 3 : les bivalves non fouisseurs.

La fréquence de base du suivi est annuelle. La période de prélèvement est le mois de février qui présente généralement les maxima annuels des concentrations en contaminants chimiques.

L'évaluation de la contamination est basée sur la recherche de contaminants chimiques réglementés dans la chair égouttée des coquillages.

Les résultats obtenus sont saisis dans la base de données Quadrigé. A l'issue des contrôles qualité, ces données sont mises en ligne et directement téléchargeables depuis le site Ifremer Environnement : <http://envlit.ifremer.fr/resultats/surval> .

1.4. Evaluation de la qualité sanitaire d'une zone de production

Chaque année, le laboratoire vérifie la conformité des résultats obtenus par rapport au classement de la zone et transmet ces informations à l'Administration.

1.4.1. Evaluation de la qualité microbiologique

L'estimation de la qualité microbiologique de la zone utilise les données acquises en surveillance régulière REMI sur des périodes de trois années consécutives (années calendaires). L'interprétation des données se fait par rapport aux seuils microbiologiques en vigueur (Règlement CE n° 854/2004⁴ complété des dispositions du code rural (figure 3).

Si l'estimation de la qualité ne répond pas aux critères réglementaires pour les zones classées A, B ou C, la qualité est estimée très mauvaise.




Figure 3 : Exigences réglementaires microbiologiques du classement de zone
(Règlement (CE) n° 854/2004, arrêté du 06/11/2013)

⁴ Règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine

1.4.2. Evaluation de la qualité chimique

L'évaluation du niveau de contamination chimique d'une zone est basée sur les concentrations, mesurées en février, des contaminants présentés dans le tableau 2 et présentés en annexe 1. Toutefois, pour des questions de budget, la mesure des contaminants organiques n'est réalisée que sur 16 points sélectionnés. Il est donc possible que le département ici traité ne soit pas concerné.

La méthode d'interprétation des données diffère singulièrement entre, d'un côté, les métaux, les PCB non DL (pas de type dioxine) et les HAP, et, de l'autre, les dioxines et PCB de type dioxine (PCB DL). Pour les premiers les concentrations maximales estimées comme « sans conteste », donc diminuées de l'incertitude élargie⁵, sont simplement comparées au seuil réglementaire. Pour les seconds, un coefficient multiplicateur (TEF) fixé par l'OMS en fonction de la toxicité de la molécule est appliqué à la concentration de chaque substance avant d'en faire la somme (TEQ ou équivalent toxique de l'échantillon). C'est ce TEQ, lui aussi estimé comme « sans conteste », qui doit être comparé aux seuils réglementaires (voir tableaux 2 et 3). Toutes les concentrations et TEQ sont exprimées par rapport au poids frais de chair de mollusque égouttée.

Les zones de production et de reparcage présentant un dépassement des teneurs maximales des contaminants chimiques ne peuvent être classées. Pour être classées A, B, ou C (d'après les critères microbiologiques), les zones classées doivent respecter les critères chimiques indiqués tableau 3.

En cas de dépassement de l'un de ces critères chimiques, l'estimation de la qualité de la zone est « très mauvaise ». En l'absence de dépassement, la qualité estimée sera A, B ou C en fonction des résultats de la microbiologie.

⁵ http://www.optique-ingenieur.org/fr/cours/OPI_fr_M07_C01/co/Grain_OPI_fr_M07_C01_10.html.

Tableau 2 : Liste des contaminants chimiques sur lesquels est basé le classement des zones conchylicoles (Règlement CE n° 1881/2006 modifié par le règlement CE n° 1259/2011).*

| Métaux | mercure, cadmium, plomb | | | |
|-------------------------------|--|----------------|------------------------------|----------------|
| Dioxines | Dibenzo-p-dioxines (PCDD) | TEF (*) | Dibenzofuranes (PCDF) | TEF (*) |
| | 2,3,7,8-TCDD | 1 | 2,3,7,8-TCDF | 0,1 |
| | 1,2,3,7,8-PeCDD | 1 | 1,2,3,7,8-PeCDF | 0,03 |
| | 1,2,3,4,7,8-HxCDD | 0,1 | 2,3,4,7,8-PeCDF | 0,3 |
| | 1,2,3,6,7,8-HxCDD | 0,1 | 1,2,3,4,7,8-HxCDF | 0,1 |
| | 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD | 0,1 | 1,2,3,6,7,8-HxCDF | 0,1 |
| | 1,2,3,4,6,7,8,-HpCDD | 0,01 | 1,2,3,7,8,9-HxCDF | 0,1 |
| | OCDD | 0,0003 | 2,3,4,7,8-HxCDF | 0,1 |
| | | | 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF | 0,01 |
| | | | 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF | 0,01 |
| | | OCDF | 0,0003 | |
| PCB DL | Non-ortho | | Mono-ortho | |
| | PCB 77 | 0,0001 | PCB 105 | 0,00003 |
| | PCB 81 | 0,0003 | PCB 114 | 0,00003 |
| | PCB 126 | 0,1 | PCB 118 | 0,00003 |
| | PCB 169 | 0,03 | PCB 123 | 0,00003 |
| | | | PCB 156 | 0,00003 |
| | | | PCB 157 | 0,00003 |
| | | | PCB 167 | 0,00003 |
| | | | PCB 189 | 0,00003 |
| PCB non DL indicateurs | PCB 28, 52, 101, 138, 153, 180 (pas de TEF) | | | |
| HAP | Benzo(a)pyrène, benz(a)anthracène, benzo(b)fluoranthène, chrysène. | | | |

(*) : **TEF** = TEF-OMS = facteur d'équivalent toxique. Coefficient fixé par l'OMS, proportionnel à la toxicité de la molécule, qui sera appliqué aux concentrations mesurées pour estimer la qualité chimique des zones conchylicoles.

Tableau 3 : Critères chimiques sur lesquels est basé le classement des zones conchylicoles (Règlement CE 1881/2006 modifié par le CE 1259/2011 et le Règlement UE n°835/2011).

| Substances | Seuils |
|---|---|
| | Groupe 2 et 3 (Règlement CE 1881/2006) mg/kg, poids frais |
| Plomb | 1.5 |
| Cadmium | 1.0 |
| Mercure | 0.5 |
| | Produits de la pêche (Règlement CE n°1259/2011) ng/kg, poids frais (*) |
| Equivalents toxiques (TEQ OMS) de la somme des dioxines (PCDD + PCDF) | 3.5 (*) |
| Equivalents toxiques (TEQ OMS) de la somme des dioxines et des PCBdl (PCDD + PCDF + PCBdl) | 6.5 (*) |
| Somme des PCB indicateurs (28, 52, 101, 138, 153, 180) | 75 000 |
| | Mollusques bivalves (Règlement CE n°835/2011) µg/kg poids frais |
| Benzo(a)pyrène | 5.0 |
| Somme de benzo(a)pyrène, benz(a)anthracène, benzo(b)fluoranthène et chrysène | 30.0 |


(*) : Chaque substance concernée est affectée d'un facteur d'équivalent toxique (TEF-OMS) qui est un multiplicateur tenant compte des toxicités relatives des molécules. Le TEQ (équivalent toxique) de l'échantillon est la somme des concentrations des substances de la liste après application des TEF. Cette valeur doit être inférieure aux limites indiquées ici.

2. Bilan 2013 de la surveillance REMI et ROCCH

2.1. Bilan de la surveillance sanitaire et des classements de zone

Au total 504 zones sont classées A, B ou C pour les groupes 1, 2 ou 3. Les zones A représentent 24 % (122 zones) des classements au 31/12/2013, les zones classées B : 66 % (335 zones), les zones classées C : 4 % (18 zones), les zones classées alternativement : 4 % (20 zones) et les zones classées provisoirement : 2 % (9 zones). Onze arrêtés préfectoraux de classement de zone sont parus en 2013 pour les départements du Nord, de la Manche, de l'Ille et Vilaine, de la Vendée, de la Charente-Maritime, de la Gironde, des Pyrénées-Atlantique et de l'Hérault.

Au cours de l'année 2013, la surveillance régulière REMI s'est appuyée sur 385 points de prélèvement qui ont permis d'assurer la surveillance sur 351 zones classées et la surveillance ROCCH s'est appuyée sur 135 points représentatifs de 250 zones classées. La carte 1 précise le nombre de points REMI et ROCCH suivant les aires de compétence géographique des LER.



Carte 1 : Répartition 2013 des points REMI et ROCCH par laboratoire Ifremer

385 points REMI

135 points ROCCH


2.2. REMI

2.2.1. Bilan de la surveillance en alerte

En 2013, 315 alertes REMI ont été déclenchées (carte 2) dont 41 de niveau 2, contre 277 en 2012, dont 42 de niveau 2. En cas d'alerte REMI, l'information immédiate des administrations locales permet la prise de mesures adéquates pour la protection des consommateurs.

Certaines alertes n'ont pu être levées que très tardivement après plusieurs mois de surveillance renforcée (jusqu'à 3 mois de suivi). Ces alertes anormalement longues mettent en exergue l'inadéquation entre le classement sanitaire et la qualité estimée.

Les alertes déclenchées préventivement représentent une part importante (41 %) des alertes. A ces 128 alertes préventives, s'ajoutent les 17 alertes préventives qui ont permis de mettre en évidence une contamination et qui sont donc passées (et comptabilisées) en alerte de niveau 2. Dans le cadre de la surveillance régulière, 146 contaminations ont été détectées et 24 alertes sont passées d'un niveau 1 à un niveau 2 compte tenu de la persistance de la contamination.



Carte 2 : Alertes REMI 2013

Le Languedoc Roussillon occupe toujours la première place en terme de nombre d'alertes déclenchées. Pour ce secteur, les alertes préventives constituent toujours un élément prépondérant, avec 59 alertes niveau 0 sur 83 alertes au total, et dont 10 ont mis en évidence une contamination (alerte niveau 2). Une augmentation très importante du nombre d'alertes est observée en Morbihan –Pays de la Loire.

2.2.2. Qualité microbiologique des zones conchylicoles

Le traitement des données microbiologiques acquises en surveillance régulière sur les trois dernières années calendaires (2011-2013) permet d'estimer la qualité microbiologique des zones par rapport aux critères réglementaires. Au niveau national, la qualité peut être déterminée pour 310 zones disposant de données suffisantes :

- 15 zones présentent une bonne qualité (A),
- 250 zones présentent une qualité moyenne (B),
- 234 zones une mauvaise qualité (C),
- 11 zones une très mauvaise qualité.

Les zones classées pour les fousseurs (groupe 2) présentent des profils de contamination plus dégradés (figure 4).




Figure 4 : Estimation de la qualité microbiologique des zones et répartition suivant le groupe : groupe 2 (bivalves fousseurs) et groupe 3 : bivalves non fousseurs.

2.2.3. Qualité chimique des zones conchylicoles

A l'échelle nationale, les résultats de la surveillance chimique ne montrent que six dépassements des seuils sanitaires pour le groupe 3. Ils sont résumés dans le tableau ci-dessous :


| Substances concernées | Lieu de surveillance (espèce concernée) | Valeur observée (poids frais) | Seuil réglementaire (poids frais) |
|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|
| Cadmium (mg/kg) | Gironde – Pontaillac (huître) | 1.49 | 1.0 |
| | Gironde – La Fosse (huître) | 2.61 | |
| Somme des 4 HAP (µg/kg) | Seine - Cap de la Hève (moule) | 30.55 | 30 |

Il faut toutefois noter que ces dépassements sont observés dans des zones non classées ou classées D : Pontaillac (zone 17.14), La Fosse (zone 33.13), et Cap de la Hève (hors zone). Les contaminations de la Seine par les PCB et les HAP et celles de la Gironde par le cadmium sont bien connues depuis les premiers travaux du ROCCH (ex RNO) en 1979.

3. Les réseaux REMI et ROCCH dans le département de la Gironde

3.1. Situation de la production dans le département

En 2013, l'ostréiculture du Bassin d'Arcachon est pratiquée par 296 entreprises utilisant 680 ha de parcs ostréicoles, pour une production annuelle d'huîtres de taille marchande comprise entre 7 000 et 7 500 t.



Carte 3 : Localisation des concessions conchylicoles sur le bassin d'Arcachon en 2013 (DDTM Gironde).

La pêche professionnelle des palourdes est également pratiquée sur le bassin d'Arcachon (55 licences avec au maximum deux pêcheurs pour chaque licence) avec un prélèvement annuel proche de 500 tonnes. Les stocks de palourdes sont évalués régulièrement⁶.

⁶ http://wwz.ifremer.fr/laboratoire_arcachon/Environnement-et-ressources-vivantes/Ressources-vivantes/La-peche-a-Arcachon

3.2. Programme de suivi des zones classées

Le programme de surveillance des zones conchylicoles classées est détaillé dans les tableaux 4 et 5 pour les coquillages des groupes 2 et 3.

Tableau 4 : Programme de suivi des zones classées pour le groupe 2


| N° de la zone | Nom de la zone | N° et nom des points | Coquillage prélevé | Fréquence de prélèvement 2013 |
|---------------|----------------|-----------------------------|---|-------------------------------|
| 33-11 | Arguin | 087-P-009 Banc d'Arguin sud |  | Mensuelle |
| 33-12 | Intra Bassin | 088-P-016 Les Argiles |  | Bimestrielle |
| | | 088-P-049 La Touze |  | |



Carte 4 : Zones de production du groupe 2

Tableau 5 : Programme de suivi des zones classées pour le groupe 3

| N° de la zone | Nom de la zone | N° et nom des points | Coquillage prélevé | Fréquence de prélèvement 2013 |
|---------------|----------------|-----------------------------|--|-------------------------------|
| 33.01 | Piraillan | 088-P-006 Piraillan |  | Bimestrielle |
| | | 088-P-045 L'Herbe | | |
| 33.02-03 | Arès | 088-P-011 Bergey |  | Mensuelle |
| | | 088-P-015 Brignard | | |
| 33.04 | Le Teich | 088-P-020 Branne |  | Mensuelle |
| | | 088-P-021 Comprian(a) | | |
| 33.05-06 | Gujan-Mestras | 088-P-022 Larros |  | Mensuelle |
| | | 088-P-026 Bordes | | |
| 33.08 | Arguin | 087-P-009 Banc d'Arguin sud |  | Bimestrielle |
| 33.09 | Le Ferret | 087-P-001 Cap Ferret(a) |  | Mensuelle |
| 33.10-A | Intra bassin | 088-P-035 Grand banc |  | Mensuelle |
| | | 088-P-007 Jacquet aval | | |
| 33.10-B | Gorp | 088-P-018 Gorp |  | Bimestrielle |
| | | 088-P-019 Bourrut | | |

**Carte 5** : Zones de production du groupe 3

3.3. Bilan de la surveillance

3.3.1. Bilan de la surveillance régulière

En 2013, compte tenu du nombre de points de prélèvement et de leur fréquence d'échantillonnage (mensuelle à bimestrielle), le nombre attendu de résultats en surveillance régulière était de 162.

Suite à un problème avec notre sous-traitant pour le transport, quatre prélèvements de coquillages n'ont pu être acheminés, portant le nombre effectif de résultats à 158, soit un taux de réalisation de 97%.

Sur les 158 analyses de coquillages :

- 27 analyses ont été réalisées par le Laboratoire Départemental d'Analyse Vétérinaire et de Sécurité Alimentaire (LABSA) à Pessac (Gironde) suivant la méthode d'analyse impédancemétrique NF V 08-106.
- 131 analyses ont été réalisées par le Laboratoire Environnement Ressources Pertuis Charentais de l'Ifremer à La Tremblade (Charente-Maritime) suivant la méthode d'analyse impédancemétrique NF V 08-106.

3.3.2. Bilan de la surveillance en alerte

En 2013, quatre épisodes d'alerte microbiologique de niveau 0, cinq épisodes d'alerte microbiologique de niveau 1 et un épisode d'alerte microbiologique de niveau 2, ont été déclenchés.

- Une alerte de niveau 0 pour la zone « 33.12 » (« Intra bassin ») a été déclenchée le 26/11/2013 suite à des résultats d'autocontrôle sur des palourdes « brutes de pêche » non satisfaisants. Les résultats obtenus suite à cette alerte étaient satisfaisants et ont permis de mettre fin à l'alerte.
- Deux alertes de niveau 0 pour la zone « 33.05-06 » (« Gujan-Mestras ») ont été déclenchées les 23/01/2013 et 14/06/2013 suites à des informations de nos partenaires : dragage au cours duquel un important volume de sédiment devait être déplacé et dysfonctionnement de poste de pompage ayant entraîné des rejets d'eaux usées dans le milieu naturel. Dans les deux cas, les résultats obtenus étaient satisfaisants et ont permis de mettre fin à l'alerte.
- Une alerte de niveau 1 pour la zone « 33.10A » (« Intrabassin ») a été déclenchée le 08/08/2013 suite à un dépassement du seuil d'alerte de 230 E. coli/100g CLI (290 E. coli /100g CLI) dans les huîtres de la station « Jacquets aval ». Le résultat suivant était satisfaisant et a permis de mettre fin à l'alerte.
- Quatre alertes de niveau 1 pour la zone « 33.09 » (« Le Ferret ») ont été déclenchées les 15/05/2013, 14/06/2013, 08/07/2013 et 04/09/2013 suite à des dépassements du seuil d'alerte de 230 E. coli/100g CLI (350, 290, 5000 et 290 E. coli /100g CLI pour les dates respectives) dans les huîtres de la station « Cap Ferret (a) ». Dans les trois premiers cas, les résultats suivants étaient satisfaisants et ont permis de mettre fin à l'alerte. Pour le dernier cas une alerte de niveau 2 a été émise.
- L'alerte de niveau 2 pour la zone « 33.09 » (« Le Ferret ») déclenchée le 11/09/2013 a abouti à des résultats favorables et les bons résultats des analyses suivantes (18/09/2013) ont permis de mettre fin à l'alerte.

3.3.3. Bilan des études de zones

Aucune étude de zone n'est en cours en 2013 pour le département de la Gironde.

3.4. Présentation des résultats

Les prélèvements de coquillages sont effectués sur des points pérennes, dont les coordonnées sont définies géographiquement. Ces points sont jugés représentatifs de la contamination dans les zones de production classées. Ce point doit être placé de telle sorte qu'il permette la mise en alerte sur la zone : il est donc situé dans un secteur exposé à un risque d'insalubrité dû à un éventuel apport contaminant.

Les résultats, présentés pour chaque zone de production classée et suivie, se composent de trois parties :

1. Surveillance microbiologique

Les résultats de dénombrement des *E. coli* dans les coquillages vivants obtenus au cours des trois dernières années calendaires sont présentés pour l'ensemble des points de suivi de la zone (pour le groupe considéré). Sur ce premier graphe, les données obtenues dans le cadre de la surveillance régulière (symbole rond) sont prises en compte dans le cadre de l'estimation de la qualité. Les données liées à des prélèvements supplémentaires (dispositif d'alerte) -) sont indiquées par un symbole étoilé.

Les résultats obtenus consécutivement à un épisode de forte précipitation apparaissent encadrés en noir. Le terme « fortes précipitations » est utilisé lorsque les précipitations cumulées sur les deux jours précédant le prélèvement sont supérieures au quantile 90, estimé sur l'ensemble des données de pluviométrie de la période considérée.

Les résultats obtenus consécutivement à une précipitation exceptionnelle apparaissent encadrés en rouge. Le terme « précipitation exceptionnelle » correspond à l'événement pluviométrique majeur (cumul des pluies de deux jours consécutifs) enregistré au cours des 5 dernières années.

Le tableau permet de visualiser la répartition des résultats *E. coli* (nombre et pourcentage) obtenus sur les trois dernières années en surveillance régulière, par rapport aux seuils microbiologiques réglementaires (230, 4600 et 46 000 *E. coli*/100 g CLI, la valeur de 700 étant indiquée à titre d'information). La valeur maximale de contamination sur la période est indiquée.

L'estimation de la qualité microbiologique de la zone est déterminée (A, B, C ou D) suivant les seuils définis par le Règlement (CE) n°854/2004 pour les zones disposant d'un nombre de données suffisant sur les 3 dernières années (24 données minimum pour les zones suivies avec une fréquence mensuelle ou adaptée, 12 données minimum pour les zones suivies avec une fréquence bimestrielle).

Pour compléter l'information, les données mensuelles de pluviométrie pour la station météorologique la plus représentative du ou des points de surveillance sont présentées, permettant de visualiser les variations temporelles.

2. Surveillance chimique

Lorsque la zone concernée fait l'objet d'un suivi chimique, les résultats sont présentés dans un tableau regroupant sur la ou les premières lignes les résultats observés traités comme indiqué au paragraphe 1.4.2. La dernière ligne rappelle les seuils réglementaires auxquels ces résultats doivent être comparés.


3. Estimation de la qualité sanitaire

La qualité sanitaire (police bleue) est déterminée sur la base des résultats de la surveillance microbiologique et chimique, en prenant le résultat le plus défavorable. Enfin, un commentaire précise le classement de la zone au 01/01/2014.

3.4.1. Coquillages fousseurs

Surveillance chimique

Pour les coquillages fousseurs, la surveillance chimique est effectuée sur le point 088-P-049 « La Touze ». Ce point est jugé représentatif de la contamination des fousseurs dans le bassin d'Arcachon.




Carte 6 : Localisation du point ROCCH des coquillages fousseurs

Surveillance Microbiologique

| N° de la zone | Nom de la zone | N° et nom des points | Coquillage prélevé | Fréquence de prélèvement 2013 | Page |
|---------------|----------------|-----------------------------|---|-------------------------------|------|
| 33-11 | Arguin | 087-P-009 Banc d'Arguin sud |  | Mensuelle | 28 |
| 33-12 | Intra Bassin | 088-P-016 Les Argiles |  | Bimestrielle | 29 |
| | | 088-P-049 La Touze |  | | |

Le point en gras est un point ROCCH et REMI



Carte 7 : Localisation des points REMI des coquillages fousseurs

Zone 33.11 - Arguin - Groupe 2

1- Surveillance microbiologique : Résultats REMI

Nature du suivi

● Surveillance régulière

* Prélèvements supplémentaires

○ Prélèvements après fortes pluies (16 mm) sur 2011-2013

Point(s) et coquillage(s) suivi(s)

Banc Arguin sud - Coque





Tableau des résultats : effectif et pourcentage par classe sur 3 ans (2011-2013)

| | N | <=230 |]230-700] |]700-4600] |]4600-46000] | >46000 | Max | Qualité estimée |
|---|----|-------|-----------|------------|--------------|--------|------|-----------------|
| n | 35 | 32 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1100 | B |
| % | | 91.4 | 5.7 | 2.9 | 0 | 0 | | |

Les prélèvements supplémentaires sont figurés sur le graphe mais ne sont pas pris en compte dans le tableau des résultats.

L'évènement pluviométrique majeur des 5 dernières années a lieu sur les 2 jours précédents le 20/09/2009.

Station météo de Cap Ferret - Distribution mensuelle de la pluviométrie



2- Surveillance chimique : Résultats ROCCH

Tableau des résultats : concentrations en poids frais diminuées de l'incertitude élargie, 1er trimestre 2013

| | Cadmium (mg/kg) | Plomb (mg/kg) | Mercuré (mg/kg) | TEQ (pg/g) PCDD+PCDF | TEQ (pg/g) PCDD+PCDF+PCB dl | Somme des PCB 28,52, 101,138,153,180 (ng/g) | Benzoapyrène (µg/kg) | Somme BaP, BaA, BbF, Chr (µg/kg) |
|------------------------|--------------------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|--|-------------------------|-------------------------------------|
| La Touze (Palourde) | 0.17 | 0.12 | 0.09 | pas de suivi des contaminants organiques | | | | |
| Seuils réglementaires | 1 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 6.5 | 75 | 5 | 30 |

Qualité Sanitaire : B
(microbiologique et chimique)

Commentaires : au 01/01/2014, la zone était classée B par Arrêté Préfectoral.

Sources REMI-ROCCH-Ifrémer, banque Quadrigé[®] / Météo France

Zone 33.12 - Intra bassin - Groupe 2

1- Surveillance microbiologique : Résultats REMI

Nature du suivi

● Surveillance régulière

* Prélèvements supplémentaires

○ Prélèvements après fortes pluies (16 mm) sur 2011-2013

Point(s) et coquillage(s) suivi(s)

Les Argiles - Palourde grise ou japonaise Touze - Palourde grise ou japonaise





Tableau des résultats : effectif et pourcentage par classe sur 3 ans (2011-2013)

| | N | <=230 |]230-700] |]700-4600] |]4600-46000] | >46000 | Max | Qualité estimée |
|---|----|-------|-----------|------------|--------------|--------|------|-----------------|
| n | 47 | 29 | 12 | 5 | 1 | 0 | 6300 | B |
| % | | 61.7 | 25.5 | 10.6 | 2.1 | 0 | | |

Les prélèvements supplémentaires sont figurés sur le graphe mais ne sont pas pris en compte dans le tableau des résultats.

L'évènement pluviométrique majeur des 5 dernières années a lieu sur les 2 jours précédents le 20/09/2009.

Station météo de Cap Ferret - Distribution mensuelle de la pluviométrie



2- Surveillance chimique : Résultats ROCCH

Tableau des résultats : concentrations en poids frais diminuées de l'incertitude élargie, 1er trimestre 2013

| | Cadmium (mg/kg) | Plomb (mg/kg) | Mercure (mg/kg) | TEQ (pg/g) PCDD+PCDF | TEQ (pg/g) PCDD+PCDF+PCB dl | Somme des PCB 28,52, 101,138,153,180 (ng/g) | Benzoapyrène (µg/kg) | Somme BaP, BaA, BbF, Chr (µg/kg) |
|-----------------------|-----------------|---------------|-----------------|--|-----------------------------|---|----------------------|----------------------------------|
| La Touze (Palourde) | 0.17 | 0.12 | 0.09 | pas de suivi des contaminants organiques | | | | |
| Seuils réglementaires | 1 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 6.5 | 75 | 5 | 30 |

Qualité Sanitaire : B
(microbiologique et chimique)


Commentaires : au 01/01/2014, la zone était classée B par Arrêté Préfectoral.

Sources REMI-ROCCH-Iframer, banque Quadrigé² / Météo France

3.4.2. Coquillages non fousseurs

Surveillance chimique

Pour les coquillages non fousseurs, la surveillance chimique est effectuée sur les points 087-P-001 « Cap Ferret », 088-P-007 « Les Jacquets », 088-P-021 « Comprian ». Ces points sont jugés représentatifs de la contamination des non fousseurs dans le bassin d'Arcachon.




Carte 8 : Localisation des points ROCCH des coquillages non fousseurs

Surveillance microbiologique - Zones classées A

| N° de la zone | Nom de la zone | N° et nom des points | Coquillage prélevé | Fréquence de prélèvement 2013 | Page |
|---------------|----------------|--------------------------------|--|-------------------------------|------|
| 33.08 | Arguin | 087-P-009 Banc d'Arguin sud |  | Bimestrielle | 32 |
| 33.09 | Le Ferret | 087-P-001 Cap Ferret(a) |  | Mensuelle | 33 |
| 33.10-A | Intra bassin | 088-P-035 Grand banc |  | Mensuelle | 34 |
| | | 088-P-007 Jacquet aval | | | |
| 33.10-B | Gorp | 088-P-018 Gorp |  | Bimestrielle | 35 |
| | | 088-P-019 Bourrut | | | |

Les points en gras sont des points ROCCH et REMI



Carte 9 : Localisation des points REMI des coquillages non fouisseurs de classe A

Zone 33.08 - Arguin - Groupe 3

1- Surveillance microbiologique : Résultats REMI

Nature du suivi

● Surveillance régulière

* Prélèvements supplémentaires

○ Prélèvements après fortes pluies (16 mm) sur 2011-2013

Point(s) et coquillage(s) suivi(s)

Banc Arguin sud - Huître creuse





Tableau des résultats : effectif et pourcentage par classe sur 3 ans (2011-2013)

| | N | <=230 |]230-700] |]700-4600] |]4600-46000] | >46000 | Max | Qualité estimée |
|---|----|-------|-----------|------------|--------------|--------|-----|-----------------|
| n | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | A |
| % | | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Les prélèvements supplémentaires sont figurés sur le graphique mais ne sont pas pris en compte dans le tableau des résultats.

L'évènement pluviométrique majeur des 5 dernières années a lieu sur les 2 jours précédents le 20/09/2009.

Station météo de Cap Ferret - Distribution mensuelle de la pluviométrie



2- Surveillance chimique : Résultats ROCCH

Tableau des résultats : concentrations en poids frais diminuées de l'incertitude élargie, 1er trimestre 2013

| | Cadmium (mg/kg) | Plomb (mg/kg) | Mercuré (mg/kg) | TEQ (pg/g) PCDD+PCDF | TEQ (pg/g) PCDD+PCDF+PCB dl | Somme des PCB 28,52, 101,138,153,180 (ng/g) | Benzoapyrène (µg/kg) | Somme BaP, BaA, BbF, Chr (µg/kg) |
|---------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|--|-------------------------|-------------------------------------|
| Cap Ferret (Huître creuse) | 0.19 | 0.16 | 0.04 | pas de suivi des contaminants organiques | | | | |
| Les Jacquets (Huître creuse) | 0.16 | 0.15 | 0.03 | pas de suivi des contaminants organiques | | | | |
| Comprian (Huître creuse) | 0.29 | 0.21 | 0.04 | 0.57 | 0.94 | 3.88 | 0.7 | 10.58 |
| Seuils réglementaires | 1 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 6.5 | 75 | 5 | 30 |

Qualité Sanitaire : A
selon les résultats microbiologiques

Commentaires : au 01/01/2014, la zone était classée A par Arrêté Préfectoral.

Sources REMI-ROCCH-Iframer, banque Quadrigé^e / Météo France

Zone 33.09 - Le Ferret - Groupe 3

1- Surveillance microbiologique : Résultats REMI





Tableau des résultats : effectif et pourcentage par classe sur 3 ans (2011-2013)

| | N | <=230 |]230-700] |]700-4600] |]4600-46000] | >46000 | Max | Qualité estimée |
|---|----|-------|-----------|------------|--------------|--------|------|-----------------|
| n | 35 | 28 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5000 | B |
| % | | 80 | 11.4 | 5.7 | 2.9 | 0 | | |

Les prélèvements supplémentaires sont figurés sur le graphe mais ne sont pas pris en compte dans le tableau des résultats.

L'évènement pluviométrique majeur des 5 dernières années a lieu sur les 2 jours précédents le 20/09/2009.



2- Surveillance chimique : Résultats ROCCH

Tableau des résultats : concentrations en poids frais diminuées de l'incertitude élargie, 1er trimestre 2013

| | Cadmium (mg/kg) | Plomb (mg/kg) | Mercure (mg/kg) | TEQ (pg/g) PCDD+PCDF | TEQ (pg/g) PCDD+PCDF+PCB dl | Somme des PCB 28,52, 101,138,153,180 (ng/g) | Benzoapyrène (µg/kg) | Somme BaP, BaA, BbF, Chr (µg/kg) |
|---------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|--|-------------------------|-------------------------------------|
| Cap Ferret (Huître creuse) | 0.19 | 0.16 | 0.04 | pas de suivi des contaminants organiques | | | | |
| Les Jacquets (Huître creuse) | 0.16 | 0.15 | 0.03 | pas de suivi des contaminants organiques | | | | |
| Comprian (Huître creuse) | 0.29 | 0.21 | 0.04 | 0.57 | 0.94 | 3.88 | 0.7 | 10.58 |
| Seuils réglementaires | 1 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 6.5 | 75 | 5 | 30 |

Qualité Sanitaire : B
(microbiologique et chimique)

Commentaires : au 01/01/2014, la zone était classée A/B par Arrêté Préfectoral.

Sources REMI-ROCCH-Iframer, banque Quadriga® / Météo France

Cette zone est classée A de janvier à juin et de septembre à décembre, et B pendant les mois de juillet et août.

Les résultats ci-dessus correspondent à l'ensemble de la période. Si on considère sur les 3 années consécutives les résultats pour chacune des périodes de classement, on obtient dans les deux cas un classement B.

Zone 33.10.A - Intra bassin - Groupe 3

1- Surveillance microbiologique : Résultats REMI

Nature du suivi

● Surveillance régulière

* Prélèvements supplémentaires

○ Prélèvements après fortes pluies (16 mm) sur 2011-2013

Point(s) et coquillage(s) suivi(s)

Jacquets aval - Huître creuse

Grand Banc - Huître creuse





Tableau des résultats : effectif et pourcentage par classe sur 3 ans (2011-2013)

| | N | <=230 |]230-700] |]700-4600] |]4600-46000] | >46000 | Max | Qualité estimée |
|---|----|-------|-----------|------------|--------------|--------|-----|-----------------|
| n | 69 | 67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 290 | B |
| % | | 97.1 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | | |

Les prélèvements supplémentaires sont figurés sur le graphique mais ne sont pas pris en compte dans le tableau des résultats.

L'évènement pluviométrique majeur des 5 dernières années a lieu sur les 2 jours précédents le 20/09/2009.

Station météo de Cap Ferret - Distribution mensuelle de la pluviométrie



2- Surveillance chimique : Résultats ROCCH

Tableau des résultats : concentrations en poids frais diminuées de l'incertitude élargie, 1er trimestre 2013

| | Cadmium (mg/kg) | Plomb (mg/kg) | Mercuré (mg/kg) | TEQ (pg/g) PCDD+PCDF | TEQ (pg/g) PCDD+PCDF+PCB dl | Somme des PCB 28,52, 101,138,153,180 (ng/g) | Benzoapyrene (µg/kg) | Somme BaP, BaA, BbF, Chr (µg/kg) |
|---------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|--|-------------------------|-------------------------------------|
| Cap Ferret (Huître creuse) | 0.19 | 0.16 | 0.04 | pas de suivi des contaminants organiques | | | | |
| Les Jacquets (Huître creuse) | 0.16 | 0.15 | 0.03 | pas de suivi des contaminants organiques | | | | |
| Comprian (Huître creuse) | 0.29 | 0.21 | 0.04 | 0.57 | 0.94 | 3.88 | 0.7 | 10.58 |
| Seuils réglementaires | 1 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 6.5 | 75 | 5 | 30 |

Qualité Sanitaire : B (microbiologique et chimique)

Commentaires : au 01/01/2014, la zone était classée B par Arrêté Préfectoral.

Sources REMI-ROCCH-Iframer, banque Quadrige² / Météo France

Zone 33.10.B - Gorp - Groupe 3

1- Surveillance microbiologique : Résultats REMI





Tableau des résultats : effectif et pourcentage par classe sur 3 ans (2011-2013)

| | N | <=230 |]230-700] |]700-4600] |]4600-46000] | >46000 | Max | Qualité estimée |
|---|----|-------|-----------|------------|--------------|--------|-----|-----------------|
| n | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | A |
| % | | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Les prélèvements supplémentaires sont figurés sur le graphique mais ne sont pas pris en compte dans le tableau des résultats.

L'évènement pluviométrique majeur des 5 dernières années a lieu sur les 2 jours précédents le 20/09/2009.



2- Surveillance chimique : Résultats ROCCH

Tableau des résultats : concentrations en poids frais diminuées de l'incertitude élargie, 1er trimestre 2013

| | Cadmium (mg/kg) | Plomb (mg/kg) | Mercure (mg/kg) | TEQ (pg/g) PCDD+PCDF | TEQ (pg/g) PCDD+PCDF+PCB dl | Somme des PCB 28,52, 101,138,153,180 (ng/g) | Benzoapyrène (µg/kg) | Somme BaP, BaA, BbF, Chr (µg/kg) |
|------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--|-----------------------------|---|----------------------|----------------------------------|
| Cap Ferret (Huître creuse) | 0.19 | 0.16 | 0.04 | pas de suivi des contaminants organiques | | | | |
| Les Jacquets (Huître creuse) | 0.16 | 0.15 | 0.03 | pas de suivi des contaminants organiques | | | | |
| Compiran (Huître creuse) | 0.29 | 0.21 | 0.04 | 0.57 | 0.94 | 3.88 | 0.7 | 10.58 |
| Seuils réglementaires | 1 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 6.5 | 75 | 5 | 30 |

Qualité Sanitaire : A
selon les résultats microbiologiques


Commentaires : au 01/01/2014, la zone était classée A par Arrêté Préfectoral.

Sources REMI-ROCCH-Ifremer, banque Quadrigé² / Météo France

Surveillance microbiologique - Zones classées B

| N° de la zone | Nom de la zone | N° et nom des points | Coquillage prélevé | Fréquence de prélèvement 2013 | Page |
|---------------|----------------|----------------------------------|--|-------------------------------|------|
| 33.01 | Piraillan | 088-P-006 Piraillan |  | Bimestrielle | 37 |
| | | 088-P-045 L'Herbe | | | |
| 33.02-03 | Arès | 088-P-011 Bergey |  | Mensuelle | 38 |
| | | 088-P-015 Brignard | | | |
| 33.04 | Le Teich | 088-P-020 Branne |  | Mensuelle | 39 |
| | | 088-P-021 Comprian(a) | | | |
| 33.05-06 | Gujan-Mestras | 088-P-022 Larros |  | Mensuelle | 40 |
| | | 088-P-026 Bordes | | | |

Le point en gras est un point ROCCH et REMI



Carte 10 : Localisation des points REMI des coquillages non fousseurs de classe B

Zone 33.01 - Piraillan - Groupe 3

1- Surveillance microbiologique : Résultats REMI





Tableau des résultats : effectif et pourcentage par classe sur 3 ans (2011-2013)

| | N | <=230 |]230-700] |]700-4600] |]4600-46000] | >46000 | Max | Qualité estimée |
|---|----|-------|-----------|------------|--------------|--------|------|-----------------|
| n | 60 | 44 | 10 | 6 | 0 | 0 | 2100 | B |
| % | | 73.3 | 16.7 | 10 | 0 | 0 | | |

Les prélèvements supplémentaires sont figurés sur le graphique mais ne sont pas pris en compte dans le tableau des résultats.

L'évènement pluviométrique majeur des 5 dernières années a lieu sur les 2 jours précédents le 20/09/2009.



2- Surveillance chimique : Résultats ROCCH

Tableau des résultats : concentrations en poids frais diminuées de l'incertitude élargie, 1er trimestre 2013

| | Cadmium (mg/kg) | Plomb (mg/kg) | Mercuré (mg/kg) | TEQ (pg/g) PCDD+PCDF | TEQ (pg/g) PCDD+PCDF+PCB dl | Somme des PCB 28,52, 101,138,153,180 (ng/g) | Benzoapyrène (µg/kg) | Somme BaP, BaA, BbF, Chr (µg/kg) |
|------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--|-----------------------------|---|----------------------|----------------------------------|
| Cap Ferret (Huître creuse) | 0.19 | 0.16 | 0.04 | pas de suivi des contaminants organiques | | | | |
| Les Jacquets (Huître creuse) | 0.16 | 0.15 | 0.03 | pas de suivi des contaminants organiques | | | | |
| Comprian (Huître creuse) | 0.29 | 0.21 | 0.04 | 0.57 | 0.94 | 3.88 | 0.7 | 10.58 |
| Seuils réglementaires | 1 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 6.5 | 75 | 5 | 30 |

Qualité Sanitaire : B
(microbiologique et chimique)

Commentaires : au 01/01/2014, la zone était classée B par Arrêté Préfectoral.

Sources REMI-ROCCH-Ifremer, banque Quadrigé² / Météo France

Zone 33.02.03 - Arès - Groupe 3

1- Surveillance microbiologique : Résultats REMI





Tableau des résultats : effectif et pourcentage par classe sur 3 ans (2011-2013)

| | N | <=230 |]230-700] |]700-4600] |]4600-46000] | >46000 | Max | Qualité estimée |
|---|----|-------|-----------|------------|--------------|--------|-----|-----------------|
| n | 72 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 330 | B |
| % | | 98.6 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | | |

Les prélèvements supplémentaires sont figurés sur le graphique mais ne sont pas pris en compte dans le tableau des résultats.

L'évènement pluviométrique majeur des 5 dernières années a lieu sur les 2 jours précédents le 20/09/2009.



2- Surveillance chimique : Résultats ROCCH

Tableau des résultats : concentrations en poids frais diminuées de l'incertitude élargie, 1er trimestre 2013

| | Cadmium (mg/kg) | Plomb (mg/kg) | Mercuré (mg/kg) | TEQ (pg/g) PCDD+PCDF | TEQ (pg/g) PCDD+PCDF+PCB dl | Somme des PCB 28,52, 101,138,153,180 (ng/g) | Benzoapyrène (µg/kg) | Somme BaP, BaA, BbF, Chr (µg/kg) |
|---------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|--|-------------------------|-------------------------------------|
| Cap Ferret (Huître creuse) | 0.19 | 0.16 | 0.04 | pas de suivi des contaminants organiques | | | | |
| Les Jacquets (Huître creuse) | 0.16 | 0.15 | 0.03 | pas de suivi des contaminants organiques | | | | |
| Comprian (Huître creuse) | 0.29 | 0.21 | 0.04 | 0.57 | 0.94 | 3.88 | 0.7 | 10.58 |
| Seuils réglementaires | 1 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 6.5 | 75 | 5 | 30 |

Qualité Sanitaire : B
(microbiologique et chimique)

Commentaires : au 01/01/2014, la zone était classée B par Arrêté Préfectoral.

Sources REMI-ROCCH-Ifremer, banque Quadrigé² / Météo France

Zone 33.04 - Le Teich - Groupe 3

1- Surveillance microbiologique : Résultats REMI





Tableau des résultats : effectif et pourcentage par classe sur 3 ans (2011-2013)

| | N | <=230 |]230-700] |]700-4600] |]4600-46000] | >46000 | Max | Qualité estimée |
|---|----|-------|-----------|------------|--------------|--------|------|-----------------|
| n | 70 | 65 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1300 | B |
| % | | 92.9 | 5.7 | 1.4 | 0 | 0 | | |

Les prélèvements supplémentaires sont figurés sur le graphe mais ne sont pas pris en compte dans le tableau des résultats.

L'évènement pluviométrique majeur des 5 dernières années a lieu sur les 2 jours précédents le 20/09/2009.



2- Surveillance chimique : Résultats ROCCH

Tableau des résultats : concentrations en poids frais diminuées de l'incertitude élargie, 1er trimestre 2013

| | Cadmium (mg/kg) | Plomb (mg/kg) | Mercuré (mg/kg) | TEQ (pg/g) PCDD+PCDF | TEQ (pg/g) PCDD+PCDF+PCB dl | Somme des PCB 28,52, 101,138,153,180 (ng/g) | Benzoapyrène (µg/kg) | Somme BaP, BaA, BbF, Chr (µg/kg) |
|------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--|-----------------------------|---|----------------------|----------------------------------|
| Cap Ferret (Huître creuse) | 0.19 | 0.16 | 0.04 | pas de suivi des contaminants organiques | | | | |
| Les Jacquets (Huître creuse) | 0.16 | 0.15 | 0.03 | pas de suivi des contaminants organiques | | | | |
| Comprian (Huître creuse) | 0.29 | 0.21 | 0.04 | 0.57 | 0.94 | 3.88 | 0.7 | 10.58 |
| Seuils réglementaires | 1 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 6.5 | 75 | 5 | 30 |

Qualité Sanitaire : B
(microbiologique et chimique)

Commentaires : au 01/01/2014, la zone était classée B par Arrêté Préfectoral.

Sources REMI-ROCCH-Iframer, banque Quadrigé[®] / Météo France

Zone 33.05.06 - Gujan-Mestras - Groupe 3

1- Surveillance microbiologique : Résultats REMI

Nature du suivi

● Surveillance régulière

* Prélèvements supplémentaires

○ Prélèvements après fortes pluies (16 mm) sur 2011-2013

Point(s) et coquillage(s) suivi(s)

Larros - Huître creuse

Bordes - Huître creuse





Tableau des résultats : effectif et pourcentage par classe sur 3 ans (2011-2013)

| | N | <=230 |]230-700] |]700-4600] |]4600-46000] | >46000 | Max | Qualité estimée |
|---|----|-------|-----------|------------|--------------|--------|-----|-----------------|
| n | 70 | 67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 490 | B |
| % | | 95.7 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | | |

Les prélèvements supplémentaires sont figurés sur le graphique mais ne sont pas pris en compte dans le tableau des résultats.

L'évènement pluviométrique majeur des 5 dernières années a lieu sur les 2 jours précédents le 20/09/2009.

Station météo de Cap Ferret - Distribution mensuelle de la pluviométrie



2- Surveillance chimique : Résultats ROCCH

Tableau des résultats : concentrations en poids frais diminuées de l'incertitude élargie, 1er trimestre 2013

| | Cadmium (mg/kg) | Plomb (mg/kg) | Mercuré (mg/kg) | TEQ (pg/g) PCDD+PCDF | TEQ (pg/g) PCDD+PCDF+PCB dl | Somme des PCB 28,52, 101,138,153,180 (ng/g) | Benzoapyrene (µg/kg) | Somme BaP, BaA, BbF, Chr (µg/kg) |
|---------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|--|-------------------------|-------------------------------------|
| Cap Ferret (Huître creuse) | 0.19 | 0.16 | 0.04 | pas de suivi des contaminants organiques | | | | |
| Les Jacquets (Huître creuse) | 0.16 | 0.15 | 0.03 | pas de suivi des contaminants organiques | | | | |
| Comprian (Huître creuse) | 0.29 | 0.21 | 0.04 | 0.57 | 0.94 | 3.88 | 0.7 | 10.58 |
| Seuils réglementaires | 1 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 6.5 | 75 | 5 | 30 |

Qualité Sanitaire : B (microbiologique et chimique)

Commentaires : au 01/01/2014, la zone était classée B par Arrêté Préfectoral.

Sources REMI-ROCCH-Ifremer, banque Quadrigé² / Météo France

3.5. Evaluation de la qualité des zones classées

Le tableau de synthèse (Tableau 5) reprend l'ensemble des zones classées et suivies, ainsi que le nombre de résultats obtenus en surveillance régulière. Il permet de vérifier la conformité -ou la non-conformité- du classement actuel de la zone par rapport aux données acquises dans le cadre de la surveillance régulière comparées aux seuils réglementaires. La qualité est estimée d'après les seuils du règlement CE n° 854/2004.

Tableau 6 : Evaluation de la qualité des zones de production classées et surveillées

| N°Zone | Nom de la zone | Groupe | Nombre de données | Période 2011-2013 (pourcentage de résultats par classe) | | | | | Classement au 01/01/2014 | Qualité microbiologique estimée Règlement 854/2004 * | Qualité globale estimée (microbiologique et chimique) |
|----------|----------------|--------|-------------------|--|---------|-----------|--------------|---------|--------------------------|---|--|
| | | | | ≤ 230 | 230-700 | 700-4 600 | 4 600-46 000 | >46 000 | | | |
| 33.01 | Pirailan | 3 | 60 | 73.3 | 16.7 | 10 | 0 | 0 | B | B | B |
| 33.02.03 | Arès | 3 | 72 | 98.6 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | B | B | B |
| 33.04 | Le Teich | 3 | 70 | 92.9 | 5.7 | 1.4 | 0 | 0 | B | B | B |
| 33.05.06 | Gujan-Mestras | 3 | 70 | 95.7 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | B | B | B |
| 33.08 | Arguin | 3 | 23 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | A | A |
| 33.09 | Le Ferret | 3 | 35 | 80 | 11.4 | 5.7 | 2.9 | 0 | A/B | B | B |
| 33.10.A | Intra bassin | 3 | 69 | 97.1 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | A | B | B |
| 33.10.B | Gorp | 3 | 48 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | A | A |
| 33.11 | Arguin | 2 | 35 | 91.4 | 5.7 | 2.9 | 0 | 0 | B | B | B |
| 33.12 | Intra bassin | 2 | 47 | 61.7 | 25.5 | 10.6 | 2.1 | 0 | B | B | B |

4. Discussion

4.1. Qualité microbiologique

4.1.1. Niveau de qualité

Les qualités estimées de chaque zone classée et leur classement administratif en vigueur sont présentées dans le tableau 5.

Dans la majorité des cas, il y a concordance entre la qualité estimée et le classement administratif. Deux zones font toutefois exception.

- La zone 33.10 A « Intra bassin » est classée A mais estimée de qualité B sur la période 2011-2013. Cette estimation est liée à 2 résultats supérieurs à 230 *E. coli*/100g de CLI sur un nombre total de données de 69. Ces deux résultats, obtenus en février 2012 et août 2013, sont légèrement supérieurs au seuil de 230 *E. coli*/100 g de CLI (290 *E. coli*/100g de CLI).
- La zone 33.09 « Le Ferret » bénéficie d'un classement alternatif A/B depuis 2013. Elle est classée A de janvier à juin et de septembre à décembre, et B en juillet et août. Sur la période 2011-2013, la qualité estimée est B quelle que soit la période considérée (année entière, juillet août, ou janvier-juin/septembre-décembre). Cette estimation est liée aux 6 résultats supérieurs à 230 *E. coli*/100g de CLI sur un nombre total de données de 36. Obtenus en mai 2011, août 2012 et mai, juin, juillet, septembre 2013, ils sont respectivement de 420, 1700, 350, 290, 5000 et 290 *E. coli*/100g de CLI.

4.1.2. Evolution de la fréquence d'échantillonnage

Comme expliqué dans le chapitre 1.2., la fréquence de base du suivi est mensuelle mais peut devenir bimestrielle lorsqu'il n'existe pas de risque significatif de conclure à tort sur la qualité de la zone en utilisant cette fréquence.

Sur la base des calculs réalisés sur la période 2011-2013, la fréquence de suivi actuelle ne sera pas modifiée en 2014 dans le Bassin d'Arcachon, sauf dans les zones 33.01 « Piraillan » et 33.12 « Intra bassin », pour lesquelles les moyennes géométriques 2011-2013 (respectivement 46,1 et 60,2) permettent de passer à une fréquence bimestrielle (p12).

4.1.3. Tendances générales

L'analyse de tendance concernant l'évolution du niveau de contamination des différentes zones au cours des dix dernières années a été réalisée. Elle est basée sur un test non paramétrique de Mann-Kendall et sur les données acquises dans le cadre de la surveillance régulière (Tableau 6).

- Entre 2004 et 2013, le niveau de contamination bactérienne des huîtres n'a pas présenté de tendance significative sur dix points et a diminué sur un point situé en zone classée A, « Gorp » et sur trois points situés en zone B : « Comprian (a) », « Branne » et « Larros », qui conservent néanmoins une qualité B.

➤ La contamination des palourdes échantillonnées ne présente pas de tendance significative sur le point « Les Argiles » et a diminué sur le point « La Touze ». Les résultats d'analyse confirment la qualité B de cette zone.

➤ Concernant la zone « 33.11 », en raison de la modification du point de suivi au printemps 2007, on ne dispose pas d'information suffisante pour qualifier l'évolution de la contamination, qui s'avère néanmoins de qualité B sur la base des résultats 2011-2013.

Tableau 7 : Résultats REMI - Analyse de tendances et qualité microbiologique des points

| Zone | Point | Nom du point | Support | Tendance générale ^a (2004-2013) | Qualité microbiologique estimée ^b (2011-2013) |
|----------|-----------|-----------------|---|---|--|
| 33.01 | 088-P-045 | Herbe |  | ➔ | B |
| | 088-P-006 | Piraillan |  | ➔ | B |
| 33.02-03 | 088-P-015 | Brignard |  | ➔ | A |
| | 088-P-011 | Bergey |  | ➔ | B |
| 33.04 | 088-P-021 | Comprian (a) |  | ➡ | B |
| | 088-P-020 | Branne |  | ➡ | B |
| 33.05-06 | 088-P-022 | Larros |  | ➡ | B |
| | 088-P-026 | Bordes |  | ➔ | B |
| 33.08 | 087-P-009 | Banc Arguin sud |  | ➔ | A |
| 33.09 | 087-P-001 | Cap Ferret (a) |  | ➔ | B |
| 33.10-A | 088-P-007 | Jacquets aval |  | ➔ | B |
| | 088-P-035 | Grand Banc |  | ➔ | A |
| 33.10-B | 088-P-018 | Gorp |  | ➡ | A |
| | 088-P-019 | Bourrut |  | ➔ | A |
| 33.11 | 087-P-009 | Banc Arguin sud |  | Moins de 10 ans de données | B |
| 33.12 | 088-P-016 | Les Argiles |  | ➔ | B |
| | 088-P-049 | La Touze |  | ➔ | B |

➤ dégradation, ➡ amélioration, ➔ pas de tendance significative (seuil 5%).

^a Calculée sur les 10 dernières années

^b Estimée sur les 3 dernières années (calcul sur au moins 12 ou 24 données selon la fréquence)

Source REMI-Ifremer, banque Quadrigé²

4.2. Qualité chimique

Sur le Bassin d'Arcachon, les points « Cap Ferret », « Les Jacquets » et « Comprian » sont échantillonnés depuis 1979. Quant au point « La Touze », il n'est échantillonné que depuis 2010. Par ailleurs, les 3 premiers points font l'objet d'un échantillonnage annuel au mois de novembre dans le cadre de la Directive Cadre sur l'Eau⁷. Ces résultats ne sont pas pris en compte pour le classement de zone. Or, ce suivi a permis de mettre en évidence une forte contamination des huîtres sauvages du fond du Bassin par les HAP. Pour cette raison, à partir de 2013, le point « Comprian » fait l'objet d'analyses sur les contaminants organiques dans le cadre du ROCCH en février. Les premiers résultats obtenus sont inférieurs aux seuils réglementaires (Tableau 8 et Annexe).

Tableau 8 : Résultats des analyses de contaminants organiques en 2013

| | | TEQ (pg/g) | TEQ (pg/g) | Somme des PCB (ng/g) | Benzoapyrène (µg/Kg) | Somme BaP BaA, BbF, Chr (µg/Kg) |
|-----------------|--------|---------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--|
| | | PCDD+PC DF | PCDD+PC DF+PCB dl | CB 28, 52, 101, 138, 153, 180 | | |
| | | Seuil réglementaire | | | | |
| | | 3.5 | 6.5 | 7.5 | 5 | 30 |
| Nom du point | Espèce | Résultat | | | | |
| Comprian | Huître | 0.57 | 0.94 | 3.88 | 0.7 | 10.58 |

Les concentrations en métaux lourds réglementés (cadmium, mercure et plomb) des huîtres et des palourdes prélevées sur ces quatre points sont toujours inférieures aux teneurs seuils définies pour le classement des zones de production conchylicole (Tableau 9).

Tableau 9 : Résultats des analyses de métaux en 2013

| Zone | Nom du point | Espèce | Cd | Pb | Hg |
|-------------------|--------------|----------|---|------|------|
| | | | Seuil réglementaire (mg/kg, poids humide) | | |
| | | | 1.0 | 1.5 | 0.5 |
| | | | Résultat (mg/kg, poids humide) | | |
| Bassin d'Arcachon | Cap Ferret | Huître | 0.19 | 0.16 | 0.04 |
| | La Touze | Palourde | 0.17 | 0.12 | 0.09 |
| | Les Jacquets | Huître | 0.16 | 0.15 | 0.03 |
| | Comprian | Huître | 0.29 | 0.21 | 0.04 |

⁷ <http://dx.doi.org/10.13155/28793>

La zone de l'estuaire de la Gironde, suivie par le biais du point « La Fosse », est échantillonnée trimestriellement depuis 1979. Elle ne fait pas l'objet d'une exploitation ostréicole, hormis le captage du naissain d'huître.

Les concentrations en métaux lourds réglementés (cadmium, mercure et plomb) des huîtres prélevées sur ce point sont inférieures aux teneurs seuil définies pour le classement des zones de production conchylicole pour le plomb et le mercure. Par contre les concentrations en cadmium des huîtres prélevées sur ce point sont toujours supérieures au seuil, ce qui entraîne une estimation de la qualité sanitaire « très mauvaise » et incompatible avec toute forme d'exploitation (Tableau 10).

Tableau 10 : Résultats des analyses de métaux en 2013

| | | | Cd | Pb | Hg |
|------------------------|--------------|--------|---|------|------|
| | | | Seuil réglementaire (mg/kg, poids humide) | | |
| | | | 1.0 | 1.5 | 0.5 |
| Zone | Nom du point | Espèce | Résultat (mg/kg, poids humide) | | |
| Estuaire de la Gironde | La Fosse | Huître | 3.06 | 0.40 | 0.03 |

5. Conclusion

Microbiologie

En 2013, la surveillance microbiologique des zones de production conchylicole en Gironde a concerné 10 zones localisées sur le Bassin d'Arcachon.

Dans le cadre de la surveillance en alerte, ont été déclenchés :

- Trois alertes de niveau 0
- Cinq alertes de niveau 1
- Une alerte de niveau 2

Selon les critères réglementaires pris en compte (règlement CE n°854/2004), la qualité microbiologique est estimée B pour huit zones de production de la Gironde et A pour deux zones de production (33.08 « Arguin » et 33.10-B « Gorp »).

Cependant, le classement pour le groupe 3 de deux zones présente des discordances avec la qualité estimée : « Qualité B / Classement A » :

- 33.09 « Le Ferret »
- 33.10-A « Intra bassin » avec une qualité B sur le point « Jacquets aval » et une qualité A sur le point « Grand Banc »

Contaminants chimiques

Pour les HAP comme pour les métaux lourds, les résultats obtenus dans le Bassin d'Arcachon sont inférieurs aux seuils réglementaires définis par le règlement CE n° 1881/2006 modifié par le règlement CE n° 1259/2011.

En ce qui concerne l'estuaire de la Gironde, les concentrations obtenues sur les coquillages prélevés sur les points ROCCH sont inférieures aux seuils réglementaires pour le mercure et le plomb et supérieures au seuil réglementaire pour le cadmium (3 fois le seuil réglementaire). La qualité sanitaire de la zone reste donc « très mauvaise ».

Annexe

Présentation des contaminants chimiques mesurés

On trouvera ci-dessous une brève description des substances chimiques faisant l'objet d'une surveillance sanitaire, ainsi que leurs principales sources d'apport dans le milieu marin.

Mercuré (Hg)

Le mercure est un élément rare de la croûte terrestre et le seul métal volatil. Naturel ou anthropique, il peut être transporté en grandes quantités par l'atmosphère. Les sources naturelles en sont le dégazage de l'écorce terrestre, les feux de forêt, le volcanisme et le lessivage des sols. Les sources anthropiques sont constituées par les processus de combustion (charbon, pétrole, ordures ménagères, etc.), de la fabrication de la soude et du chlore ainsi que de l'orpaillage. Sa très forte toxicité, en particulier sous sa forme méthylée, a mené à de nombreuses réglementations d'utilisation et de rejet.

Cadmium (Cd)

Les principales utilisations du cadmium sont les traitements de surface, les industries électriques et électroniques et la production de pigments colorés surtout destinés aux matières plastiques. A noter que les pigments cadmiés sont désormais prohibés dans les plastiques alimentaires. Dans l'environnement, les autres sources de cadmium sont la combustion du pétrole ainsi que l'utilisation de certains engrais chimiques où il est présent à l'état d'impureté.

Le renforcement des réglementations de l'usage du cadmium et l'arrêt de certaines activités notoirement polluantes se sont traduits par une baisse générale des niveaux de présence observés.

Plomb (Pb)

Depuis l'abandon du plomb-tétraéthyle comme anti-détonant dans les essences, les principaux usages de ce métal restent la fabrication d'accumulateurs et l'industrie chimique. Son cycle atmosphérique est très important et constitue une source majeure d'apport à l'environnement.

Dioxines et furannes

Les dioxines figurent parmi les substances organochlorées dont les médias répercutent fréquemment la présence accidentelle dans l'environnement et dans certains produits alimentaires ou marins. La large famille des dioxines est couramment désignée sous l'appellation PCDD (polychlorodibenzo-dioxines). Elles sont toutes toxiques et cancérogènes à des degrés pouvant varier d'un facteur 10 000 selon les formes. A la différence des PCB (de structure moléculaire voisine), les dioxines ne sont pas produites intentionnellement mais sont des sous-produits indésirables de certaines synthèses chimiques et de certaines combustions. Actuellement l'incinération des ordures ménagères est considérée comme la principale source de contamination par les dioxines.

Les furannes sont une famille voisine des dioxines, souvent désignée par l'appellation PCDF (polychlorodibenzofurannes). Ils sont toxiques à des degrés comparables aux dioxines et ont des origines semblables.

PCB (Polychlorobiphényles)

Les PCB sont des composés organochlorés persistants, bioaccumulables et potentiellement toxiques, comprenant 209 congénères différents. Ils n'existent pas à l'état naturel et les apports au milieu marin sont tous d'origine anthropique. Produits industriellement depuis 1930, ils ont été utilisés comme additifs dans les peintures, les encres et les revêtements muraux. Du fait de leur rémanence (persistance) leur présence a été décelée partout sur notre planète et dans tous les compartiments de notre environnement. A partir des années 1970, leurs utilisations ont été limitées aux systèmes clos, essentiellement le matériel électrique de grande puissance. Enfin, leur toxicité, et leur faculté de bioaccumulation ont conduit à interdire leur usage en France à partir de 1987. Depuis lors, ils ne subsistent plus que dans des équipements électriques anciens, transformateurs et gros condensateurs. La convention de Stockholm prévoit la disparition totale de ces équipements pour 2025.

Tous les PCB sont toxiques à des degrés très divers. Jusqu'en 2011 la réglementation sanitaire s'intéressait uniquement aux PCB "de type dioxine" ou DL (pour *dioxin like*). Il s'agit de congénères de PCB dont la molécule présente des caractéristiques de forme et d'encombrement comparables à celles des dioxines et qui possèdent les mêmes mécanismes de toxicité que les dioxines. Cependant, environ la moitié de la quantité totale de PCB présents dans les denrées alimentaire est composée de six PCB non DL que l'on a coutume de désigner comme "PCB marqueurs ou indicateurs". La somme des concentrations de ces six PCB est considérée comme un marqueur adéquat de la présence de PCB non DL et donc de l'exposition du consommateur. C'est pourquoi, à partir de 2012, la réglementation sanitaire introduit une teneur maximale pour la somme de ces six PCB.

HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques)

Les HAP entrent pour 15 à 30% dans la composition des pétroles bruts. Moins biodégradables que les autres hydrocarbures, ils restent plus longtemps dans le milieu. S'ils existent à l'état naturel dans l'océan, leur principale source est anthropique et provient de la combustion des produits pétroliers, sans oublier les déversements accidentels et les rejets illicites. Les principaux HAP sont cancérogènes à des degrés divers, le plus néfaste étant le benzo(a)pyrène. Ce dernier était jusqu'en 2011 le seul à faire l'objet d'une réglementation sanitaire. A partir de septembre 2012 il sera accompagné des benzo(a)anthracène, benzo(b)fluoranthène et chrysène.