




Contrat de prestations Ifremer 2016 5 5052 8205

**Contrôle de surveillance 2016 DCE de la masse d'eau côtière « Pertuis Breton – FRGC53 » et de la masse d'eau de transition « Estuaire du Lay - FRGT30 » pour les suivis stationnels des herbiers de *Zostera (Zosterella) noltei* :
rapport final**



SAURIAU P.-G., AUBERT F., PINEAU P.



LIENSs, CNRS, Université de la Rochelle
2 rue Olympe de Gouges, 17000 La Rochelle

Ifremer

24 février 2017

Sommaire

1. INTRODUCTION.....	1
2. MATERIEL & METHODES	4
2.1. STRATEGIE D'ECHANTILLONNAGE.....	4
2.1.1 . <i>Positionnement DGPS</i>	5
2.1.2 . <i>Prélèvement et analyse des macroalgues</i>	6
2.1.3 . <i>Prélèvement des sédiments</i>	6
2.1.4 . <i>Prise de notes sur le terrain</i>	8
2.2. PRESENTATION DES STATIONS	9
2.2.1 . <i>Plage de la Charge Neuve int HZN</i>	9
2.2.1 . <i>Ars en Ré int HZN</i>	12
2.2.2 . <i>Lay Crochon 1982 int HZN (estuaire du Lay)</i>	15
2.3. CALENDRIER DE REALISATION DES OPERATIONS A LA MER	18
2.4. REALISATION DES GRILLES.....	20
2.5. PROTOCOLES D'ANALYSE DES SEDIMENTS	26
2.5.1 <i>Analyse granulométrique</i>	27
2.5.2 <i>Analyse de la matière organique sédimentaire</i>	30
2.6. CALCUL DE L'INDICATEUR « ANGIOSPERMES »	31
2.6.1 <i>Composition taxinomique</i>	31
2.6.2 <i>Extension</i>	31
2.6.1 <i>Densité</i>	32
3. RESULTATS.....	33
3.1. SEDIMENTS.....	33
3.1.1 . <i>Plage de la Charge Neuve int HZN</i>	33
3.1.2 . <i>Ars en Ré int HZN (Fiers d'Ars, Pertuis Breton)</i>	35
3.2. GRILLE D'ECHANTILLONNAGE	38
3.3. MACROALGUES : BIOMASSE	41
3.3.1 . <i>Plage de la Charge Neuve int HZN</i>	41
3.3.2 . <i>Ars en Ré int HZN (Fiers d'Ars, Pertuis Breton)</i>	42
3.3.3 . <i>Lay Crochon 1982 int HZN (Estuaire du Lay)</i>	44
3.4. TAUX DE RECOUVREMENT EN <i>ZOSTERA NOLTEI</i>	45
3.5. ZOSTERE : REDECOUVERTE DE <i>ZOSTERA MARINA</i> SUR LES ESTRANS DU NORD DE L'ILE DE RE	54
3.6. LES OISEAUX HERBIVORES CONSOMMATEURS DE ZOSTERES	57
4. CALCUL DE L'INDICATEUR « ANGIOSPERMES »	60
4.1. PERTUIS BRETON FRGC53	60
4.2. ESTUAIRE DU LAY FRGT30.....	60
4.3. BILAN DU TEMPS AGENT AFFECTE AU CONTROLE DE SURVEILLANCE DCE.....	61
5. BILAN DES SAISIES DANS LA BASE QUADRIGE².....	62
6. BIBLIOGRAPHIE.....	64

7.	ANNEXES	68
7.1.	FICHE DES STATIONS DU RESEAU DE SURVEILLANCE DCE	68
7.2.	TABLE ATTRIBUTAIRE DU DGPS TRIMBLE GEOXT	71
7.3.	ANALYSES GRANULOMETRIQUES DE 2016.....	72

1. Introduction

La Directive Cadre sur l'Eau 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établit un nouveau cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau. Elle fixait comme objectif général d'atteindre, à l'horizon 2015, un bon état écologique (biologique et chimique) des masses d'eaux souterraines et de surface, ces dernières incluant les eaux côtières (MEC) et de transition (MET) (http://envlit.ifremer.fr/surveillance/directive_cadre_sur_l_eau_dce).

Le contrôle de surveillance de l'état écologique s'effectue entre autres éléments biologiques sur les macrophytes, les macroinvertébrés et les phanérogames marines. C'est parmi celles-ci que se trouvent les herbiers intertidaux de la zostère naine *Zostera* (*Zosterella*) *noltei* Hornemann nommée alternativement *Zostera noltei* (voir pour la synonymie le site WoRMS <http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=145796>).

Dans le district Loire-Bretagne (**Figure 1**), les masses d'eau côtière et de transition les plus méridionales retenues pour le contrôle de surveillance sont la masse d'eau côtière « Pertuis Breton » FRGC53 et la masse d'eau de transition « Estuaire du Lay » FRGT30.




Figure 1 : Masse d'eau côtière « Pertuis Breton » FRGC53 et masse d'eau de transition « Estuaire du Lay » FRGT30 dans le district Loire-Bretagne.

Source http://envlit.ifremer.fr/surveillance/directive_cadre_sur_l_eau_dce

Contrat de prestation 2016 5 5052 8205 : herbier de *Zostera noltei*

Les opérations de surveillance DCE retenues en 2016 pour la masse d'eau côtière Pertuis Breton FRGC53 (**Figure 2**) étaient :

- échantillonnage stationnel sur une grille de 30 points des herbiers de la zostère naine *Zostera noltei* en septembre sur les stations en intertidal Plage de la Charge Neuve int HZN et Ars en Ré int HZN selon le protocole (Auby *et al.* 2012) révisé en 2014 (Auby *et al.* 2014) du contrôle de surveillance DCE des herbiers intertidaux.




Figure 2 : Masse d'eau côtière « Pertuis Breton » FRGC53 avec localisation des stations en intertidal à herbier de *Zostera noltei* Plage de la Charge Neuve int HZN et Ars en Ré int HZN (croix verte). Source http://envlit.ifremer.fr/surveillance/directive_cadre_sur_l_eau_dce.

Contrat de prestation 2016 5 5052 8205 : herbier de *Zostera noltei*

Les opérations de surveillance DCE retenues en 2016 pour la masse d'eau de transition « Estuaire du Lay » FRGT30 (**Figure 3**) étaient :

- échantillonnage stationnel sur une grille de 30 points des herbiers de la zostère naine *Zostera noltei* en septembre sur la station Lay Crochon 1982 int HZN selon le protocole (Auby *et al.* 2012) révisé en 2014 (Auby *et al.* 2014) du contrôle de surveillance DCE des herbiers intertidaux.




Figure 3 : Masse d'eau de transition « Estuaire du Lay » FRGT30 avec localisation de la station en intertidal à herbier de *Zostera noltei* Lay crochon 1982 int HZN (croix verte). Source http://envlit.ifremer.fr/surveillance/directive_cadre_sur_l_eau_dce.

L'objet du présent document est de faire état des résultats du contrôle de surveillance DCE 2016 dans les deux masses d'eau « Pertuis Breton » et « Estuaire du Lay » pour les échantillonnages stationnels sur l'élément de qualité herbiers intertidaux à *Zostera noltei*. Un rappel des résultats antérieurs est fait afin de resituer ces informations dans le cours de la dynamique temporelle propre à chaque station d'herbier.

2. Matériel & méthodes

2.1.Stratégie d'échantillonnage

L'élément de qualité herbier à *Zostera noltei* est échantillonné dans le cadre du contrôle de surveillance DCE selon le nouveau protocole 2011 amendé en 2012 (Auby *et al.* 2012) puis 2014 (Auby *et al.* 2014) selon une grille de 30 points (**Tableau 1**).

La grille est orientée A1-F1 face à la mer pour toutes trois stations (*vide infra*).

Tableau 1 : Protocole taux de recouvrement de l'herbier à *Zostera noltei*. Source Auby *et al.* (2012, 2014).

Méthode																																											
Engin d'échantillonnage	Quadrat de 0,5 m de côté																																										
Dimension échantillon	0,25 m ²																																										
	30 échantillons positionnés selon une grille de 6 lignes par 5 colonnes centrée en D3 sur les coordonnées géographiques de la station.																																										
Nombre d'échantillon	<div style="text-align: center;"> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>A</td> <td>B</td> <td>C</td> <td>D</td> <td>E</td> <td>F</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">●</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> </div>		A	B	C	D	E	F	1							2							3				●			4							5						
	A	B	C	D	E	F																																					
1																																											
2																																											
3				●																																							
4																																											
5																																											
Analyse	<p>Taux de recouvrement estimé visuellement et quantifié selon 6 classes 0, 1-25, 26-50, 51-75, 76-99 et 100.</p> <p>Prise d'un cliché avec algues si présentes ; Prise d'un second cliché une fois les algues prélevées pour analyse ultérieure avec le logiciel Image J pour contrôle des taux de recouvrement selon les 6 classes de recouvrement.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Classe de taux de recouvrement (%)</th> <th>0</th> <th>1-25</th> <th>26-50</th> <th>51-75</th> <th>76-99</th> <th>100</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Valeur</td> <td>0</td> <td>0,125</td> <td>0,375</td> <td>0,625</td> <td>0,875</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <p>Les photos AVANT et APRES enlèvement des macroalgues sont stockées dans Quadriège</p>	Classe de taux de recouvrement (%)	0	1-25	26-50	51-75	76-99	100	Valeur	0	0,125	0,375	0,625	0,875	1																												
Classe de taux de recouvrement (%)	0	1-25	26-50	51-75	76-99	100																																					
Valeur	0	0,125	0,375	0,625	0,875	1																																					

2.1.1. Positionnement DGPS

La méthodologie utilisée depuis 2011 sur le terrain met en œuvre (**Figure 4**) :


- un DGPS Trimble GeoXT utilisé pour un positionnement sub-métrique (0,5 m) ;
- un trajet sur la grille de point de façon à ne pas parcourir les surfaces d'herbier où seront déposés les quadrats ;
- une prise de photo sur chaque quadrat à la verticale sans trépied mais avec un éclairage contrôlé. En cas de soleil direct, un pare soleil est utilisé ;
- des prélèvements ponctuels pour granulométrie (3) et matière organique (9) ;
- une prise de notes sur le DGPS.
-



A



B



C



D

Figure 4 : Illustrations du positionnement par DGPS Trimble GeoXT (A, B et C) et de la prise de photo d'un quadrat avec utilisation d'un pare-soleil (D) comme réalisé depuis 2012.

Photo C. Curty et P. Cajeri CNRS ©.

2.1.2. Prélèvement et analyse des macroalgues

Si présentes, les macroalgues sont échantillonnées dans chacun des 30 quadrats (**Figure 5**) en séparant algues vertes, algues rouges et algues brunes (**Tableau 2**).

Tableau 2 : Protocole macroalgues. Source Auby *et al.* (2012, 2014).

Méthode	
Engin d'échantillonnage	Quadrat de 0,5 m de côté
Dimension échantillon	0,25 m ²
Nombre d'échantillon	Variable entre 0 et 90 selon la présence/absence d'algues vertes, rouges et/ou brunes
Analyse	Séparation par groupe (algues vertes, rouges et brunes) Biomasse sèche (48 h à 60°C) Biomasse sèche sans cendre (biomasse sèche - cendres, après 4 h à 450°C)

2.1.3. Prélèvement des sédiments

Les sédiments sont échantillonnés (**Figure 5**) afin d'effectuer des analyses granulométriques (**Tableau 3**) et des estimations des teneurs en matière organique (**Tableau 4**).

Tableau 3 : Protocole granulométrie. Source Auby *et al.* (2012, 2014).

Méthode	
Engin d'échantillonnage	Carottier PVC – 9 cm de diamètre
Dimension échantillon	9 cm diamètre -5 cm de profondeur
Nombre d'échantillon	3 échantillons pris au hasard sur l'emprise de la station
Analyse	Séchage 48 h en étuve à 60°C – Pesée de 100 g sédiment sec à 0,01 g – Passage humide sur tamis de maille 63 µm – Séchage 48 h en étuve à 60°C – Passage à sec sur série de tamis AFNOR (de 4 mm à 63µm) – Pesée de chaque fraction à 0,01 g – Paramètres de distribution obtenus par méthode numérique selon procédure GRADISTAT (Blott & Pye 2001) ou G2Sd pour R (Fournier <i>et al.</i> , 2014)

Tableau 4 : Protocole matière organique. Source Auby *et al.* (2012, 2014).

Méthode	
Engin d'échantillonnage	Seringue carottier de 3 cm de diamètre
Dimension échantillon	3 cm diamètre -5 cm de profondeur
Nombre d'échantillon	9 échantillons au hasard sur l'emprise de la station
Analyse	Perte au feu (4h – 450°C)

Contrat de prestation 2016 5 5052 8205 : herbier de *Zostera noltei*

La position géographique du lieu de prélèvements des sédiments est tirée aléatoirement grâce à un tirage aléatoire sans remise parmi les 30 points A1 à F5. Ceci est effectué lors de la journée de préparation de la campagne à la mer afin d'affecter 3 puis 9 positions géographiques sur la grille pour respectivement effectuer les prélèvements granulométriques et de matière organique.




Figure 5 : Visualisation des prélèvements de macroalgues (A, B), granulométriques (C, D) et de sédiments pour l'analyse de la matière organique (E, F) illustrant le protocole commun à toutes les stations à herbier *Zostera noltei*. Photo P.-G. Sauriau CNRS ©.

2.1.4. Prise de notes sur le terrain

La prise de note est basée sur l'utilisation du DGPS Trimble GeoXT et d'une table attributaire. Celle-ci permet une saisie standardisée des informations terrain directement sur l'écran tactile du DGPS à l'aide d'un stylet. La table attributaire contient une série de champs avec menus déroulants à choix obligatoire, sauf le champ commentaire final non obligatoire. Une valeur par défaut est définie pour tous les champs.

Il est cependant nécessaire de disposer à côté du DGPS d'une feuille de terrain placée sur un support rigide (**Figure 6**). Cette feuille contient le plan de position de la grille de points, les points prévus pour les prélèvements granulométriques (3) et de matière organique (9). Elle permet de compléter la saisie sur le DGPS. Sont notés l'ordre de réalisation des points, les points déjà réalisés afin de faciliter le trajet sur la grille et toute information additionnelles pour la station (météo, horaire, présence et nombre de pêcheurs à pied, changement dans la topographie, etc...). La table attributaire contient les champs suivants :

StationLettre Menu, champ obligatoire A, B, C, D, E ou F ;

StationNuméro Menu, champ obligatoire 1, 2, 3, 4 ou 5 ;

Macroalgue Menu, champ obligatoire NON (par défaut), V, R, B, VR, VB, RB, ou VRB ;

Dépôt_Vase Menu, champ obligatoire NON (valeur par défaut), OUI ;

Taux_Recouvrement Menu, champ obligatoire pour *Zostera noltei* 0 [0], 1-25 [0.125], 26-50 [0.375], 51-75 [0.625], 76-100 [0.875], >100 [1] ;

Granulométrie Menu, champ obligatoire, NON (valeur par défaut) G1, G2 ou G3 ;

Matière_Organique Menu, champ obligatoire NON (valeur par défaut) MO1, MO2, MO3, MO4, MO5, MO6, MO7, MO8 ou MO9 ;

Topographie Menu, champ obligatoire Bosse, Creux, Plat (valeur par défaut) ;

Eau Menu, champ obligatoire Sec (valeur par défaut), Flaque ;

Traces Menu, champ obligatoire Bernache, Goéland, Mulet, Pied, Grattage, Non (par défaut)

Autre_Commentaire Non (par défaut), 100 caractères possibles.




Figure 6 : Prise de notes associant table attributaire du DGPS et feuille terrain sur support rigide, exemple pour la station « Ars en Ré int HZN » de 2016 de la masse d'eau côtière Pertuis Breton FRGC532. Photo 05/09/2016 P.-G. Sauriau CNRS ©.

2.2. Présentation des stations

2.2.1. Plage de la Charge Neuve int HZN

La station « Plage de la Charge Neuve int HZN, mnémonique 076-P-058 » a été positionnée lors de la prospection 2006 hors de l'influence directe de chenaux d'écoulement des marais littoraux, hors des zones d'influence des houles du large, hors de l'influence directe des parcs ostréicoles sur un site médiolittoral facile d'accès pédestre (**Tableau 5**). Ce site n'est pas impacté par les bouées de mouillage pour la plaisance qui se situent en bordure de plage ni impacté par la pêche à pied (**Figure 7**). Le médiolittoral supérieur ainsi que les laisses de mer sont le réceptacle de débris d'herbier très abondants à la saison de l'échantillonnage.

La grille de 30 points est prospectée *pedibus jambi* à partir de l'accès sur le littoral. La bordure A1-C1 de la grille présente un ancien chenal enfoui sous la vase et demande une marche lente et attentive alors que la bordure A1-A3 présente un chenal actif (**Figure 8**).

La station se situe en médiolittoral moyen et présentait en 2009 (Sauriau *et al.* 2009), 2011 (Sauriau *et al.* 2011), 2012 (Sauriau *et al.* 2013), 2013 (Sauriau *et al.* 2014) et 2014 (Sauriau *et al.* 2015) un herbier dense à très dense. La situation est la même en 2016 (**Figure 7**).

La station « Plage de la Charge Neuve int HZN » est incluse dans un site du réseau Natura 2000 (<http://www.natura2000.fr>), en tant que SIC/pSIC Ile de Ré - Fier d'Ars (<http://natura2000.environnement.gouv.fr/sites/FR5400424.html>).

Tableau 5 : Caractéristiques des suivis sur la station échantillonnée.

Station	Plage de la Charge Neuve int HZN mnémonique 076-P-058
Regroupement	Non
Moyens à la mer	Accès pédestre à deux personnes minimum Multiples : métrique « densité des herbiers à <i>Zostera noltei</i> » par mesure du taux de recouvrement et 3 métriques supplémentaires (granulométrie, matière organique, biomasse des macroalgues vertes, rouges et brunes et nombre-localisation des oiseaux herbivores consommateurs d'herbier)
Paramètres	Août-Septembre
Fréquence	Initialement tous les 3 ans du plan de gestion et depuis 2011 tous les ans du plan de gestion
Opérateur :	
- prélèvement	LIENSs (CNRS, Université de La Rochelle)
- tri et détermination	et antérieurement CREMA L'Houmeau (CNRS-Ifremer) puis CRELA (CNRS-Ifremer-Université de La Rochelle)
- mesure granulométrie	
- mesure taux de matières organiques	
Début prélèvements	2006 (prospection), 2007 (surveillance)



Figure 7 : Situation de l'herbier à *Zostera noltei* sur la station « Plage de la Charge Neuve int HZN » (A), exemple de densité maximale d'herbier sur le point A4 en 2016 (B). Photo P.-G. Sauriau CNRS ©.




Figure 8 : Vue générale et de détail et de la grille de points sur la station « Plage de la Charge Neuve int HZN ». Réalisation carte sous SIG par C. Curti.

2.2.1. Ars en Ré int HZN

Le choix d'une station dans le Fier d'Ars s'est appuyé sur une prospection réalisée le 25/07/2012 (**Tableau 6**). Elle a été positionnée en dehors de l'influence directe de chenaux d'écoulement de marais littoraux, en dehors de l'influence directe de parcs ostréicoles sur un site facile d'accès pédestre et non impacté par des bouées de mouillage (**Figure 9**). La station « Ars en Ré int HZN » se situe en médiolittoral moyen et est en revanche très largement impactée par la pêche à pied de loisir comme déjà observé en 2012 (Sauriau *et al.* 2013) et 2013 (Sauriau *et al.* 2014) mais dans une moindre mesure en 2014 (Sauriau *et al.* 2015).

La grille de points (**Figure 10**) est prospectée *pedibus jambi* à partir d'un accès sur le littoral avec escalier en pierre. Le site ne présente pas de difficultés pour la marche à pied.

La station « Ars en Ré int HZN » est incluse dans un site du réseau Natura 2000 (<http://www.natura2000.fr>), en tant que SIC/pSIC Ile de Ré - Fier d'Ars (<http://natura2000.environnement.gouv.fr/sites/FR5400424.html>).

Tableau 6 : Caractéristiques des suivis sur la station échantillonnée.

Station	Ars en Ré int HZN mnémonique 076-P-075
Regroupement	Non
Moyens à la mer	Accès pédestre à deux personnes minimum Multiples : métrique « densité des herbiers à <i>Zostera noltei</i> » par mesure du taux de recouvrement et 3 métriques supplémentaires (granulométrie, matière organique, biomasse des macroalgues vertes, rouges et brunes et nombre-localisation des oiseaux herbivores consommateurs d'herbier)
Paramètres	
Fréquence	Août-Septembre, tous les ans du plan de gestion
Opérateur :	
- prélèvement	
- tri et détermination	LIENSs (CNRS, Université de La Rochelle)
- mesure granulométrique	
Début prélèvements	2012 (prospection), 2012 (surveillance)



A



B

Figure 9 : Situation de l'herbier à *Zostera noltei* sur la station « Ars en Ré int HZN » du Fier d'Ars (A) et exemple d'impact immédiat de la pêche à pied à la palourde par piétinement sur l'herbier sur le point D3 en 2016 (B). Photo P.-G. Sauriau CNRS ©.




Figure 10 : Vue générale et de détail de la grille de points sur la station « Ars en Ré int HZN » dans le Fier d’Ars. Réalisation carte sous SIG par C. Curti.

2.2.2. Lay Crochon 1982 int HZN (estuaire du Lay)

La station « Lay crochon1982 » dans l'estuaire du Lay a été positionnée suite à une prospection terrain en 2010 pour estimer l'extension de l'herbier (**Tableau 7**). L'herbier couvrait une superficie d'environ 17,6 ha (Auby *et al.* 2010b) avec une répartition en plusieurs tâches le long du chenal. La dynamique de la flèche sableuse de la pointe d'Arcay génère un système de crochons successifs dont la chronologie est étudiée et connue depuis plusieurs siècles (Allard 2008). La station pour le suivi du contrôle de la surveillance DCE a été positionnée sur le crochon daté de 1982 (**Figure 12**) avec un suivi de surveillance annuel en 2011 (Sauriau *et al.* 2011), 2012 (Sauriau *et al.* 2013), 2013 (Sauriau *et al.* 2014) et 2014 (Sauriau *et al.* 2015).

La station se situe en médiolittoral moyen (**Figure 11**). La station est prospectée *pedibus jambi* à partir d'un accès bateau à partir soit du port du Pavé dans l'anse de l'Aiguillon (2011, 2012), soit du port de Chef de Baie (2013) soit désormais de la cale de la petite jetée des Caves dans l'estuaire du Lay (2014, 2015, 2016), ce qui est beaucoup plus pratique avec un transport du navire Vasouillard (**Figure 13**) sur remorque depuis 2014. Cela a nécessité la mobilisation de deux pilotes (2014 lors de la première utilisation de la cale et repérage des lieux de navigation) ou d'un seul pilote par la suite.

Tableau 7 : Caractéristiques des suivis sur la station échantillonnée.

Station	Lay crochon 1982 int HZN mnémorique 076-P-075
Regroupement	Non
Moyens à la mer	Accès pédestre à deux personnes via embarcation avec pilote(s) qui reste(nt) à bord en soutien logistique. Multiples : métrique « densité des herbiers à <i>Zostera noltei</i> » par mesure du taux de recouvrement et 3 métriques supplémentaires (granulométrie, matière organique, biomasse des macroalgues vertes, rouges et brunes et nombre-localisation des oiseaux herbivores consommateurs d'herbier
Paramètres	
Fréquence	Août-Septembre, tous les ans du plan de gestion
Opérateur :	
- prélèvement	LIENSs (CNRS-Université de La Rochelle)
- tri et détermination	Pilote Ifremer L'Houmeau (2011-2012-2013)
- mesure granulométrique	Pilotes LIENSs CNRS (2014-actuel)
- mesure taux de matières organiques	
Début prélèvements	2011 (prospection) et 2011(surveillance)



A



B

Figure 11 : Situation de la grille à *Zostera noltei* dans l'estuaire du Lay (A) sur la station « Lay Crochon 1982 int HZN » et exemple de densité d'herbier sur le point A1 en 2016 avec macroalgues (B). Photo P.-G. Sauriau CNRS ©.




Figure 12 : Vue générale et de détail de la grille de points sur la station « Lay Crochon 1982 int HZN ». Réalisation carte sous SIG par C. Curti. La ligne A1-F1 est face à la mer vers l'ouest et la ligne A5-F5 est face au chenal de l'estuaire du Lay.

2.3. Calendrier de réalisation des opérations à la mer

Les opérations pour les suivis stationnels devront se dérouler sur un total de 3 jours (**Tableau 8**).

- En domaine intertidal de la masse d'eau côtière « Pertuis Breton », le travail à la mer a mobilisé 4 personnes jour-mer les sur 2 jours en septembre 2016 ;
- En domaine intertidal de la masse d'eau de transition « Estuaire du Lay », le travail à la mer a mobilisé 3 personnes jour-mer en septembre 2016, y compris le pilote de l'embarcation VASOILLARD (**Figure 13**) de l'Université de la Rochelle resté en attente dans le chenal afin d'assurer la sécurité et le transport de l'équipe en charge de prospecter l'estran.

Ces chiffres ne comprennent ni le temps nécessaire à la préparation des opérations à la mer (1 jour) ni le temps de dépouillement des informations collectées pour les suivis.

Tableau 8 : Calendrier des opérations à la mer sur les sites échantillonnés.

Nom point (toponymie)	Code masse d'eau	Type de suivi	Type de station	Dates	Nombre personnes jour-mer	Opérateurs
Plage de la Charge Neuve int HZN	FRGC53	Intertidal Meuble Flore <i>Zostera noltei</i>	Grille	01/09/2016	2	CNRS LIENSs
Ars en Ré int HZN	FRGC53	Intertidal Meuble Flore <i>Zostera noltei</i>	Grille	05/09/2016	2	CNRS LIENSs
Lay Crochon 1982 int HZN	FRGT30	Intertidal Meuble Flore <i>Zostera noltei</i>	Grille	14/09/2016	3	CNRS LIENSs
Total	-	-	-	3 jours	7 per. jour	-



Figure 13 : Navire VASOUEILLARD sur sa remorque à proximité de la cale de la petite jetée des Caves dans l'estuaire du Lay.

2.4. Réalisation des grilles

2.4.1. Plage de la Charge Neuve int HZN

L'échantillonnage s'est déroulé le 01/09/2016 à partir 9h59, heure du premier cliché photographique et s'est terminé à 11h31 pour une durée de 1h32 (**Figure 14**).




Figure 14 : Réalisation de la grille de points sur la station « Plage de la Charge Neuve int HZN ». Photo P.-G. Sauriau CNRS ©.

Contrat de prestation 2016 5 5052 8205 : herbier de *Zostera noltei*

Sur ce site aucun pêcheur à pied n'est présent du fait des difficultés de marche. La pêche à pied se pratique plus à l'Est là où les sédiments sont plus sableux à proximité des parcs ostréicoles où plus de 30 pêcheurs ont pu être comptabilisés le 01/09/2016. Il a cependant pu être noté la trace de la quille d'une embarcation zébrant le site de part en part avec une trace très visible sur l'herbier de *Zostera noltei* ().



Figure 15 : Trace d'une embarcation en vue NE (A) et vue SO (B) sur l'herbier de la Charge Neuve. Photo P.-G. Sauriau CNRS ©.

2.4.2. Ars en Ré int HZN (Pertuis Breton)

L'échantillonnage s'est déroulé le 05/09/2016 à partir de 13h59, heure du premier cliché photographique et s'est terminé à 15h42 pour une durée de 1h43 (Figure 16).




Figure 16 : Réalisation de la grille sur la station « Ars en Ré int HZN ». Photo P.-G. Sauriau CNRS ©.

Contrat de prestation 2016 5 5052 8205 : herbier de *Zostera noltei*

Sur ce site les pêcheurs à pied à la palourde sont très présents. De très nombreuses traces de piétinements, grattages et fouille aux doigts y sont visibles (**Figure 17A**). Il n'est pas rare si ce n'est fréquent que la position d'un point de la grille corresponde à une zone largement piétinée (**Figure 17B**).




Figure 17 : Présence de piétinements et traces de fouille par des pêcheurs à pied à la palourde sur l'herbier de *Zostera noltei* d'Ars en Ré int HZN entre deux points de la grille (A) et sur le point D3 de la grille (B). Photo P.-G. Sauriau CNRS ©.

2.4.3. Lay Crochon 1982 int HZN (Estuaire du Lay)

L'échantillonnage s'est déroulé le 14/09/2016 à partir 9h53, heure du premier cliché photographique et s'est terminé à 11h10 pour une durée de 1h17 (Figure 18).



Figure 18 : Réalisation de la grille sur la station « Lay Crochon 1982 int HZN » dans l'estuaire du Lay. Photo P.-G. Sauriau CNRS ©.

Contrat de prestation 2016 5 5052 8205 : herbier de *Zostera noltei*

Sur ce site des pêcheurs à pied à la palourde sont présents principalement en bordure du chenal de navigation. Les traces de piétinements et de grattage sont néanmoins nettement visibles sur l'herbier de *Zostera noltei* (**Figure 19**).



A



B

Figure 19 : Présence de pêcheurs à pied à la palourde (A) sur l'estran de l'estuaire du Lay et traces de piétinements et grattages (B). Photo P.-G. Sauriau CNRS ©.

2.5. Protocoles d'analyse des sédiments

Le principe général de l'analyse granulométrique à visée biosédimentaire (Chassé & Glémarec 1976) est d'obtenir une estimation du type sédimentaire à partir des 3 principales fractions de sédiments que sont les pélites ($< 63 \mu\text{m}$), les sables ($63 \mu\text{m} < X < 2 \text{ mm}$) et les graviers ($> 2 \text{ mm}$) selon les coupures communément admises (**Figure 20**).

MOYEN D'ÉTUDE	AFNOR α	UNITÉS		CLASSIFICATION		
		Φ	Wentworth	Cailleux		
mesure directe		mm				
	-24	250-256	-8	BLOCS (BOULDERS)	RUDITES	BLOCS 200 mm
	-16	63-32	-5	GRAVE (COBBLE)		GALETS
	-6	4	-	CAILLOUX (PEBBLE)		20 mm
				GRANULES	GRAVILLONS	
	-3	2	1		2 mm	
	-2	1,6-		TRÈS GROSSIER	ARÉNITES (SANDS)	SABLES
	-1	1,25-				
	0	1	0	GROSSIER		
	1	0,8-				
	2	0,63-	1	MOYEN		
	3	0,5	1			
	5	0,315-	2	FIN	200 μm	
	9	0,125	3	TRÈS FIN	LUTITES (SILTS) (CLAYS)	SABLONS
12	0,0625-1/16	4				
14	0,04-	5	GROSSIER			
17	0,02-	6	MOYEN	LIMONS		
20	0,01-	7	FIN			
24	0,004-1/256	8	TRÈS FIN		20 μm	
		14			2 μm	PRE COLLOIDES

Figure 20 : Echelle granulométrique AFNOR, unité Φ et classifications communes utilisées (Cojan & Renard 1999).

2.5.1 Analyse granulométrique

Pour l'analyse, chaque prélèvement est vidé dans un bol identifié et taré pour être séché à l'étuve à 80-100°C pendant 72h. La masse de sédiment humide est pesée préalablement au séchage puis après séchage afin d'en estimer la quantité de sels. Un sous-échantillon de 100 g (200 g pour les sables) est remouillé dans un défloculant (métaphosphate de sodium à 40 g/l), et malaxé avec une spatule voire éventuellement passé aux ultrasons 20 mn pour désagréger les amas de vase les plus petits. Le lendemain l'échantillon est tamisé à l'eau douce sur maille de 63 μm jusqu'à obtenir un filtrat clair, le but étant d'éliminer les pélites. Le refus de tamis est récupéré et mis à l'étuve à 80-100°C pendant 72h.

L'échantillon est ensuite passé sur une colonne de tamis normalisés AFNOR sur une tamiseuse Retsch (**Figure 21**). La colonne contient 17 tamis (4000 μm , 2000 μm , 1600 μm , 1250 μm , 1000 μm , 800 μm , 630 μm , 500 μm , 400 μm , 315 μm , 250 μm , 200 μm , 160 μm , 125 μm , 100 μm , 80 μm , 63 μm), répartis en deux passages successifs (4000 à 1600 et 1250 à 63 μm). Chaque tamis est pesé vide au préalable puis plein avec sa fraction de sédiment après tamisage avec une balance Sartorius FB12CCE-S afin de déterminer le type et la quantité de sédiments dans chaque échantillon. Une précision à 0,01 g est utilisée pour les pesées. La tamiseuse est mise en marche 15 minutes à 2000 vibrations par secondes avec un mouvement vertical de 1,5 mm réglé visuellement à partir de la barrette graduée présente sur le socle noir à la base de la colonne de tamis.



Figure 21 : Colonne de tamis normalisés AFNOR sur tamiseuse Retsch et balance Sartorius à 0,01 g. Photo P.-G. Sauriau CNRS ©.

Contrat de prestation 2016 5 5052 8205 : herbier de *Zostera noltei*

Les tamis sont ultérieurement débarrassés de leurs impuretés grâce à un appareil de nettoyage aux ultrasons Elma (Bioblock Scientific) (**Figure 22**). Cette méthode est considérée aujourd'hui comme la méthode la plus efficace dans les procédés de nettoyage de précision sans influence néfaste sur le maillage des tamis.




A



B

Figure 22 : Bain à ultrasons (A) avec détails du porte tamis et de la collerette en mousse (B) pour maintenir un bol à sédiment. Photo P.-G. Sauriau CNRS ©.

Les résultats des différentes pesées sont ensuite analysées par la macro-procédure GRADISTAT (Blott & Pye 2001), permettant d'obtenir des paramètres de forme et le type de sédiment. Le type de sédiment est alors interprété vis-à-vis de la classification de Chassé & Glémarec (1976) reprise par Hily (1976) dans les Pertuis Charentais (**Figure 23**).



— Légende : A toute verticale du graphique correspond un sédiment déterminé dont on lit, aux intersections avec les courbes d'isodimension, la composition granulométrique en pourcentage pondéral sur l'axe des ordonnées. L'évolution de la teneur moyenne en calcaire est également précisée.

GH graviers hétérogènes sableux, SHV sables hétérogènes plus ou moins envasés
 GP graviers propres, GV graviers vaseux, SG sables grossiers, SF sables fins
 GB graviers biogènes, SGB sables grossiers biogènes, SFB sables fins biogènes
 FV sables fins vaseux, VS vases sableuses, VV vases franches, D sédiments dunaires

Figure 23 : Types biosédimentaires utilisés dans les pertuis Charentais (Chassé & Glémarec 1976).

2.5.2 Analyse de la matière organique sédimentaire

L'analyse de la teneur en matière organique suit le principe de la perte au feu à 450 °C. Chaque sédiment est référencé par son numéro de station puis mis à l'étuve à 100 °C 72 h afin d'obtenir un échantillon totalement sec. Les masses des coupelles numérotées sont mesurées ainsi que la masse des coupelles + le sédiment sec (environ 1g) par pesée sur une balance Mettler AE 240 avec une précision à 0,0001 g. Les échantillons sont ensuite placés dans un four à moufles 450 °C pendant 5 h permettant une crémation effective sur 4h compte tenue de la montée lente en température du four. Des cendres minérales sont ainsi obtenues et sont également pesées sur la même balance après refroidissement dans un dessiccateur à température ambiante.

La formule suivante permet de déterminer la teneur en matières organiques :

$$\% \text{ matières organiques} = \frac{\text{Matière sèche (g)} - \text{Matière minérale (g)}}{\text{Matière sèche (g)}}$$

La perte au feu est une méthode simple et peu coûteuse mais elle n'est pas très précise vis-à-vis d'une mesure de carbone ou d'azote organique particulière. Elle peut aussi être biaisée lorsque le sédiment renferme une proportion significative d'argile dont l'eau constitutive des feuillets est évaporée à 450°C (Barillé-Boyer *et al.* 2003). Elle permet cependant d'avoir une estimation en première approximation des teneurs en matières organiques des sédiments.

2.6. Calcul de l'indicateur « angiospermes »

L'indicateur français « angiospermes » (Auby *et al.* 2010b, a) repose sur trois métriques :

- 1) la composition taxinomique
- 2) l'extension
- 3) la densité estimée par les taux de recouvrement.

Pour chacune de ces trois métriques, la valeur de l'Ecological Quality Ratio (EQR) est estimée selon des grilles de référence.

2.6.1 Composition taxinomique

Pour la métrique « taxinomie », le calcul d'EQR est réalisé selon la grille ci-dessous (Tableau 9).

Tableau 9 : Grille de correspondance entre les changements observés et la valeur de l'Ecological Quality Ratio (EQR) pour la métrique « composition taxinomique ».

Perturbation	Changement de la composition taxinomique par rapport aux conditions de référence	EQR
Amélioration ou pas de modification visible	Espèces apparues ou aucune espèce disparue	1
Altérations modérées	Disparition de <i>Zostera marina</i>	0,7
Altérations majeures	Disparition de <i>Zostera noltei</i>	0,5
Altérations sévères	Perte des deux espèces	0

2.6.2 Extension

Pour la métrique « extension », le calcul d'EQR est réalisé selon la grille ci-dessous (Tableau 10).

Tableau 10 : Grille de correspondance entre les changements observés et la valeur de l'EQR pour la métrique « extension ».

Perturbation	Modification de l'extension (toutes espèces confondues) par rapport aux conditions de référence et EQR
Amélioration ou pas de modification visible	0 % perte = 1,0 ; 1 % perte = 0,98 ; 2 % perte = 0,96... 10 % perte = 0,80
Faibles signes de perturbation	11 % perte = 0,78 ; 12 % perte = 0,76 ; 13 % perte = 0,74... 20 % perte = 0,60
Altérations modérées	21 % perte = 0,59 ; 22 % perte = 0,58 ; ... 30 % perte = 0,50
Altérations majeures	31 % perte = 0,49 ; 32 % perte = 0,48 ; ... 50 % perte = 0,30
Altérations sévères	51 % perte = 0,295 ; 52 % perte = 0,290 ; ... 100 % perte = 0,0

2.6.1 Densité

Pour la métrique « densité », le calcul d'EQR est réalisé selon la grille ci-dessous (Tableau 11).

Tableau 11 : Grille de correspondance entre les changements observés et la valeur de l'EQR pour la métrique « densité ».

Perturbation	Changement de la densité par rapport aux conditions de référence et EQR
Amélioration ou pas de modification visible	0 % perte = 1,0 ; 1 % perte = 0,98 ; 2 % perte = 0,96... 10 % perte = 0,80
Faibles signes de perturbation	11 % perte = 0,78 ; 12 % perte = 0,76 ; 13 % perte = 0,74... 20 % perte = 0,60
Altérations modérées	21 % perte = 0,59 ; 22 % perte = 0,58 ; ... 30 % perte = 0,50
Altérations majeures	31 % perte = 0,49 ; 32 % perte = 0,48 ; ... 50 % perte = 0,30
Altérations sévères	51 % perte = 0,295 ; 52 % perte = 0,290 ; ... 100 % perte = 0,0

L'indicateur angiosperme est ensuite calculé en moyennant les EQR calculés des 3 métriques. Le classement de la masse d'eau pour cet indicateur est ensuite calculé à partir des équivalences définies dans la grille ci-dessous (Tableau 12).

Tableau 12 : Grille de classement pour l'élément de qualité « angiospermes ».

Statut écologique	EQR « angiospermes »
Très bon état	0,8–1,0
Bon état	0,6–0,79
Etat moyen	0,4–0,59
Etat médiocre	0,2–0,39
Mauvais état	0,0–0,19

3. Résultats

3.1. Sédiments

3.1.1. Plage de la Charge Neuve int HZN

Le sédiment présente en masse un taux moyen d'environ 20-25 % de pélites (taille < 63µm), un taux de sables d'environ 75 % et un taux d'éléments grossiers de l'ordre de 2 % (**Tableau 13**). La distribution en taille est unimodale (143 µm) mais avec un mauvais classement. Selon la classification bio-sédimentaire usuelle (Chassé & Glémarec 1976) c'est un sable fin envasé à la limite des vases sableuses comme antérieurement observé à 2012.

Le taux de matières organiques est d'environ $3 \pm 0,5$ % (**Tableau 13**). Les taux de matières organiques à partir de 2012 sont deux à trois fois plus faibles que ceux des années antérieures corrélativement à la présence de moins de pélites (plus de sables fins).

Tableau 13 : Variables sédimentaires et teneur en matière organique (\pm écart type, n) pour les sédiments de la station « Plage de la Charge Neuve int HZN » à herbier de la zostère naine.

Sédiment	2016		
	Moyenne	\pm Ecart-type	N
Plage de la Charge Neuve int HZN			
Taux de pélites < 63 µm (%)	22,5	-	1
Taux de sables 63µm à 2 mm (%)	75,8	-	1
Taux de graviers > 2 mm (%)	1,7	-	1
Taux de matière organique (%)	2,8	0,5	9
Mode (µm)	143	-	1
D10 (µm)	13	-	1
D50 ou médiane (µm)	118	-	1
D90 (µm)	159	-	1

En comparaison des suivis disponibles depuis 2006, les sédiments sablo-vaseux de 2012 à 2016 sont en moyenne beaucoup moins envasés (jusqu'à -35 % de pélites) que ceux des années de 2006 à 2011. Le site a subi un ensablement marqué ou un décapage des sédiments les plus fins depuis 2012 sans un retour aux conditions plus envasées précédentes (**Figure 24A**). En tout état de causes, s'il y a moins de pélites sur ce site depuis 2012, cela indique un changement dans le régime hydrodynamique subi par le site.

L'analyse de l'évolution temporelle de la médiane affine ce diagnostic en indiquant que le changement était déjà sensible en 2009 avec un retour en 2012 aux conditions initialement connues de 2006 puis un saut depuis 2012. La structure granulaire est relativement homogène dans le temps entre 2012 et 2016 (**Figure 24B**). En revanche, les variations temporelles du taux de matières organiques suivent celles de l'envasement avec une rupture très nette dans l'ordre de grandeur de ce taux à partir de 2012 (7 à 8 % jusqu'en 2011, puis entre 2 et 3 % depuis 2012 (**Figure 24C**)).




Figure 24 : Variations temporelles des taux de vases, sables et graviers (A), de la médiane encadrée par les quantiles D10 et D90 en µm (B) et des taux de matière organique des sédiments de la station « Plage de la Charge Neuve int HZN ».


3.1.2. Ars en Ré int HZN (Fiers d'Ars, Pertuis Breton)

Le sédiment présente en masse un taux moyen de 32 % en pélites (taille < 63µm), un taux de sables de 65 % et un taux inférieur à 2,5 % d'éléments grossiers. La distribution en taille est unimodale ou bimodale (90 et 143 µm) avec un mauvais classement. Selon la classification bio-sédimentaire usuelle (Chassé & Glémarec 1976) ce sont des sables fins envasés à la limite des vases sableuses. Des résultats similaires ont été obtenus depuis 2012 (vases sableuses à la limite des sables fins envasés) mais la composition granulométrique bien que relativement homogène dérive dans le temps suite à une faible diminution/augmentation (-10/+10 %) de la fraction pélites-sables (**Tableau 14** et **Figure 25A**). La médiane des sédiments présente une légère tendance à l'augmentation (**Figure 25B**).

Tableau 14 : Variables sédimentaires et teneur en matière organique (± écart type, n) pour les sédiments de la station « Ars en Ré int HZN » à herbier de zostère naine.

Sédiment	2016		
Ars en Ré int HZN	Moyenne	± Ecart-type	N
Taux de pélites < 63 µm (%)	32,5	-	3
Taux de sables 63µm à 2 mm (%)	65,2	-	3
Taux de graviers > 2 mm (%)	2,2	-	3
Taux de matière organique (%)	3,5	0,7	9
Mode (µm)	90 et 143	-	3
D10 (µm)	8-11	-	3
D50 ou médiane (µm)	85-103	-	3
D90 (µm)	154-204	-	3

Le taux de matières organiques est en moyenne de $3,5 \pm 0,7$ % (**Tableau 14**), ce qui est équivalent aux valeurs acquises depuis 2012 dans la gamme 2,5 à 4,0 % (**Figure 24C**).



A




Figure 25 : Variations temporelles des taux de vases, sables et graviers (A) et de la médiane encadrée par les quantiles D10 et D90 en µm (B) des sédiments de la station « Ars en Ré int HZN ».

3.1.3. Lay Crochon 1982 int HZN (Estuaire du Lay)

Le sédiment présente en masse un taux moyen de 55 % en pélites (taille < 63µm), un taux de sables de 44 % et un taux de 0,3 % d'éléments grossiers. La distribution en taille est bimodale (71, 225) parfois trimodale (71, 225 et 450 µm) avec un mauvais classement. Il n'aurait pas été possible de détecter cette caractéristique sans modifier le protocole par l'analyse individuelle des prélèvements granulométriques. Selon la classification bio-sédimentaire usuelle (Chassé & Glémarec 1976) ce serait des sables moyens envasés. La présence de dune sableuse constitutive des crochons explique la nature du mélange entre les sables et les vases. Le taux de matières organiques est en moyenne de $4,9 \pm 1,8$ % mais compte tenu de l'hétérogénéité des échantillons ce taux n'est pas statistiquement différent de ceux des années antérieures (**Tableau 15**).

Tableau 15 : Variables sédimentaires et teneur en matière organique (\pm écart type, n) pour les sédiments de la station « Lay Crochon 1982 int HZN » à herbier de zostère naine.

Sédiment	2016		
Lay Crochon 1982 int HZN	Moyenne	\pm Ecart-type	N
Taux de pélites < 63 µm (%)	55,3	-	1
Taux de sables 63µm à 2 mm (%)	44,4	-	1
Taux de graviers > 2 mm (%)	0,3	-	1
Taux de matière organique (%)	4,9	1,6	9
Mode (µm)	72-450	-	3
D10 (µm)	5-8	-	3
D50 ou médiane (µm)	25-147	-	3
D90 (µm)	191-482	-	3

La tendance qui se dégagait des années précédentes était à l'envasement avec un taux de pélites passant graduellement de moins de 30 % en 2011 à plus du double en 2013. L'année 2014 apparaît singulière dans la série avec une tendance opposée qui n'est pas poursuivie sur 2015 et 2016 avec des proportions vases-sables similaires à celles de 2012-

2013 (Tableau 15 et Figure 26). La singularité de l'année 2014 se dégage nettement de la médiane ainsi que du taux de matière organique.




Figure 26 : Variations temporelles des taux de vases, sables et graviers (A), de la médiane encadrée par les quantiles D10 et D90 en µm (B) et du taux de matière organiques (C) des sédiments sur la station « Lay Crochon 1982 int HZN » dans l'estuaire du Lay.

3.2. Grille d'échantillonnage

3.2.1. Plage de la Charge Neuve int HZN

L'échantillonnage s'est déroulé le 01/09/2016 à partir 10h02, heure du premier cliché photographique et s'est terminé à 11h31 pour une durée de 1h30 (**Figure 27**). Le temps de passage entre deux points de la grille n'est pas constant et tient compte des difficultés de marche sur le site, de la présence ou non d'algues à prélever, de la nécessité de faire un prélèvement pour analyse de la matière organique (avec 9 tirages aléatoires le jour de préparation des missions terrain) et/ou de la granulométrie (avec 3 tirages aléatoires le jour de préparation des missions terrain), des délais de la réception DGPS et si nécessaire du temps d'installation d'un pare-soleil pour obtenir une prise de vue avec une ombrage constant.

	Heure du prélèvement				Durée	1h30
	A	B	C	D	E	F
1	10h17	10h20	10h23	10h26	10h30	10h33
2	10h14	10h47	10h45	10h42	10h39	10h35
3	10h10	10h49	10h52	10h55	10h57	10h59
4	10h07	11h16	11h14	11h11	11h07	11h03
5	10h02	11h19	11h23	11h25	11h28	11h31

A

	Matière organique				2016	
	A	B	C	D	E	F
1		MO4		MO5		MO6
2	MO3					
3	MO2					
4				MO8	MO7	
5	MO1	MO9				

B

	Granulométrie				2016	
	A	B	C	D	E	F
1						
2						
3					G3	
4				G1		
5			G2			

C

Figure 27 : Trajet avec horaire de prise de vue des photographies sur chaque point de la grille échantillonnée sur la station « Plage de la Charge Neuve int HZN » à herbier de zostère naine (A) et détails de la position (après tirage aléatoire) des prélèvements pour analyse de la matière organique (B) et de la granulométrie (C).

3.2.2. Ars en Ré int HZN (Fiers d'Ars, Pertuis Breton)

L'échantillonnage s'est déroulé le 05/09/2016 à partir 14h03, heure du premier cliché photographique et s'est terminé à 15h41 pour une durée de 1h38 (Figure 28). Le temps de passage entre deux points de la grille n'est pas constant et tient compte des difficultés de marche sur le site, de la présence ou non d'algues à prélever, de la nécessité de faire un prélèvement pour analyse de la matière organique (avec 9 tirages aléatoires le jour de préparation des missions terrain) et/ou de la granulométrie (avec 3 tirages aléatoires le jour de préparation des missions terrain), des délais de la réception DGPS et du temps d'installation si nécessaire d'un pare-soleil pour obtenir une prise de vue avec un ombrage constant.

	Heure du prélèvement				Durée	
	A	B	C	D	E	F
1	15h16	15h13	14h49	14h46	14h21	14h16
2	15h20	15h10	14h54	14h42	14h24	14h13
3	15h24	15h07	14h58	14h40	14h28	14h10
4	15h27	15h05	15h01	14h36	14h32	14h06
5	15h29	15h32	15h34	15h37	15h41	14h03

A

	Matière organique				2016	
	A	B	C	D	E	F
1	MO6	MO5	MO4		MO2	MO1
2					MO3	
3	MO7					
4	MO8					
5					MO9	

B

	Granulométrie				2016	
	A	B	C	D	E	F
1						
2				G3	G1	
3						
4					G2	
5						

C

Figure 28 : Trajet avec horaire de prise de vue des photographies sur chaque point de la grille échantillonnée sur la station « Ars en Ré int HZN » du Fier d'Ars à herbier de zostère naine (A) et détails de la position (après tirage aléatoire) des prélèvements pour analyse de la matière organique (B) et de la granulométrie (C).

3.2.3. Lay Crochon 1982 int HZN (Estuaire du Lay)

L'échantillonnage s'est déroulé le 20/09/2015 à partir 12h17, heure du premier cliché photographique et s'est terminé à 13h44 pour une durée de 1h27 (**Figure 29**). Le temps de passage entre deux points de la grille n'est pas constant et tient compte des difficultés de marche sur le site, de la présence ou non d'algues à prélever, de la nécessité de faire un prélèvement pour analyse de la matière organique (avec 9 tirages aléatoires le jour de préparation des missions terrain) et/ou de la granulométrie (avec 3 tirages aléatoires le jour de préparation des missions terrain), des délais de la réception DGPS et du temps d'installation d'un pare-soleil pour obtenir une prise de vue avec un ombrage constant.

	Heure du prélèvement				Durée	
	A	B	C	D	E	F
1	9h56	10h17	10h22	10h39	10h43	11h10
2	9h59	10h14	10h24	10h37	10h45	11h07
3	10h01	10h11	10h26	10h35	10h49	11h04
4	10h03	10h10	10h27	10h33	10h50	10h59
5	10h05	10h07	10h29	10h31	10h53	10h55

A

	Matière organique					2016
	A	B	C	D	E	F
1			MO2			
2				MO4	MO6	
3		MO1				
4			MO3	MO5	MO7	MO9
5					MO8	

B

	Granulométrie					2016
	A	B	C	D	E	F
1	G1					
2						
3						
4					G3	
5		G2				

C

Figure 29 : Trajet avec horaire de prise de vue des photographies sur chaque point de la grille échantillonnée en 2016 sur la station « Lay Crochon 1982 int HZN » à herbier de la zostère naine (A) et détails de la position (après tirage aléatoire) des prélèvements pour analyse de la matière organique (B) et de la granulométrie (C).

3.3. Macroalgues : biomasse

3.3.1. Plage de la Charge Neuve int HZN

La présence de macroalgues sur cette station était occasionnelle depuis 2011 avec des *Enteromorpha* sur quelques quadrats. De longues algues vertes filamenteuses ont été observées à la périphérie du point central échantillonné en 2007 et 2009. En 2011, très peu d'algues de ce type ont été observées et quatre quadrats de la grille présentaient des algues rouges Gracillaire. Aucune algue rouge n'a été observée en 2012 et 2014 alors qu'aucune algue verte n'a été observée en 2013. La situation était radicalement différente en 2015 avec une présence constante d'algues vertes sur 25 quadrats sur 30 mais seulement 11 quadrats sur 30 colonisés par les algues rouges. La situation est de nouveau très différente en 2016 avec peu d'algues vertes et une présence occasionnelle d'algues rouges (**Figure 30**).

	Présence d'algues					2016
	A	B	C	D	E	F
1	R					
2						
3		V&R	R			R
4	V&R					R
5				R	R	R

Figure 30 : Présence de macroalgues vertes (V), rouges (R) ou brunes (B) sur la grille de points échantillonnés sur la station « Plage de la Charge Neuve int HZN ».

Les algues observées sont des algues vertes de type *Ulva* ou *Enteromorpha* en épiphytes sur des débris coquilliers et rouges. Les biomasses de macroalgues sont faibles mais très variables. Aucune algue brune n'a été observée (**Tableau 16**).

Tableau 16 : Biomasse (\pm écart-type, n) des macroalgues vertes, rouges ou brunes à la station « Plage de la Charge Neuve int HZN » à herbier de la zostère naine.

Macroalgues	2016		
Plage de la Charge Neuve int HZN	PS moyen	PSSS moyen	N
Macroalgues vertes (g m^{-2})	$0,038 \pm 0,201$	$0,030 \pm 0,161$	30
Macroalgues brunes (g m^{-2})			30
Macroalgues rouges (g m^{-2})	$0,224 \pm 0,478$	$0,195 \pm 0,417$	30

3.3.2. Ars en Ré int HZN (Fiers d'Ars, Pertuis Breton)

La présence de macroalgues sur cette station était relativement constante (14 quadrats sur 30) en 2012 et est devenue quasi généralisée en 2015. Initialement en 2012, des algues vertes filamenteuses des genres *Ulvae* et/ou *Enteromorpha* étaient observées ainsi que des algues brunes (sur un seul quadrat). En 2013, la situation était de 19 quadrats sur 30 avec algues, la plupart du temps algues vertes mais les mélanges avec les algues rouges n'étaient pas rares. La présence d'algues rouges s'est accentuée en 2014 avec 17 quadrats sur 30 alors que la présence d'algues vertes s'est maintenue avec 12 quadrats. Un seul quadrat présentait des algues brunes. Globalement le nombre de quadrat sans macroalgue diminue de 16, 11, 10 à 1 respectivement en 2012, 2013, 2014 et 2015. En 2016, la présence d'algues vertes et rouges est constante avec 19 et 12 quadrats sur 30, respectivement. Les algues brunes sont présentes sur 2 quadrats (**Figure 31**).

	Présence d'algues					2016
	A	B	C	D	E	F
1	V&R		V&R	V&R	V	V
2	V&B	V	V&R	V	V	R
3			V&R		V	V&B
4			V&R			R
5	V		V&R	R	V&R	V&R

Figure 31 : Présence de macroalgues vertes (V), rouges (R) ou brunes (B) sur la grille de points échantillonnés sur la station « Ars en Ré int HZN ».

Les biomasses de macroalgues vertes observées sont similaires à celles de 2012 en mais pour les algues rouges elles atteignaient les 6 g m⁻². En 2015 mais ne sont plus que de 0,05 g m⁻² en 2016 (**Tableau 17**).

Tableau 17 : Biomasse (± écart-type, n) des macroalgues vertes, brunes et rouges à la station « Ars en Ré int HZN » à herbier de la zostère naine.

Macroalgues	2016		
	PS moyen ±EC	PSSS moyen ±EC	n
Ars en Ré int HZN			
Macroalgues vertes (g m ⁻²)	0,151 ± 0,243	0,113 ± 0,186	30
Macroalgues brunes (g m ⁻²)	0,012 ± 0,056	0,009 ± 0,044	30
Macroalgues rouges (g m ⁻²)	0,053 ± 0,097	0,042 ± 0,076	30

Contrat de prestation 2016 5 5052 8205 : herbier de *Zostera noltei*

La relation entre la biomasse sèche sans cendre (PSSC) et la biomasse sèche (PS) toute algue confondue pour les années 2011 à 2016 sur ces deux stations du Pertuis Breton a pour pente 0,79 et 0,89 respectivement pour les algues vertes et algues rouges avec une corrélation linéaire très significative ($R = 0,98$ et $0,99$, respectivement pour les algues vertes et algues rouges) sans tendance dans les résidus de la régression (**Figure 32**). La régression n'est pas calculée pour les algues brunes trop peu de données ($n = 3$).

Ces régressions traduisent que le taux de cendres est d'environ 21 % et 11 % de la biomasse sèche respectivement pour les algues vertes et rouges, valeurs acquises de façon reproductible sur les années de suivis. Des corrélations similaires ont été obtenues pour la station dans l'estuaire du Lay (*vide infra*).




Figure 32 : Relation entre la masse de tissu végétal sans cendre et la masse de tissu végétal pour les macroalgues vertes ($n = 132$) et rouges ($n = 84$) observées sur les stations « Ars en Ré int HZN » et « Plage de la Charge Neuve int HZN » depuis 2011.

3.3.3. Lay Crochon 1982 int HZN (Estuaire du Lay)

La présence de macroalgues sur cette station était constante en 2011, 2012 et 2013 puis occasionnelle en 2014. Des algues vertes filamenteuses des genres *Ulvae* et/ou *Enteromorpha* ont été observées ainsi que des algues brunes et rouges. Les algues vertes sont de nouveau constantes en 2016 sur 14 quadrats sur les 30 possibles alors que les algues rouges ne sont qu'occasionnelles sur 2 quadrats sur 30 possibles (**Figure 33**).

	Présence d'algues					2016
	A	B	C	D	E	F
1	V&R	V	V	V		V
2		V	V	V		V
3	V		V			
4		R				V
5	V			V		

Figure 33 : Présence de macroalgues vertes (V), rouges (R) ou brunes (B) sur la grille de points de la station « Lay Crochon 1982 int HZN ».

Les biomasses de macroalgues vertes observées en 2016 sont comparables à celles de 2012 (environ 0,20 à 0,30 g m⁻²) et sont plus faibles qu'en 2011 et 2013 d'un facteur 1,5 à 4. Aucune algue brune n'a été observée en 2016 comme en 2011, 2013, 2014 et 2015 contrairement à 2012 (**Tableau 18**).

Tableau 18 : Biomasse (± écart-type, n) des macroalgues vertes, brunes et rouges à la station « Lay Crochon 1982 int HZN » à herbier de la zostère naine échantillonnée depuis 2011.

Macroalgues	2016		
	PS moyen ±EC	PSSS moyen ±EC	n
Lay Crochon 1982 int HZN			
Macroalgues vertes (g m ⁻²)	0,27 ± 0,52	0,21 ± 0,39	30
Macroalgues brunes (g m ⁻²)	0	0	30
Macroalgues rouges (g m ⁻²)	0,10 ± 0,40	0,09 ± 0,36	30

La relation entre la biomasse sèche sans cendre (PSSC) et la biomasse sèche (PS) pour les années 2011 à 2016 sur cette station du Lay a pour pentes 0,722 et 0,866 respectivement pour les algues vertes et rouges avec des corrélations linéaires très significatives (R de 0,98 pour les deux corrélations) sans tendance dans les résidus de la régression (**Figure 34**). Cela traduit que le taux de cendres est d'environ 28 % et 13 % de la biomasse sèche respectivement pour les algues vertes et rouges, valeurs acquises de façon reproductible sur les années de suivis. La récolte de seulement deux échantillons d'algues brunes ne permet pas de présenter de corrélation pour ces algues.




Figure 34 : Relation entre la masse de tissu végétal sans cendre et la masse de tissu végétal pour les macroalgues vertes (n = 90) et rouges (n = 45) observées sur la station « Lay Crochon 1982 int HZN » depuis 2011.

3.4. Taux de recouvrement en *Zostera noltei*

3.4.1. Plage de la Charge Neuve int HZN

En cette station, aucun pied de *Zostera marina* var *angustifolia* n'a été observé depuis 2007.

Après vérification par le logiciel Image J des clichés les taux déterminés visuellement sur le terrain sont validés sans correction (**Figure 35**).

Un taux de recouvrement moyen de 100 % est obtenu avec une incertitude de 1 % suggérant un herbier parfaitement homogène et constitué de plusieurs couches de feuilles superposées. Cela confirme les observations ponctuelles des années 2007 et 2009 ainsi que les observations en grilles de 30 quadrats depuis 2011.

L'herbier était apparu en 2012 très dense, beaucoup plus qu'en 2011, avec sur la totalité des points de la grille des taux de recouvrement avec plusieurs épaisseurs de feuilles.

Contrat de prestation 2016 5 5052 8205 : herbier de *Zostera noltei*

Une situation similaire se dégage des observations depuis 2012. Une très légère variation dans les taux de recouvrement est apparue en 2015 mais cette variation est moins forte en 2016 (**Figure 35** et **Tableau 19**).

VALIDATION ImageJ 1.44p							2011
Taux moyen ± IC(95%)							97.1%
							±
							2.9%
	A	B	C	D	E	F	
1	0.875	1	1	1	1	1	
2	1	0.875	1	1	1	1	
3	0.875	1	0.625	1	1	1	
4	0.875	1	1	1	1	1	
5	1	1	1	1	1	1	
VALIDATION ImageJ 1.44p							2013
Taux moyen ± IC(95%)							100.0%
							±
							0.0%
	A	B	C	D	E	F	
1	1	1	1	1	1	1	
2	1	1	1	1	1	1	
3	1	1	1	1	1	1	
4	1	1	1	1	1	1	
5	1	1	1	1	1	1	
VALIDATION ImageJ 1.44p							2014
Taux moyen ± IC(95%)							100.0%
							±
							0.0%
	A	B	C	D	E	F	
1	1	1	1	1	1	1	
2	1	1	1	1	1	1	
3	1	1	1	1	1	1	
4	1	1	1	1	1	1	
5	1	1	1	1	1	1	
VALIDATION ImageJ 1.44p							2015
Taux moyen ± IC(95%)							98.3%
							±
							1.6%
	A	B	C	D	E	F	
1	1	1	1	1	1	1	
2	1	1	1	1	1	1	
3	0.875	0.875	1	1	1	1	
4	1	0.875	0.875	1	1	1	
5	1	1	1	1	1	1	
VALIDATION ImageJ 1.44p							2016
Taux moyen ± IC(95%)							99.6%
							±
							0.9%
	A	B	C	D	E	F	
1	1	1	1	1	1	1	
2	1	1	1	1	1	1	
3	1	1	1	1	1	0.875	
4	1	1	1	1	1	1	
5	1	1	1	1	1	1	

Figure 35 : Taux de recouvrement (échelle de 0 à 1) validés par points sur la grille échantillonnée sur la station « Plage de la Charge Neuve int HZN » à herbier de la zostère naine.

Contrat de prestation 2016 5 5052 8205 : herbier de *Zostera noltei*

En regard des variations interannuelles (**Tableau 19**) et des classes de taux de recouvrement adoptées dans le protocole (**Tableau 1**), les taux de recouvrement observés sur la station « Plage de la Charge Neuve int HZN » varient entre la classe 100 % et la classe 76-99 %.

Tableau 19 : Taux de recouvrement avec intervalle de confiance à 95 % de l'herbier de la zostère naine échantillonné en 2007 et 2009 puis annuellement depuis 2011 à la station « Plage de la Charge Neuve int HZN ». Pas d'estimation (-) car pas de réplikat.

Zostère naine Plage de la Charge Neuve int HZN	Taux de recouvrement (%)			Classe
	Moyen	I.C. (95 %)	N	
2007	100	-	1	100
2009	100	-	1	100
2011	97	94 - 100	30	100/76-99
2012	100	100 - 100	30	100
2013	100	100 - 100	30	100
2014	100	100 - 100	30	100
2015	98	96,7 - 100	30	100/76-99
2016	100	98,7- 100	30	100/76-99

3.4.2. Ars en Ré int HZN (Fiers d'Ars, Pertuis Breton)

En cette station, aucun pied de *Zostera marina* var *angustifolia* n'a été observé.

Après vérification par le logiciel Image J des clichés présentant des taux de recouvrement inférieurs à 100 %, une seule correction a été apportée aux estimations visuelles de terrain avec une réévaluation d'un 0,625 en 0,875. En 2012, trois quadrats initialement estimés à 0,625 ont été corrigés en 0,875 (**Figure 36**).

VALIDATION ImageJ 1.44p							2012
Taux moyen ± IC(95%)						34.6%	± 10.6%
	A	B	C	D	E	F	
1	0.375	0.875	0.125	0.875	0.625	0.875	
2	0.875	0.375	0.125	0.875	0.125	0.625	
3	0.375	0.125	0.375	0.125	0.375	0.125	
4	0.125	0.125	0.375	0.125	0.125	0.375	
5	0.125	0	0.125	0.125	0.125	0.375	

VALIDATION ImageJ 1.44p							2013
Taux moyen ± IC(95%)						19.2%	± 6.2%
	A	B	C	D	E	F	
1	0.125	0.125	0.375	0.125	0.125	0.375	
2	0.125	0.125	0.625	0.375	0.125	0.625	
3	0.125	0.125	0	0.125	0.375	0.375	
4	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	
5	0.375	0.125	0	0.125	0	0	

VALIDATION ImageJ 1.44p							2014
Taux moyen ± IC(95%)						24.2%	± 10.4%
	A	B	C	D	E	F	
1	0.125	0.875	0.875	0.125	0.125	0.125	
2	0.375	0.125	0.375	0.125	0.125	0.125	
3	0.625	0.875	0.125	0	0.125	0	
4	0.625	0.125	0.125	0	0	0.125	
5	0.625	0.125	0.125	0.125	0	0	

VALIDATION ImageJ 1.44p							2015
Taux moyen ± IC(95%)						41.3%	± 13.9%
	A	B	C	D	E	F	
1	0.375	0.625	0.125	0	0	0.125	
2	0.625	0.625	0.875	0.875	0.125	0.125	
3	0.875	0.875	0	0.125	0.125	0.125	
4	0.625	0.875	0	0	0.125	0.875	
5	1	0.875	0.875	0.375	0.125	0	

VALIDATION ImageJ 1.44p							2016
Taux moyen ± IC(95%)						75.4%	± 8.7%
	A	B	C	D	E	F	
1	0.625	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	
2	0.625	0.375	0.875	0.375	0.875	0.625	
3	0.875	0.875	1	0.625	0.875	0.875	
4	1	1	0.625	0.625	0.375	0.875	
5	1	1	0.875	0.875	0.125	0.375	

Figure 36 : Taux de recouvrement (échelle de 0 à 1) validés par points sur la grille échantillonnée depuis 2012 sur la station « Ars en Ré int HZN » à herbier de la zostère naine.

Contrat de prestation 2016 5 5052 8205 : herbier de *Zostera noltei*

La moyenne du taux de recouvrement 2016 s'établit à 75 % avec un intervalle de confiance à 95 % de 67-84 % (**Figure 36, Tableau 20**). En comparaison, les moyennes du taux de recouvrement 2012 et 2014 variaient de 35 % à 19 %. Du fait des chevauchements ou non-chevauchement des intervalles de confiance, il est possible de détecter qu'en 2013 l'herbier était de moins grande densités alors qu'il ne semble pas exister de différences significatives entre les autres années, les densités d'herbier en 2015 restant dans le même ordre de grandeur que celles des années 2012, et 2014, même la classe de taux de recouvrement atteint localement les 51-75 %. Il faut donc noter un réel rétablissement de l'herbier d'Ars en Ré int HZN en 2016 avec des taux moyens de recouvrement du double à plus du tripe de ceux des années antérieures.

En regard des variations interannuelles (**Tableau 20**) et des classes de taux de recouvrement adoptées dans le protocole (**Tableau 1**), les taux de recouvrement observés sur la station « Ars en Ré int HZN » variaient entre trois classes de 1-25 % à 51-75 %, avec un minimum observé en 2013 et un maximum en 2015, ce maximum étant chevauchant avec la classe de recouvrement intermédiaire de 26-50 %. La tendance à l'amélioration est nette en 2016 avec un herbier dans la classe 76-99 %.

Tableau 20 : Taux de recouvrement avec intervalle de confiance à 95 % de l'herbier de la zostère naine échantillonné annuellement de 2012 à 2014 à la station « Ars en Ré int HZN ».

Zostère naine	Taux de recouvrement (%)			
Ars en Ré int HZN	Moyen	I.C. (95 %)	N	Classe
2012	35	24 – 46	30	1-25/26-50
2013	19	13 – 25	30	1-25
2014	24	14 - 34	30	1-25/26-50
2015	41	27 – 55	30	26-50/51-75
2016	75	67 - 84		51-75/76-99

Le site du Fiers d'Ars est activement pêché depuis des années pour les palourdes et autres coquillages par des pêcheurs de loisirs et des pêcheurs non déclarés auprès des professionnels. En 2013 il avait été noté un très fort impact visuel des activités de pêche à pied sur les sédiments du site avec la présence de piétinements et ou de grattages divers quasi systématiques sur toute la grille échantillonnée (**Figure 37**). Cet impact était moins marqué en 2014-2015 et cette tendance se confirme pour 2016 même si l'herbier reste localement abondamment piétiné (**Figure 37**).

Contrat de prestation 2016 5 5052 8205 : herbier de *Zostera noltei*



A



B



C



D

Figure 37 : Quadrats avec traces de piétinement ou de fouille pour la pêche à la palourde sur la grille de la station « Ars en Ré int HZN" comme noté en 2013 (A et B) et 2016 (A et B).

3.4.2. Lay Crochon 1982 int HZN

En cette station, aucun pied de *Zostera marina* var *angustifolia* n'a été observé.

Après vérification par le logiciel Image J des clichés présentant des taux de recouvrement inférieurs à 100 % une seule correction n'a été apportée sur les observations visuelles avec un recouvrement de 0,875 mis à 0,625.

VALIDATION ImageJ 1.44p							2011		
Taux moyen ± IC(95%)							50.0%	±	10.0%
	A	B	C	D	E	F			
1	0.125	0.875	0.625	0.875	0.625	0.625			
2	0.625	0.625	0.875	0.625	0.875	0.625			
3	0.125	0.375	0.375	0.375	0.375	0.625			
4	0.125	0.125	0.375	0.625	0.875	0.625			
5	0.125	0.125	0.125	0.875	0.375	0.375			
VALIDATION ImageJ 1.44p							2013		
Taux moyen ± IC(95%)							22.9%	±	6.8%
	A	B	C	D	E	F			
1	0	0.375	0.625	0.375	0	0.125			
2	0.375	0.125	0.125	0.125	0.375	0.375			
3	0.375	0.125	0.625	0.375	0.125	0.375			
4	0	0.125	0.125	0.125	0.125	0.625			
5	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125			
VALIDATION ImageJ 1.44p							2015		
Taux moyen ± IC(95%)							15.4%	±	7.9%
	A	B	C	D	E	F			
1	0	0	0.125	0.625	0.125	0.625			
2	0	0	0	0.125	0.625	0.625			
3	0	0	0.125	0.125	0.125	0.375			
4	0	0	0	0	0	0			
5	0.375	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125			
VALIDATION ImageJ 1.44p							2012		
Taux moyen ± IC(95%)							66.7%	±	10.6%
	A	B	C	D	E	F			
1	0.625	0.875	0.625	0.625	0	0			
2	0.625	0.375	0.875	0.875	0.625	0.125			
3	0.625	0.875	0.875	0.875	0.625	0.625			
4	0.125	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875			
5	0.375	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875			
VALIDATION ImageJ 1.44p							2014		
Taux moyen ± IC(95%)							14.2%	±	8.0%
	A	B	C	D	E	F			
1	0	0	0.125	0.125	0.125	0.875			
2	0	0	0.125	0.125	0.375	0.875			
3	0	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125			
4	0.125	0	0	0	0.125	0.125			
5	0.125	0.125	0	0	0.125	0.125			
VALIDATION ImageJ 1.44p							2016		
Taux moyen ± IC(95%)							20.8%	±	9.9%
	A	B	C	D	E	F			
1	0.625	0.125	0	0.625	0	0			
2	0.625	0.625	0.125	0	0	0			
3	0.625	0.375	0	0	0	0			
4	0.625	0.375	0.375	0	0	0			
5	0.125	0	0.625	0.375	0	0			

Figure 38 : Taux de recouvrement par points sur la grille échantillonnée depuis 2011 sur la station « Lay Crochon 1982 int HZN » à herbier de la zostère naine.

Contrat de prestation 2016 5 5052 8205 : herbier de *Zostera noltei*

A part en 2012, la structure spatiale de l'herbier du Lay est complexe avec une zone de plus ou moins forts taux de recouvrement plus ou moins étendue (**Figure 38**).

Un taux de recouvrement moyen de 21 ± 10 % est obtenu en 2016 (**Tableau 21**). La diminution de près de 9 % du taux de recouvrement entre 2013 et 2014 n'était pas significative mais les valeurs de 2015 et 2016 confirment la diminution puis le maintien des taux de recouvrement à des valeurs proches des 20% jusqu'à 30%. Aucune trace de piétinement n'est visible sur les 30 points de la grille en 2016. Les activités de pêche à pied pourtant existantes sur l'estuaire du Lay se limitent à la bordure du chenal comme déjà observé en 2013 et 2014.

En regard des variations interannuelles (**Tableau 21**) et des classes de taux de recouvrement adoptées dans le protocole (**Tableau 1**), les taux de recouvrement observés sur la station « Lay Crochon 1982 int HZN » varient entre quatre classes de 1-25 % jusqu'à 76-99 %. Le minimum a été observé en 2014-2015 et le maximum en 2012. Ce maximum étant chevauchant avec la classe de recouvrement 51-75 %, l'année 2012 n'est pas différente de 2011. En revanche, les années 2014 et 2015 sont singulières et présentent les plus faibles taux de recouvrement. Cette évolution est probablement à mettre en relation avec la dynamique hydrosédimentaire du crochon qui soit s'envase (comme de 2011 à 2013, puis 2015) soit s'ensable (comme en 2014 et 2016).

Tableau 21 : Taux de recouvrement avec intervalle de confiance à 95 % de l'herbier de la zostère naine échantillonné annuellement depuis 2011 à la station « Lay Crochon 1982 int HZN ».

Zostère naine Lay Crochon 1982 int HZN	Taux de recouvrement (%)			N	Classe
	Moyen	I.C. (95 %)			
2011	50	40 – 60		30	26-50/51-75
2012	67	56 – 78		30	51-75/76-99
2013	23	16 – 30		30	1-25/26-50
2014	14	6 - 20		30	1-25
2015	15	7 – 23		30	1-25
2016	21	11 – 31		30	1-25/26-50

3.5. Zostère : redécouverte de *Zostera marina* sur les estrans du nord de l'île de Ré

La présence de *Zostera marina* sur l'île de Ré est attestée dans les années 1920 par les recherches biogéographiques réalisées par de Beauchamp (1920, 1923) avec des données cartographiques reprises ultérieurement dans les synthèses de Papy (1941) ou de Lancelot (1945, 1961). La disparition presque totale des grands herbiers de *Zostera marina* dans les années 1930 à l'échelle de tout l'Atlantique Nord a été attribuée à une maladie appelée « wasting disease » mais en conjonction de stress liés à des variations climatiques à l'échelle de l'Europe du Nord (den Hartog 1987, den Hartog & Hily 1997). La conséquence en a été pour l'île de Ré une destruction des herbiers de *Zostera marina* jugée à l'époque encore partielle comme attestée par les observations réalisées à l'échelle nationales en 1933 par les Affaires Maritimes (Godet *et al.* 2008).

Les observations ultérieures des années 1945 à 1970 s'accordent sur l'absence d'herbier de *Zostera marina* sur l'île de Ré sauf très localement comme par exemple pour la côte Nord de Ré dans les marais littoraux de Loix (Faure 1967, 1969, 1972) ou aux Portes en Ré (Callame 1958, 1961) et pour la côte Sud de Ré au Martrais (Hily 1976). La rareté de l'espèce sur l'île de Ré conduit den Hartog (1997) à partir de ses observations de 1994 à parler de disparition totale en liaison de surcroît avec la présence proliférante de l'algue brune introduite *Sargassum muticum*. Cette espèce d'algue est en effet connue pour coloniser les cuvettes littorales où les substrats mixtes hétérogènes sont favorables à la régénération naturelle des herbiers (den Hartog & Hily 1997).

Les observations botaniques de Le Gall dans les années 2000 sur le pourtour Ouest et Sud de l'île de Ré ont permis de localiser des herbiers de *Zostera marina* de plusieurs centaines de m² sur deux secteurs au large de Foirouse en 2001 et 2003 puis au Pas de Radia en 2003 (Le Gall 2005). Ces observations confirmaient la présence de *Zostera marina* sur les estrans de l'île de Ré en quelques populations en ce début des années 2000. Elles nuançaient également l'hypothèse de sa disparition totale antérieurement suggérée par den Hartog (1997) et soulevaient l'hypothèses de populations relictées sur Ré ou d'apports distants en graines suffisant. Des prospections complémentaires réalisées au printemps-été 2003 et 2004 confirmaient non seulement la présence de l'espèce sur les deux sites mais permettaient d'observer une autre population observée en 2004 sur les estrans de Sainte-Marie au Sud de l'île. Des prospections en 2011 n'ont pas permis de relocaliser les trois sites observés, ce qui laissait supposer un impact des tempêtes hivernales, par exemple Xynthia en février 2010, sur la stabilité des substrats sableux colonisés par *Zostera marina* sur le pourtour très exposé de l'île de Ré. Cependant, cela ne permet pas de conclure à la disparition de l'espèce des estrans rétais puisque des échouages de feuilles fraîches étaient observés, comme par exemple en août 2011 au pied des remparts de Saint-Martin de Ré situé sur la côte Nord de l'île (P. Le Gall, com. pers.).

Des prospections réalisées dans les années 2013-2014 par le CEREMA sur le nord de l'île de Ré ont effectivement localisé un herbier à *Zostera marina* sur les estrans de Saint-Martin de Ré. Vérifier cette information et la valider permettraient alors de disposer d'une information essentielle au calcul de l'indicateur angiospermes (Auby *et al.* 2010b, Auby *et al.* 2014) pour la masse d'eau côtière « Pertuis Breton ». En effet, tout changement de la composition taxinomique par rapport aux conditions de référence se traduit par une modification de la note donnée à l'EQR (**Tableau 9**). La réapparition ou la non disparition de *Zostera marina* par rapport à une situation de disparition de l'espèce se traduit par un EQR de 1 au lieu de 0,7.

Contrat de prestation 2016 5 5052 8205 : herbier de *Zostera noltei*

Des prospections spécifiques sur la côte Nord de l'île de Ré ont été menées les 27 et 28 octobre 2015 sur les secteurs de La Flotte et de Saint-Martin de Ré. Elles ont permis de trouver :

- à La Flotte en laisses de mer de très nombreux fragments de *Zostera marina* en échouage (**Figure 39**) sans qu'il soit possible de détecter sur l'estran attenant en contrebas une population de *Zostera marina* en place. Une telle population pourrait avoir existé à La Flotte dans les cuvettes intertidales situées en bas des parcs ostréicoles. Les fragments en échouage étaient soit anciens et dégradés soit frais.



Figure 39 : Présence de *Zostera marina* en laisses de mer le 27/10/2015 à la Flotte (est de la plage de l'Arnerault et estran en contrebas de la pointe des Barres).

- à Saint-Martin de Ré quelques fragments tous frais de *Zostera marina* en échouage soit en laisses de mer en haut d'estran soit sur la zone intertidale à marée basse. Les prospections de la zone ostréicole ont permis de détecter un parc ostréicole protégé par d'anciens muret avec une population de *Zostera marina* en place dans des sédiments mixtes hétérogènes (**Figure 40**). La disposition du parc entouré de murets permet le maintien pendant la marée basse d'une cuvette qui ne se vide que progressivement créant de fait des conditions favorables à l'implantation d'un herbier intertidal de *Z. marina*. Selon den Hartog & Hily (1997) il est généralement admis que les herbiers de *Z. marina* subtidaux sont pérennes, tandis que les herbiers les plus hauts sur l'estran peuvent être annuels et dépendant pour se maintenir de la germination des graines.

Contrat de prestation 2016 5 5052 8205 : herbier de *Zostera noltei*

Les longueurs maximales de feuille étaient sur cet herbier de 30 à 70 cm pour des densités de pieds de 160 à 520 pied par m⁻², l'ensemble de l'herbier faisant environ 50 m².



Figure 40 : Présence de *Zostera marina* en laisses de mer le 28/10/2015 au pied de la citadelle de Saint-Martin de Ré et sur les estrans de la plage de La Cible en zone ostréicole.

Aucune nouvelle prospection n'a été réalisée en 2016 en Ré sur ce site.

3.6. Les oiseaux herbivores consommateurs de zostères

Plusieurs espèces d'oiseaux herbivores consomment des zostères pour tout ou partie de leur régime alimentaire (Dalloyau 2008, Dalloyau & Robin 2013). Ce sont avant tout les bernaches cravant et parmi celles-ci principalement la bernache cravant à ventre sombre *Branta bernicla bernicla*. D'autres espèces peuvent être consommatrices occasionnelles de zostères, ce sont les Canards siffleurs *Anas penelope*, les Cygnes tuberculés *Cygnus olor* et les Oies cendrées *Anser anser*. Toutes ces espèces font l'objet de comptages réguliers de la part de réseaux d'observation en liaison avec les réserves naturelles et la LPO.

Un premier ordre de grandeur concernant les effectifs hivernaux de ces espèces sur l'île de Ré peut être obtenu à partir des comptages réalisés à la mi-janvier de chaque année. Ces comptages sont synthétisés par Wetlands International et sont mis à disposition par la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) (<http://www.lpo.fr/etudes/wetlands/index.shtml>) sous forme de fiches spécifiques ou d'analyse de tendance démographique (Deceuninck *et al.* 1999, Deceuninck & Mahéo 2000, Deceuninck & Maillet 2001, Deceuninck *et al.* 2002, 2003, 2004a, Deceuninck *et al.* 2004b, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, Deceuninck *et al.* 2014, Deceuninck *et al.* 2015, Deceuninck *et al.* 2016).

La phénologie de la migration, en particulier des bernaches cravant à ventre sombre, peut être approchée à partir des comptages mensuels réalisés par la LPO et les observateurs liés à la Réserve Naturelle de Lilleau les Niges (<http://www.lilleau.niges.reserves-naturelles.org/>) dans le Fier d'Ars. Le détail des comptages mensuels pour la Fosse de Loix et la pointe du Grouin permet de préciser l'importance des deux secteurs par rapport à l'ensemble de l'île de Ré (Lemesle J.-C., com. pers, Jean-Christophe.Lemesle@lpo.fr).




Figure 41 : Effectif de Bernache cravant sur l'ensemble de l'île de Ré (mi janvier) et les secteurs de la Fosse de Loix et de la pointe du Grouin (variation mensuelle pendant la période d'hivernage) respectivement sur les périodes 2000-2015 (d'après Wetlands / LPO) et 2001-2008 (d'après Lemesle J.-C., com. pers.)

Contrat de prestation 2016 5 5052 8205 : herbier de *Zostera noltei*

Les Bernaches cravant sur l'île de Ré représentent de 8 à 11 % de la population hivernante en France et donc plus de 50 % de la population hivernante en Charente-Maritime. Les comptages effectués à la mi-janvier laissent apparaître sur la période 2000-2015 une stabilité des effectifs dans une fourchette de variation de 7500 à 13300 individus avec un pallier autour de 9500-9800 depuis 2010 et une reprise depuis 20105. De tels effectifs permettent de placer l'île de Ré entre le 2^{ème} et 3^{ème} rang parmi les 10 premiers sites nationaux pour leurs effectifs de Bernaches cravant après Arcachon et le golfe du Morbihan. Ils permettent au site de remplir l'un des critères RAMSAR de site d'importance internationale pour cette espèce, les effectifs dénombrés atteignant 1 % de la population biogéographique régionale. La phénologie de la migration est centrée sur novembre à décembre de chaque année pour les sites de la Fosse de Loix et de la pointe du Grouin (**Figure 41**).

Les canards siffleurs sur l'île de Ré sont très peu abondants et représentent généralement des effectifs inférieurs à 100 individus. Sur la Fosse de Loix, les comptages mensuels montrent aussi une présence très variable de quelques dizaines d'individus. Les comptages effectués à la mi-janvier laissent apparaître sur la période 2000-2008 une relative stagnation des effectifs autour de la centaine d'individus. Les plus forts effectifs ont été observés lors de l'hiver 2002. De tels effectifs ne permettent pas de placer l'île de Ré parmi les 10 premiers sites nationaux pour leurs effectifs de Canards siffleurs (**Tableau 22**).

Les cygnes tuberculés étaient présents de façon anecdotique sur l'île de Ré puisque les comptages de mi-janvier évaluent les effectifs entre 20 et 50 individus.

Le rapport Wetlands International – LPO de 2017 concernant la synthèse des dénombrements d'anatidés et de foulques hivernant en France à la mi-janvier 2016 n'étant pas disponible, les chiffres de 2016 ne sont pas comptabilisés.

Tableau 22 : Effectifs de Bernaches cravant et Canards siffleurs à la mi-janvier des années 2000 à 2015 sur l'île de Ré (d'après Wetlands International & LPO)

Site	Année	Espèce	Effectif mi-janvier	Rang sur 10 premiers sites nationaux	RAMSAR critère 6
Ile de Ré	2000	Bernache cravant	9143	2	Oui
Ile de Ré	2001	Bernache cravant	7505	2	Oui
Ile de Ré	2002	Bernache cravant	12189	2	Oui
Ile de Ré	2003	Bernache cravant	8519	2	Oui
Ile de Ré	2004	Bernache cravant	10120	2	Oui
Ile de Ré	2005	Bernache cravant	9767	3	Oui
Ile de Ré	2006	Bernache cravant	12376	3	Oui
Ile de Ré	2007	Bernache cravant	11294	2	Oui
Ile de Ré	2008	Bernache cravant	11736	2	Oui
Ile de Ré	2009	Bernache cravant	13352	2	Oui
Ile de Ré	2010	Bernache cravant	9350	2	Oui
Ile de Ré	2011	Bernache cravant	9891	2	Oui
Ile de Ré	2012	Bernache cravant	9699	3	Oui
Ile de Ré	2013	Bernache cravant	8753	2	Oui
Ile de Ré	2014	Bernache cravant	8575	3	Oui
Ile de Ré	2015	Bernache cravant	11173	3	Oui
	2016				

Contrat de prestation 2016 5 5052 8205 : herbier de *Zostera noltei*

Ile de Ré	2000	Canard siffleur	> 101	-	Non
Ile de Ré	2001	Canard siffleur	1 – 99	-	Non
Ile de Ré	2002	Canard siffleur	100 - 419	-	Non
Ile de Ré	2003	Canard siffleur	> 1-99	-	Non
Ile de Ré	2004	Canard siffleur	> 1-99	-	Non
Ile de Ré	2005	Canard siffleur	> 1-99	-	Non
Ile de Ré	2006	Canard siffleur	> 1-99	-	Non
Ile de Ré	2007	Canard siffleur	> 1-99	-	Non
Ile de Ré	2008	Canard siffleur	> 1-99	-	Non
Ile de Ré	2009	Canard siffleur	> 1-100	-	Non
Ile de Ré	2010	Canard siffleur	> 1-100	-	Non
Ile de Ré	2011	Canard siffleur	> 1-100	-	Non
Ile de Ré	2012	Canard siffleur	> 1-100	-	Non
Ile de Ré	2013	Canard siffleur	> 1-100	-	Non
Ile de Ré	2014	Canard siffleur	> 1-100	-	Non
Ile de Ré	2015	Canard siffleur	> 1-100	-	Non
	2016				

4. Calcul de l'indicateur « angiospermes »

4.1. Pertuis Breton FRGC53

L'indicateur français « angiospermes » repose sur trois métriques :

- 1) la composition taxinomique : une valeur d'EQR de 0,7 était donnée jusqu'à présent du fait de la disparition supposée avérée de *Zostera marina* sur le pourtour Nord de Ré. Le contraire est démontré depuis 2015 et une valeur d'EQR de 1 doit donc être adoptée ;
- 2) l'extension : une valeur d'EQR de 0,68 est donnée du fait d'une perte de 16 % en superficie entre le maximum connu de 2006 (673 ha) et la dernière estimation de 2014 (566 ha)
- 3) la densité : une valeur d'EQR de 1 est donnée comme moyenne de 1 et 0,96 obtenu après analyse des variations temporelles des taux de recouvrement sur la station « Plage de la Charge Neuve int HZN » et la station « Ars en Ré int HZN » dans le Fiers d'Ars.

Pour la masse d'eau côtière Pertuis breton FRGC53, l'indicateur « angiospermes » indique un Très Bon état écologique.

2016	Indices			Indicateur
	Composition	Extension	Densité	Angiospermes
EQR	1	0,68	1	0,89
Altérations	Amélioration ou pas de modification visible	Faibles	Faibles	
Etat				Très Bon état

4.2. Estuaire du Lay FRGT30

L'indicateur français « angiospermes » repose sur trois métriques :

- 1) la composition taxinomique : une valeur d'EQR de 1 est donnée du fait d'aucune disparition d'espèce de zostère ;
- 2) l'extension : une valeur d'EQR de 1 est donnée du fait d'une stabilité globale des superficies d'herbier entre 2010 (17,6 ha) et 2014 (17,8 ha) malgré des changements de répartition de l'herbier le long du chenal ;
- 3) la densité : une valeur d'EQR de 0,205 est donnée du fait de la baisse sévère (69 %) des taux de recouvrement en comparaison de la meilleure situation.

Pour la masse d'eau de transition Estuaire du Lay FRGT30, l'indicateur « angiospermes » indique un Bon état écologique.

2016	Indices			Indicateur
	Composition	Extension	Densité	Angiospermes
EQR	1	1	0,205	0,73
Altérations	Pas de modification	Pas de modification	Sévères	
Etat				Bon état

4.3. Bilan du temps agent affecté au contrôle de surveillance DCE

Le temps agent affecté aux suivis et analyses comprend le temps passé aux :

- préparation des missions à la mer ;
- préparation et analyses granulométriques des sédiments ;
- préparation et analyses des taux de matières organiques des sédiments ;
- préparation et analyses des biomasses macroalgales ;
- vérifications des taux de recouvrement par analyse d'images ;
- saisie informatique des résultats
- saisie informatique sous la base de données Quadrigé² des métadonnées, photos et données ;
- analyses des résultats, mise en forme ;
- rédaction des rapports intermédiaires (1^{er} et 2^{ème}) et du rapport final.

Le temps agent est détaillé pour chacune de ces opérations (**Tableau 23**)

Au total, les suivis du contrôle de surveillance 2016 DCE des herbiers à zostère naine des trois stations herbier « Ars en Ré int HZN », « Plage de la Charge Neuve int HZN » et « Lay Crochon 1982 int HZN » a mobilisé au total 24 personnes jours ouvrés (**Tableau 23**).

Ce chiffre correspond à 1,2 ETP à raison de 20 jours ouvrés par mois.

Tableau 23 : Effort en personne-jour pour chacune des opérations afférentes au contrôle de surveillance 2016 des herbiers à zostère naine des 3 stations « Plage de la Charge Neuve int HZN », « Ars en Ré int HZN » et « Lay Crochon 1982 int HZN ».

Opération	Nombre (personne-jour)
Préparation matériel mission	3
Mission mer	7
Prospection <i>Zostera marina</i>	-
Granulométrie	2
Matière organique (sédiment + macroalgues)	2
Validation ImageJ 1.44p	3
Saisie informatique des données	1
Saisies et contrôle Quadrigé ² (métadonnées, données)	2
Rédaction	
- rapport intermédiaire	2
- rapport final	2
Total	24

5. Bilan des saisies dans la base Quadrigé²

La saisie des métadonnées et des données herbier de *Zostera noltei* est à jour pour les stations de la masse d'eau côtière « Pertuis Breton », Ars en Ré int HZN et Plage de la Charge Neuve int HZN et pour la station de la masse d'eau de transition « Estuaire du Lay », Lay Crochon 1982 int HZN tout comme elle l'est pour les sites DCE plus méridionaux dans la masse d'eau FRFC02 Pertuis Charentais suivis par le LIENSs (Tableau 24).

La saisie concerne le contrôle et la validation des:

- les métadonnées y compris les clichés photographiques des stations et des quadrats de chaque grille ;
- les données herbier, contrôlées et validées, les données granulométriques et des taux de matière organique.

Tableau 24 : Bilan des saisies dans la base de données Quadrigé² pour les suivis herbier de *Zostera noltei* codification des couleurs :

■ Saisi, contrôlé et validé, ■ Saisi, contrôlé, ■ Saisi (non contrôlé, non validé), □ A saisir,
Case grisée : Hors DCE, Case vide : pas de suivi DCE prévu au RCS.

Programme	Lieu id	Masse Eau	Lieu libellé	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Herbier		FRFC02	Bellevue-Perrotine int HZN							■	■	■	■	■
Herbier		FRFC02	Le Château d'Oléron int HZN							■	■	■	■	■
Herbier		FRFC02	Les Doux int HZN		■	■	■			■	■	■	■	■
Herbier		FRFC02	Ade int HZN								■	■	■	■
Herbier		FRGC53	Ars en Ré int HZN, mnémonique 076-P-075							■	■	■	■	■
Herbier		FRGC53	Plage de la Charge Neuve int HZN int HZN, mnémonique 076-P-058	■	■		■		■	■	■	■	■	■
Herbier		FRGT30	Lay crochon 1982 int HZN Mnémonique 076-P-073						■	■	■	■	■	■

Contrat de prestation 2016 5 5052 8205 : herbier de *Zostera noltei*

Tableau 24 : suite.

HZN_LIENSs_2012-2016 - Masses d'eau DCE (2009)	HZN_LIENSs_2012-2016 - Masses d'eau DCE (2009)	Symbologie spécifique pour les passages/prélèvements/échantillons
<ul style="list-style-type: none"> ▶ ■ ADE int HZN - 16/09/2016 - 12:31:00 <ul style="list-style-type: none"> ■ Carottier PVC diam. 3 cm - MO1 à 9 <ul style="list-style-type: none"> V+ Sédiment, substrat meuble ■ Carottier PVC diam. 9 cm - Granulo <ul style="list-style-type: none"> V+ Sédiment, substrat meuble ■ Quadrat 50 x 50 cm (0,25 m²) - A1 <ul style="list-style-type: none"> V+ Algue - Macroalgues ▶ ■ Quadrat 50 x 50 cm (0,25 m²) - A2 ▶ ■ Quadrat 50 x 50 cm (0,25 m²) - A3 ▶ ■ Quadrat 50 x 50 cm (0,25 m²) - A4 ▶ ■ Quadrat 50 x 50 cm (0,25 m²) - A5 ▶ ■ Quadrat 50 x 50 cm (0,25 m²) - B1 ▶ ■ Quadrat 50 x 50 cm (0,25 m²) - B2 ▶ ■ Quadrat 50 x 50 cm (0,25 m²) - B3 ▶ ■ Quadrat 50 x 50 cm (0,25 m²) - B4 ▶ ■ Quadrat 50 x 50 cm (0,25 m²) - B5 ▶ ■ Quadrat 50 x 50 cm (0,25 m²) - C1 ▶ ■ Quadrat 50 x 50 cm (0,25 m²) - C2 ▶ ■ Quadrat 50 x 50 cm (0,25 m²) - C3 ▶ ■ Quadrat 50 x 50 cm (0,25 m²) - C4 ▶ ■ Quadrat 50 x 50 cm (0,25 m²) - C5 ▶ ■ Quadrat 50 x 50 cm (0,25 m²) - D1 ▶ ■ Quadrat 50 x 50 cm (0,25 m²) - D2 ▶ ■ Quadrat 50 x 50 cm (0,25 m²) - D3 ▶ ■ Quadrat 50 x 50 cm (0,25 m²) - D4 ▶ ■ Quadrat 50 x 50 cm (0,25 m²) - D5 ▶ ■ Quadrat 50 x 50 cm (0,25 m²) - E1 ▶ ■ Quadrat 50 x 50 cm (0,25 m²) - E2 ▶ ■ Quadrat 50 x 50 cm (0,25 m²) - E3 ▶ ■ Quadrat 50 x 50 cm (0,25 m²) - E4 ▶ ■ Quadrat 50 x 50 cm (0,25 m²) - E5 ▶ ■ Quadrat 50 x 50 cm (0,25 m²) - F1 ▶ ■ Quadrat 50 x 50 cm (0,25 m²) - F2 ▶ ■ Quadrat 50 x 50 cm (0,25 m²) - F3 ▶ ■ Quadrat 50 x 50 cm (0,25 m²) - F4 ▶ ■ Quadrat 50 x 50 cm (0,25 m²) - F5 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ ■ ADE int HZN - 20/09/2013 - 11:31:00 ▶ ■ ADE int HZN - 10/09/2014 - 10:46:00 ▶ ■ ADE int HZN - 11/09/2015 - 10:52:00 ▶ ■ ADE int HZN - 16/09/2016 - 12:31:00 ▶ ■ Ars en Ré int HZN - 20/09/2012 - 12:08:00 ▶ ■ Ars en Ré int HZN - 10/09/2013 - 12:46:00 ▶ ■ Ars en Ré int HZN - 09/09/2014 - 10:37:00 ▶ ■ Ars en Ré int HZN - 14/09/2015 - 10:56:00 ▶ ■ Ars en Ré int HZN - 05/09/2016 - 13:59:00 ▶ ■ Bellevue - Perrotine int HZN - 03/09/2012 - 11:26:00 ▶ ■ Bellevue - Perrotine int HZN - 19/09/2013 - 09:31:00 ▶ ■ Bellevue - Perrotine int HZN - 22/09/2014 - 09:18:00 ▶ ■ Bellevue - Perrotine int HZN - 17/09/2015 - 12:16:00 ▶ ■ Bellevue - Perrotine int HZN - 21/09/2016 - 12:36:00 ▶ ■ Lay Crochon 1982 int HZN - 05/09/2012 - 11:50:00 ▶ ■ Lay Crochon 1982 int HZN - 25/09/2013 - 11:57:00 ▶ ■ Lay Crochon 1982 int HZN - 24/09/2014 - 09:54:00 ▶ ■ Lay Crochon 1982 int HZN - 30/09/2015 - 12:17:00 ▶ ■ Lay Crochon 1982 int HZN - 15/09/2016 - 09:53:00 ▶ ■ Le Château d'Oléron int HZN - 04/09/2012 - 11:46:00 ▶ ■ Le Château d'Oléron int HZN - 17/09/2013 - 09:50:00 ▶ ■ Le Château d'Oléron int HZN - 11/09/2014 - 11:24:00 ▶ ■ Le Château d'Oléron int HZN - 15/09/2015 - 11:37:00 ▶ ■ Le Château d'Oléron int HZN - 16/09/2016 - 10:12:00 ▶ ■ Les Doux int HZN - 14/09/2012 - 08:13:00 ▶ ■ Les Doux int HZN - 18/09/2013 - 10:38:00 ▶ ■ Les Doux int HZN - 23/09/2014 - 10:06:00 ▶ ■ Les Doux int HZN - 17/09/2015 - 14:30:00 ▶ ■ Les Doux int HZN - 21/09/2016 - 15:13:00 ▶ ■ Plage de la Charge Neuve int HZN - 19/09/2012 - 11:48:00 ▶ ■ Plage de la Charge Neuve int HZN - 09/09/2013 - 12:38:00 ▶ ■ Plage de la Charge Neuve int HZN - 08/09/2014 - 09:33:00 ▶ ■ Plage de la Charge Neuve int HZN - 16/09/2015 - 12:29:00 ▶ ■ Plage de la Charge Neuve int HZN - 01/09/2016 - 09:59:00 	<ul style="list-style-type: none"> : Passage sans état : Passage avec résultats : Passage complètement contrôlé : Passage complètement contrôlé avec résultats : Passage partiellement contrôlé : Passage partiellement contrôlé avec résultats : Passage complètement qualifié : Passage complètement qualifié avec résultats : Passage partiellement qualifié : Passage partiellement qualifié avec résultats : Passage complètement validé : Passage complètement validé avec résultats : Passage partiellement validé : Passage partiellement validé avec résultats <p>La même symbolique est mise en place pour les prélèvements et les échantillons.</p>

6. Bibliographie

- Allard J.** (2008). Enregistrement des changements environnementaux dans les sédiments littoraux : cas des Pertuis Charentais et du Bassin d'Arcachon. Thèse de Doctorat, Université de La Rochelle : 279 pp.
- Auby I., Oger-Jeanneret H., Sauriau P.-G., Hily C. & Barillé L.** (2010a). Angiospermes des côtes françaises Manche-Atlantique. Propositions pour un indicateur DCE et premières estimations de la qualité. Annexe 2 : Fiches contenant les données sur les herbiers des différentes masses d'eau suivies dans le cadre de la DCE. Ifremer, Arcachon, Rapport Ifremer: 152 pp.
- Auby I., Oger-Jeanneret H., Sauriau P.-G., Hily C. & Barillé L.** (2010b). Angiospermes des côtes françaises Manche-Atlantique. Propositions pour un indicateur DCE et premières estimations de la qualité. Ifremer, Arcachon, Rapport Ifremer: 72 pp.
- Auby I., Dalloyau S., Hily C., Oger-Jeanneret H., Plus M., Sauriau P.-G. & Trut G.** (2012). Protocoles de suivi stationnel des herbiers à zostères pour la Directive Cadre sur l'Eau (DCE). Ifremer, Arcachon, RST/LER/MPL/12.17: 20 pp.
- Auby I., Sauriau P.-G., Oger-Jeanneret H., Hily C., Dalloyau S., Rollet C., Trut G., Fortune M., Plus M. & Rigouin L.** (2014). Protocoles de suivi stationnel des herbiers à zostères pour la Directive Cadre sur l'Eau (DCE). *Zostera marina - Zostera noltii*. Version 2. Ifremer, RST/LER/MPL/14.01, Arcachon, RST/LER/MPL/14.01: 42 pp.
- Barillé-Boyer A.-L., Barillé L., Massé H., Razet D. & Héral M.** (2003). Correction for particulate organic matter as estimated by loss on ignition in estuarine ecosystems. *Estuarine, Coastal and Shelf Science*, 58: 147-153.
- Blott S. J. & Pye K.** (2001). Gradstat: a grain size distribution and statistics package for the analysis of unconsolidated sediments. *Earth Surface Processes and Landforms*, 26: 1237-1248.
- Callame B.** (1958). Contribution à l'étude du milieu meuble intercotidal (Côtes Charentaises). Thèse de 3ème Cycle, Université de Paris : 118 pp.
- Callame B.** (1961). Contribution à l'étude du milieu meuble intercotidal (Côtes Charentaises). *Travaux du Centre de Recherches et d'Etudes Océanographiques*, 6: 1-118.
- Chassé C. & Glémarec M.** (1976). Atlas du littoral français. Atlas des fonds meubles du plateau continental du golfe de Gascogne. Cartes biosédimentaires, C.N.E.X.O., I.C.A., Brest: 28 pp.
- Cojan I. & Renard M.** (1999). Sédimentologie. 2^e Cycle. Capes. Agrégation, Dunod, Paris: 418 pp. géologie; synthèse bibliographique; sédiment
- Dalloyau S.** (2008). Réponse fonctionnelle et stratégies d'hivernage chez un anséridé en lien avec la disponibilité de la ressource alimentaire. Cas de la Bernache cravant à ventre sombre (*Branta bernicla bernicla*) en hivernage sur le littoral atlantique (Île d'Oléron – Charente Maritime – 17). Thèse, Ecole Pratique des Hautes Etudes : 118 + annexes pp.
- Dalloyau S. & Robin F.** (2013). Distribution des Bernaches cravants à ventre sombre (*Branta bernicla bernicla*) et disponibilité alimentaire des herbiers à Zostère naine (*Zostera noltei*) : vers une caractérisation de la qualité des habitats intertidaux des Pertuis Charentais. Ligue de Protection des Oiseaux, Rochefort, 77 pp.
- de Beauchamp P.** (1920). Recherches biogéographiques sur la zone des marées à l'île de Ré. *Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences de Paris*, 171: 1233-1236.
- de Beauchamp P.** (1923). Etudes de bionomie intercotidale. Les îles de Ré et d'Yeu. *Archives de Zoologie Expérimentale et Générale*, 61: 455-520.

- Deceuninck B., Maillet N. & France W.** (1999). Oiseaux d'eau hivernant en France en janvier 1998. Synthèse des dénombrements de la mi-janvier 1998. *Ornithos*, 6: 173-177.
- Deceuninck B. & Mahéo R.** (2000). Synthèse des dénombrements et analyse des tendances des limicoles hivernant en France 1978 - 1999. Wetlands International - LPO, 82 pp.
- Deceuninck B. & Maillet N.** (2001). Synthèse des dénombrements d'anatidés et de foulques hivernant en France à la mi-janvier 2000. Wetlands International - Ligue pour la Protection des Oiseaux, Rochefort, 44 pp.
- Deceuninck B., Maillet N., Kerautret L., Dronneau C. & Mahéo R.** (2002). Dénombrements d'anatidés et de foulques hivernant en France - Janvier 2001. Wetlands International - Ligue pour la Protection des Oiseaux, Rochefort, 41 pp.
- Deceuninck B., Maillet N., Kerautret L., Dronneau C. & Mahéo R.** (2003). Synthèse des dénombrements d'anatidés et de foulques hivernant en France à la mi-janvier 2002. Wetlands International - Ligue pour la Protection des Oiseaux, Rochefort, 41 pp.
- Deceuninck B., Maillet N., Kerautret L., Dronneau C. & Mahéo R.** (2004a). Synthèse des dénombrements d'anatidés et de foulques hivernant en France à la mi-janvier 2003. Ligue pour la Protection des Oiseaux, Rochefort, 39 pp.
- Deceuninck B., Maillet N., Ward A., Dronneau C. & Mahéo R.** (2004b). Synthèse des dénombrements d'anatidés et de foulques hivernant en France à la mi-janvier 2004. Ligue pour la Protection des Oiseaux, Rochefort, 41 pp.
- Deceuninck B., Maillet N., Ward A., Dronneau C. & Mahéo R.** (2006). Synthèse des dénombrements d'anatidés et de foulques hivernant en France à la mi-janvier 2005. Ligue pour la Protection des Oiseaux, Rochefort, 40 pp.
- Deceuninck B., Maillet N., Ward A., Dronneau C. & Mahéo R.** (2007). Synthèse des dénombrements d'anatidés et de foulques hivernant en France à la mi-janvier 2006. Ligue pour la Protection des Oiseaux, Rochefort, 40 pp.
- Deceuninck B., Maillet N., Ward A., Dronneau C. & Mahéo R.** (2008). Synthèse des dénombrements d'anatidés et de foulques hivernant en France à la mi-janvier 2007. Ligue pour la Protection des Oiseaux, Rochefort, 40 pp.
- Deceuninck B., Maillet N., Ward A., Dronneau C. & Mahéo R.** (2009). Synthèse des dénombrements d'anatidés et de foulques hivernant en France -mi-janvier 2008 -. Ligue pour la Protection des Oiseaux, Rochefort, 41 pp.
- Deceuninck B., Maillet N., Ward A., Dronneau C. & Mahéo R.** (2010). Synthèse des dénombrements d'anatidés et de foulques hivernant en France - mi-janvier 2009 -. Ligue pour la Protection des Oiseaux, Rochefort, 41 pp.
- Deceuninck B., Maillet N., Ward A., Dronneau C. & Mahéo R.** (2011). Synthèse des dénombrements d'anatidés et de foulques hivernant en France -mi-janvier 2010. Ligue pour la Protection des Oiseaux, Rochefort, 42 pp.
- Deceuninck B., Maillet N., Ward A., Dronneau C. & Mahéo R.** (2012). Synthèse des dénombrements d'anatidés et de foulques hivernant en France -mi-janvier 2011. Ligue pour la Protection des Oiseaux, Rochefort, 43 pp.
- Deceuninck B., Maillet N., Ward A., Dronneau C. & Mahéo R.** (2013). Synthèse des dénombrements d'anatidés et de foulques hivernant en France -mi-janvier 2012. Ligue pour la Protection des Oiseaux, Rochefort, 42 pp.
- Deceuninck B., Quintenne G., Ward A., Dronneau C. & Mahéo R.** (2014). Synthèse des dénombrements d'anatidés et de foulques hivernant en France à la mi-janvier 2013. Ligue pour la Protection des Oiseaux, Rochefort, 74 pp.
- Deceuninck B., Quintenne G., Ward A., Dronneau C. & Dalloyau S.** (2015). Synthèse des dénombrements d'anatidés et de foulques hivernant en France à la mi-janvier

Contrat de prestation 2016 5 5052 8205 : herbier de *Zostera noltei*

2014. Ligue pour la Protection des Oiseaux, MEDDE, BirdLife International, Rochefort, 46 pp.
- Deceuninck B., Quaintenne G., Ward A., Dronneau C. & Dalloyau S.** (2016). Synthèse des dénombrements d'anatidés et de foulques hivernant en France à la mi-janvier 2015. Wetlands International, Ligue pour la Protection des Oiseaux, DEB, Rochefort, 47 pp.
- den Hartog C.** (1987). "Wasting disease" and other dynamic phenomena in *Zostera* beds. *Aquatic Botany*, 27: 3-14.
- den Hartog C.** (1997). Is *Sargassum muticum* a threat to eelgrass beds? *Aquatic Botany*, 58: 37-41.
- den Hartog C. & Hily C.** (1997). Les herbiers de zostères. In : *Les biocénoses marines et littorales françaises des côtes Atlantique, Manche et Mer du Nord*. Dauvin J.-C. (ed.) Collection Patrimoines Naturels / Série Patrimoine Ecologique, Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris, 28: pp. 195-206.
- Faure G.** (1967). Bionomie et écologie de la macrofaune des substrats meubles des côtes charentaises. Note sur l'écologie de *Tellina tenuis* da Costa. Université de Marseille : 86 pp.
- Faure G.** (1969). Bionomie et écologie de la macrofaune des substrats meubles de la côte charentaise. *Tethys*, 1: 751-778.
- Faure G.** (1972). Contribution à l'étude bionomique et écologique des peuplements des plages de l'île de Ré (côte atlantique française). *Tethys*, 3: 619-637.
- Godet L., Fournier J., van Katwijk M., Olivier F., Le Mao P. & Retière C.** (2008). Before and after wasting disease in common eelgrass *Zostera marina* along the French Atlantic coasts: a general overview and first accurate mapping. *Diseases of Aquatic Organisms*, 79: 249-255.
- Hily C.** (1976). Ecologie benthique des pertuis Charentais. Thèse de Doctorat de 3^{ème} Cycle, Université de Bretagne Occidentale : 236 pp.
- Lancelot A.** (1945). Recherches biologiques et océanographiques sur les végétaux marins des côtes françaises entre la Loire et la Gironde. Thèse de Doctorat, Université de Provence : 210 pp.
- Lancelot A.** (1961). Recherches biologiques et océanographiques sur les végétaux marins des côtes françaises entre la Loire et la Gironde. *Revue Algologique*, Hors-Série 2: 1-210.
- Le Gall P.** (2005). Contribution à l'étude de la flore de l'île de Ré (Charente-Maritime). *Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest, Nouvelle Série*, 36: 205-220.
- Papy L.** (1941). La côte atlantique de la Loire à la Gironde. Tome II : l'homme et la mer. Etude de géographie humaine. Publications de l'Université de Bordeaux Vol. 4, Editions Delmas, Bordeaux: 528 pp. géographie; Aiguillon; bourgneuf; loire
- Sauriau P.-G., Ehlinger S., Sauriau F. & Sauriau M.** (2009). Surveillance 2009 flore Masse d'Eau Côtière DCE FRGC53 Pertuis Breton : échantillonnage herbier *Zostera (Zosterella) noltii*. CNRS - Ifremer - Agence de l'Eau Loire Bretagne, La Rochelle, Contrat de prestation Ifremer n° 2009 5 50528212: 30 pp.
- Sauriau P.-G., Aubert F. & Grison J.** (2011). Surveillance flore 2011 herbier de *Zostera noltii* masse d'eau côtière FRGC53 Pertuis Breton, masse d'eau de transition FRGT30 Estuaire du Lay. CNRS - Ifremer - Agence de l'Eau Adour Garonne, La Rochelle, Contrat de prestation Ifremer n° 2011 5 505228215: 30 pp.
- Sauriau P.-G., Aubert F., Cajeri P., Curti C. & Grison J.** (2013). Contrôle de surveillance 2012 herbier de *Zostera (Zosterella) noltei* masse d'eau côtière FRGC53 Pertuis Breton, masse d'eau de transition FRGT30 Estuaire du Lay. CNRS - Ifremer - Agence de l'Eau Adour Garonne, La Rochelle, Contrat d'étude Ifremer 2012 n° 783302: 35 pp.

Contrat de prestation 2016 5 5052 8205 : herbier de *Zostera noltei*


Sauriau P.-G., Aubert F. & Grizon J. (2014). Contrôle de surveillance 2013 de la masse d'eau côtière FRGC53 et de la masse d'eau de transition FRGT30. Partie 3 : herbier de *Zostera (Zosterella) noltei*. CNRS - Ifremer - Agence de l'Eau Adour Garonne, La Rochelle, Contrat d'étude Ifremer 2013 n° 5210063: 46 pp.

Sauriau P.-G., Aubert F., Duvard A., Pineau P. & Lachaussée N. (2015). Contrôle de surveillance DCE 2014 de la masse d'eau côtière FRGC53 Pertuis Breton et de la masse d'eau de transition FRGT30 Estuaire du Lay. Rapport final : partie 2 : suivis stationnels et surfaciques des herbiers de *Zostera (Zosterella) noltei*. CNRS - Ifremer - Agence de l'Eau Adour Garonne, La Rochelle, Contrat de prestations Ifremer 2014 n° 5 50528230: 62 pp.

7. Annexes

7.1. Fiche des stations du réseau de surveillance DCE

http://envlit.ifremer.fr/var/envlit/storage/documents/atlas_DCE/scripts/site/carte.php?map=LB



Contrat de prestation 2016 5 5052 8205 : herbier de *Zostera noltei*

Fiche point réseau [?] [X]



Réseau : Herbiers à *Zostera (Zosterella) noltei*
076-P-075 - Ars en Ré int HZN

Masse d'eau : FRGC53 - Pertuis Breton
 Type de réseau : Contrôle de surveillance
 Longitude (WGS84) : -1.49460671897003

Type masse d'eau : MEC
 Point : 076-P-075 - Ars en Ré int HZN
 Latitude (WGS84) : 46.216910078455

Paramètres	Opérateur terrain	Opérateur labo	Dernière année de prélèvement	Fréquence annuelle	Période	Fréquence dans plan de gestion
Composition taxinomique	CNRS L'Houmeau	CNRS L'Houmeau	2014	1/an	septembre	6 an/6
Densité	CNRS L'Houmeau	CNRS L'Houmeau	2014	1/an	septembre	6 an/6
Extension	CNRS L'Houmeau	CNRS L'Houmeau	2014	1/an	septembre	1 an/6

Dernière mise à jour : 08/09/2015

Fiche point réseau [?] [X]



Réseau : Herbiers à *Zostera (Zosterella) noltei*
076-P-058 - Plage de la Charge Neuve

Masse d'eau : FRGC53 - Pertuis Breton
 Type de réseau : Contrôle de surveillance
 Longitude (WGS84) : -1.423817

Type masse d'eau : MEC
 Point : 076-P-058 - Plage de la Charge Neuve
 Latitude (WGS84) : 46.207528

Paramètres	Opérateur terrain	Opérateur labo	Dernière année de prélèvement	Fréquence annuelle	Période	Fréquence dans plan de gestion
Composition taxinomique	CNRS L'Houmeau	CNRS L'Houmeau	2014	1/an	septembre	6 an/6
Densité	CNRS L'Houmeau	CNRS L'Houmeau	2014	1/an	septembre	6 an/6
Extension	CNRS L'Houmeau	CNRS L'Houmeau	2014	1/an	fin été	1 an/6

Dernière mise à jour : 08/09/2015

Contrat de prestation 2016 5 5052 8205 : herbier de *Zostera noltei*

Fiche point réseau



Réseau : Herbiers à Zostera (Zosterella) noltei
076-P-073 - Lay Crochon 1982 int HZN

Masse d'eau : FRGT30 - Le Lay
Type de réseau : Contrôle de surveillance
Longitude (WGS84) : -1.269656

Type masse d'eau : MET
Point : 076-P-073 - Lay Crochon 1982 int HZN
Latitude (WGS84) : 46.292382

Paramètres	Opérateur terrain	Opérateur labo	Dernière année de prélèvement	Fréquence annuelle	Période	Fréquence dans plan de gestion
Composition taxinomique	CNRS L'Houmeau	CNRS L'Houmeau	2014	1/an	septembre	6 an/6
Densité	CNRS L'Houmeau	CNRS L'Houmeau	2014	1/an	septembre	6 an/6
Extension	CNRS L'Houmeau	CNRS L'Houmeau	2014	1/an	septembre	1 an/6

Dernière mise à jour : 08/09/2015




7.2. Table attributaire du DGPS Trimble GeoXT

E:\DCE\IMPORT_SHAPE_GPS\Dictionary\DCE_herbier_2013.ddf		24/09/2013
DCE_herbier_2013		
Suite prospections sur secteur impactés		
STATION_HERBIER	Point Feature, Label 1 = StationLettre, Label 2 = StationNuméro	
StationLettre	Menu, Required, Required	
A		
B		
C		
D		
E		
F		
StationNuméro	Menu, Required, Required	
1		
2		
3		
4		
5		
Macroalgue	Menu, Required, Normal	
NON	Default	
V		
R		
B		
VR		
VB		
RB		
VRB		
Taux_Recouvrement	Menu, Required, Normal, <i>Zostera noltei</i>	
0 [0]		
1-25 [0.125]		
26-50 [0.375]		
51-75 [0.625]		
76-100 [0.875]		
>100 [1]		
Granulométrie	Menu, Required, Normal	
NON	Default	
G1		
G2		
G3		
Matière_Organique	Menu, Required, Normal	
NON	Default	
MO1		
MO2		
MO3		
MO4		
MO5		
MO6		
MO7		
MO8		
MO9		
Topographie	Menu, Required, Normal	
Bosse		
Creux		
Plat	Default	
Eau	Menu, Required, Normal	
Sec	Default	
Flaque		
Traces	Menu, Required, Normal	
Bernache		
Goeland		
Mulet		
Pied		
Vase		
Autre_Commentaire	Menu, Required, Normal	
Non	Default	
Commentaire	Text, Maximum Length = 100 Required, Normal	

7.3. Analyses granulométriques de 2016


Plage de la Charge Neuve int HZN

SAMPLE STATISTICS						
SAMPLE IDENTITY: Plage de la Charge Neuve_2016			ANALYST & DATE: LIENSs, 2016			
SAMPLE TYPE: Unimodal, Poorly Sorted			TEXTURAL GROUP: Slightly Gravelly Muddy Sand			
SEDIMENT NAME: Slightly Very Fine Gravelly Coarse Silty Fine Sand						
	μm	ϕ	GRAIN SIZE DISTRIBUTION			
MODE 1:	142.5	2.822	GRAVEL: 1.7%	COARSE SAND: 0.8%		
MODE 2:			SAND: 75.8%	MEDIUM SAND: 1.3%		
MODE 3:			MUD: 22.5%	FINE SAND: 41.2%		
D ₁₀ :	13.40	2.649		V FINE SAND: 31.5%		
MEDIAN or D ₅₀ :	118.0	3.083	V COARSE GRAVEL: 0.0%	V COARSE SILT: 3.8%		
D ₉₀ :	159.5	6.221	COARSE GRAVEL: 0.0%	COARSE SILT: 3.8%		
(D ₉₀ / D ₁₀):	11.90	2.349	MEDIUM GRAVEL: 0.0%	MEDIUM SILT: 3.8%		
(D ₉₀ - D ₁₀):	146.1	3.573	FINE GRAVEL: 0.5%	FINE SILT: 3.8%		
(D ₇₅ / D ₂₅):	2.025	1.364	V FINE GRAVEL: 1.1%	V FINE SILT: 3.8%		
(D ₇₅ - D ₂₅):	72.95	1.018	V COARSE SAND: 1.1%	CLAY: 3.8%		
	METHOD OF MOMENTS			FOLK & WARD METHOD		
	Arithmetic	Geometric	Logarithmic	Geometric	Logarithmic	Description
	μm	μm	ϕ	μm	ϕ	
MEAN (\bar{x}):	184.4	73.26	3.771	79.77	3.648	Very Fine Sand
SORTING (σ):	471.7	3.784	1.920	2.594	1.375	Poorly Sorted
SKEWNESS (S_k):	6.802	-0.417	0.417	-0.648	0.648	Very Fine Skewed
KURTOSIS (K):	52.59	3.358	3.358	2.028	2.028	Very Leptokurtic




Ars en Ré int HZN


SAMPLE STATISTICS						
SAMPLE IDENTITY: Ars en Ré_2015_D2			ANALYST & DATE: LIENSs, 2016			
SAMPLE TYPE: Bimodal, Poorly Sorted			TEXTURAL GROUP: Slightly Gravelly Muddy Sand			
SEDIMENT NAME: Slightly Very Fine Gravelly Very Coarse Silty Very Fine Sand						
	μm	ϕ	GRAIN SIZE DISTRIBUTION			
	MODE 1:	90.00	3.483	GRAVEL: 0.6%	COARSE SAND: 0.7%	
MODE 2:	142.5	2.822	SAND: 60.5%	MEDIUM SAND: 1.9%		
MODE 3:			MUD: 38.9%	FINE SAND: 20.4%		
D ₁₀ :	7.973	2.698		V FINE SAND: 37.2%		
MEDIAN or D ₅₀ :	84.57	3.584	V COARSE GRAVEL: 0.0%	V COARSE SILT: 6.5%		
D ₉₀ :	154.1	6.971	COARSE GRAVEL: 0.0%	COARSE SILT: 6.5%		
(D ₉₀ / D ₁₀):	19.32	2.583	MEDIUM GRAVEL: 0.0%	MEDIUM SILT: 6.5%		
(D ₅₀ - D ₁₀):	146.1	4.272	FINE GRAVEL: 0.1%	FINE SILT: 6.5%		
(D ₇₅ / D ₂₅):	5.283	1.794	V FINE GRAVEL: 0.6%	V FINE SILT: 6.5%		
(D ₇₅ - D ₂₅):	99.57	2.401	V COARSE SAND: 0.3%	CLAY: 6.5%		
	METHOD OF MOMENTS			FOLK & WARD METHOD		
	Arithmetic μm	Geometric μm	Logarithmic ϕ	Geometric μm	Logarithmic ϕ	Description
MEAN (\bar{x}):	114.7	41.92	4.576	52.61	4.249	Very Coarse Silt
SORTING (σ):	270.9	4.065	2.023	3.162	1.661	Poorly Sorted
SKEWNESS (S_k):	10.40	-0.084	0.084	-0.554	0.554	Very Fine Skewed
KURTOSIS (K):	124.9	1.868	1.868	0.878	0.878	Platykurtic



SAMPLE STATISTICS						
SAMPLE IDENTITY: Ars en Ré_2015_E2			ANALYST & DATE: LIENSs, 2016			
SAMPLE TYPE: Unimodal, Poorly Sorted			TEXTURAL GROUP: Slightly Gravelly Muddy Sand			
SEDIMENT NAME: Slightly Very Fine Gravelly Very Coarse Silty Very Fine Sand						
	μm	ϕ	GRAIN SIZE DISTRIBUTION			
MODE 1:	142.5	2.822	GRAVEL: 3.1%		COARSE SAND: 1.0%	
MODE 2:			SAND: 70.0%		MEDIUM SAND: 2.2%	
MODE 3:			MUD: 26.9%		FINE SAND: 29.1%	
D ₁₀ :	10.97	2.447			V FINE SAND: 36.8%	
MEDIAN or D ₅₀ :	103.0	3.280	V COARSE GRAVEL: 0.0%		V COARSE SILT: 4.5%	
D ₉₀ :	183.4	6.511	COARSE GRAVEL: 0.0%		COARSE SILT: 4.5%	
(D ₉₀ / D ₁₀):	16.72	2.661	MEDIUM GRAVEL: 0.0%		MEDIUM SILT: 4.5%	
(D ₉₀ - D ₁₀):	172.5	4.064	FINE GRAVEL: 1.4%		FINE SILT: 4.5%	
(D ₇₅ / D ₂₅):	2.718	1.509	V FINE GRAVEL: 1.6%		V FINE SILT: 4.5%	
(D ₇₅ - D ₂₅):	88.83	1.442	V COARSE SAND: 0.9%		CLAY: 4.5%	
	METHOD OF MOMENTS			FOLK & WARD METHOD		
	Arithmetic	Geometric	Logarithmic	Geometric	Logarithmic	Description
	μm	μm	ϕ	μm	ϕ	
MEAN (\bar{x}):	229.8	66.25	3.916	68.57	3.866	Very Fine Sand
SORTING (σ):	652.0	4.352	2.122	3.188	1.873	Poorly Sorted
SKEWNESS (\bar{sk}):	5.371	0.004	-0.004	-0.440	0.440	Very Fine Skewed
KURTOSIS (\bar{k}):	32.01	3.170	3.170	1.770	1.770	Very Leptokurtic




SAMPLE STATISTICS						
SAMPLE IDENTITY: Ars en Ré_2015_E4			ANALYST & DATE: LIENSs, 2016			
SAMPLE TYPE: Unimodal, Poorly Sorted			TEXTURAL GROUP: Slightly Gravelly Muddy Sand			
SEDIMENT NAME: Slightly Very Fine Gravelly Very Coarse Silty Very Fine Sand						
	μm	ϕ	GRAIN SIZE DISTRIBUTION			
MODE 1:	142.5	2.822	GRAVEL: 2.9%		COARSE SAND: 1.2%	
MODE 2:			SAND: 65.4%		MEDIUM SAND: 3.2%	
MODE 3:			MUD: 31.7%		FINE SAND: 24.0%	
D ₁₀ :	9.384	2.296			V FINE SAND: 36.1%	
MEDIAN or D ₅₀ :	96.37	3.375	V COARSE GRAVEL: 0.0%		V COARSE SILT: 5.3%	
D ₉₀ :	203.6	6.739	COARSE GRAVEL: 0.0%		COARSE SILT: 5.3%	
(D ₉₀ / D ₁₀):	21.74	2.935	MEDIUM GRAVEL: 0.0%		MEDIUM SILT: 5.3%	
(D ₉₀ - D ₁₀):	194.2	4.443	FINE GRAVEL: 1.4%		FINE SILT: 5.3%	
(D ₇₅ / D ₂₅):	3.955	1.893	V FINE GRAVEL: 1.4%		V FINE SILT: 5.3%	
(D ₇₅ - D ₂₅):	102.7	1.984	V COARSE SAND: 0.8%		CLAY: 5.3%	
	METHOD OF MOMENTS			FOLK & WARD METHOD		
	Arithmetic	Geometric	Logarithmic	Geometric	Logarithmic	Description
	μm	μm	ϕ	μm	ϕ	
MEAN (\bar{x}):	220.7	58.03	4.107	61.84	4.015	Very Coarse Silt
SORTING (σ):	638.2	4.617	2.207	3.432	1.779	Poorly Sorted
SKEWNESS (S_k):	5.556	0.106	-0.106	-0.425	0.425	Very Fine Skewed
KURTOSIS (K):	34.20	2.810	2.810	1.303	1.303	Leptokurtic




Lay crochon 1982 in HZN

SAMPLE STATISTICS						
SAMPLE IDENTITY: Lay Crochon 1982_2016_A1			ANALYST & DATE: LIENSs, 2016			
SAMPLE TYPE: Trimodal, Very Poorly Sorted			TEXTURAL GROUP: Slightly Gravelly Sandy Mud			
SEDIMENT NAME: Slightly Very Fine Gravelly Fine Sandy Very Coarse Silt						
	μm	ϕ	GRAIN SIZE DISTRIBUTION			
MODE 1:	225.0	2.181	GRAVEL: 0.5%	COARSE SAND: 7.5%		
MODE 2:	450.0	1.181	SAND: 48.8%	MEDIUM SAND: 16.4%		
MODE 3:	71.50	3.818	MUD: 50.7%	FINE SAND: 18.3%		
D ₁₀ :	6.752	1.050		V FINE SAND: 5.4%		
MEDIAN or D ₅₀ :	60.29	4.052	V COARSE GRAVEL: 0.0%	V COARSE SILT: 8.5%		
D ₉₀ :	482.9	7.210	COARSE GRAVEL: 0.0%	COARSE SILT: 8.5%		
(D ₉₀ / D ₁₀):	71.51	8.865	MEDIUM GRAVEL: 0.0%	MEDIUM SILT: 8.5%		
(D ₉₀ - D ₁₀):	476.1	6.180	FINE GRAVEL: 0.1%	FINE SILT: 8.5%		
(D ₇₅ / D ₂₅):	16.82	3.057	V FINE GRAVEL: 0.5%	V FINE SILT: 8.5%		
(D ₇₅ - D ₂₅):	239.7	4.055	V COARSE SAND: 1.2%	CLAY: 8.5%		
	METHOD OF MOMENTS			FOLK & WARD METHOD		
	Arithmetic	Geometric	Logarithmic	Geometric	Logarithmic	Description
	μm	μm	ϕ	μm	ϕ	
MEAN (\bar{x}):	198.9	45.52	4.457	59.23	4.077	Very Coarse Silt
SORTING (σ):	320.5	6.374	2.872	5.212	2.382	Very Poorly Sorted
SKEWNESS (S_k):	5.390	0.242	-0.242	-0.018	0.018	Symmetrical
KURTOSIS (K):	47.82	1.343	1.343	0.708	0.708	Platykurtic



SAMPLE STATISTICS						
SAMPLE IDENTITY: Lay Crochon 1982_2016_B5			ANALYST & DATE: LIENSs, 2016			
SAMPLE TYPE: Bimodal, Very Poorly Sorted			TEXTURAL GROUP: Slightly Gravelly Muddy Sand			
SEDIMENT NAME: Slightly Very Fine Gravelly Very Coarse Silty Fine Sand						
	μm	ϕ	GRAIN SIZE DISTRIBUTION			
MODE 1:	225.0	2.181	GRAVEL: 0.0%		COARSE SAND: 4.4%	
MODE 2:	71.50	3.818	SAND: 59.2%		MEDIUM SAND: 17.0%	
MODE 3:			MUD: 40.8%		FINE SAND: 30.8%	
D ₁₀ :	7.717	1.428			V FINE SAND: 6.5%	
MEDIAN or D ₅₀ :	146.7	2.789	V COARSE GRAVEL: 0.0%		V COARSE SILT: 6.8%	
D ₉₀ :	372.1	7.018	COARSE GRAVEL: 0.0%		COARSE SILT: 6.8%	
(D ₉₀ / D ₁₀):	48.23	4.921	MEDIUM GRAVEL: 0.0%		MEDIUM SILT: 6.8%	
(D ₉₀ - D ₁₀):	364.4	5.592	FINE GRAVEL: 0.0%		FINE SILT: 6.8%	
(D ₇₅ / D ₂₅):	11.19	2.892	V FINE GRAVEL: 0.0%		V FINE SILT: 6.8%	
(D ₇₅ - D ₂₅):	218.4	3.485	V COARSE SAND: 0.4%		CLAY: 6.8%	
	METHOD OF MOMENTS			FOLK & WARD METHOD		
	Arithmetic	Geometric	Logarithmic	Geometric	Logarithmic	Description
	μm	μm	ϕ	μm	ϕ	
MEAN (\bar{x}):	173.3	57.81	4.112	79.16	3.659	Very Fine Sand
SORTING (σ):	185.1	5.542	2.471	4.428	2.147	Very Poorly Sorted
SKEWNESS (Sk):	3.338	-0.190	0.190	-0.517	0.517	Very Fine Skewed
KURTOSIS (K):	29.62	1.274	1.274	0.764	0.764	Platykurtic



SAMPLE STATISTICS						
SAMPLE IDENTITY: Lay Crochon 1982_2016_E4			ANALYST & DATE: LIENSs, 2016			
SAMPLE TYPE: Bimodal, Poorly Sorted			TEXTURAL GROUP: Slightly Gravelly Sandy Mud			
SEDIMENT NAME: Slightly Very Fine Gravelly Very Fine Sandy Coarse Silt						
	μm	ϕ	GRAIN SIZE DISTRIBUTION			
MODE 1:	71.50	3.816	GRAVEL: 0.2%		COARSE SAND: 1.0%	
MODE 2:	225.0	2.161	SAND: 25.3%		MEDIUM SAND: 3.5%	
MODE 3:			MUD: 74.5%		FINE SAND: 9.4%	
D ₁₀ :	5.671	2.387			V FINE SAND: 10.9%	
MEDIAN or D ₅₀ :	25.19	5.311	V COARSE GRAVEL: 0.0%		V COARSE SILT: 12.4%	
D ₉₀ :	191.2	7.462	COARSE GRAVEL: 0.0%		COARSE SILT: 12.4%	
(D ₉₀ / D ₁₀):	33.71	3.126	MEDIUM GRAVEL: 0.0%		MEDIUM SILT: 12.4%	
(D ₉₀ - D ₁₀):	185.5	5.075	FINE GRAVEL: 0.0%		FINE SILT: 12.4%	
(D ₇₅ / D ₂₅):	6.470	1.880	V FINE GRAVEL: 0.2%		V FINE SILT: 12.4%	
(D ₇₅ - D ₂₅):	54.26	2.694	V COARSE SAND: 0.4%		CLAY: 12.4%	
	METHOD OF MOMENTS			FOLK & WARD METHOD		
	Arithmetic	Geometric	Logarithmic	Geometric	Logarithmic	Description
	μm	μm	ϕ	μm	ϕ	
MEAN (\bar{x}):	84.28	16.89	-5.888	26.55	5.235	Coarse Silt
SORTING (σ):	207.4	3.920	1.971	3.597	1.847	Poorly Sorted
SKEWNESS (S_k):	10.95	1.421	-1.421	0.111	-0.111	Coarse Skewed
KURTOSIS (K):	161.7	3.585	3.585	0.879	0.879	Platykurtic

