

## NOUVEL INDICE SUR LES PÉRÉGRINATIONS DU MAIGRE

par J.-C. QUERO \* et J.-J. VAYNE \*

---

*Résumé.* – Le rassemblement de maigres adultes, peu avant leur migration de reproduction, a été observé pour la première fois dans les eaux côtières du sud du golfe de Gascogne.

*Summary:* - Aggregation of adult meagres, taking place just before the migration for spawning, is recorded for the first time, in the coastal waters of the Southern Bay of Biscay.


Dans la nuit du 6 au 7 avril 1992, peu après minuit, la « Mauve », vedette de surveillance des Affaires maritimes, basée à Bayonne, accoste le « Nuevo Jesus de Nazareth », bolincheur de 21 m de long et de 93 tonneaux de jauge, basé à Donovia-Saint Sébastien (Espagne). Ce bateau en pêche dans les eaux territoriales sous souveraineté française se trouve à 2,3 milles dans l'ouest de la pointe Saint-Martin, sur laquelle se dresse le phare de Biarritz, par 43°29'N 1°47'2 W. Les espagnols, armés à l'anchois et titulaires d'une licence pour cette pêche, venaient de mettre leur senne à l'eau, attirés à cet endroit, par l'enregistrement de leur sondeur qui y signalait de fortes concentrations de poissons.

Arraisonné par l'équipage de la vedette de surveillance, les pêcheurs virent leur senne et c'est la surprise. Le filet ne contient pas d'anchois mais des maigres, au moins 3 tonnes d'individus pesant de 5 à 40 kg, le poids moyen étant de 10 à 15 kg. Ces 200 à 300 poissons seront vendus à la halle à marée d'Hendaye pour la somme de 33 174 F.

Cet événement nous intéresse fortement car il apporte un élément nouveau à la reconstitution des déplacements du maigre adulte (Quéro, 1989 ; Quéro et Vayne, 1987 et 1989). Début avril il se forme ainsi, avant la migration de reproduction de ce poisson qui le conduira de la mi-avril à la fin mai sur son aire de ponte en Gironde, des concentrations dans les eaux côtières du sud du golfe de Gascogne.

---

\* IFREMER - La Rochelle, Ichtyologie, Place du Séminaire, B.P. 7  
17137 L'Houmeau



Il reste toutefois à déterminer la zone où se trouve le maigre adulte pendant les 3 mois d'hiver de janvier à début avril. Reste-t-il dans le sud du golfe de Gascogne dans les nappes d'eau profondes les plus chaudes à l'image de ce que font les juvéniles entre la Gironde et le bassin d'Arcachon ? Effectue-t-il des migrations plus lointaines ? Pour s'en assurer il serait nécessaire d'effectuer dans cette région des prospections avec des chaluts de fond et pélagique et de bien étudier l'hydrologie des masses d'eau.

#### RÉFÉRENCES

- QUERO J.C., 1989. - Sur la piste des maigres *Argvrosomus regius* (Pisces, Sciaenidae) du golfe de Gascogne et de Mauritanie. *Oceanis*, 15 (2) : 161-170.
- QUERO J.C. et J.J. VAYNE, 1987. - Le maigre, *Argvrosomus regius* (Asso, 1801) (Pisces, Perciformes, Sciaenidae) du golfe de Gascogne et des eaux plus septentrionales. *Rev. Trav. Inst. Pêches marit.*, 49 (1 & 2), 1985 : 35-66.
- QUERO J.C. et J.J. VAYNE, 1989. - Parlons maigres *Ann. Soc. Sci. nat. Char. Mar.*, 7 (7) : 869-885.