Otoliths (convex side / concave side) of fish in the Southern North Sea

Ifremer

Marine Resource Laboratory in Boulogne-sur-mer

Ifremer

Whiting
Merlangius merlangus

Atlantic Cod
Gadus morhua

Hake
Merluccius merluccius

Haddock
Melanogrammus aeglefinus

Dab
Limanda limanda

Herring
Clupea harengus

Pilchard
Sardina pilchardus



Sprat
Sprattus sprattus

Seabass
Dicentrarchus labrax

Plaice
Pleuronectes platessa

Twaite shad
Alosa fallax



Atlantic horse mackerel
Trachurus trachurus

Atlantic mackerel
Scomber scombrus

Anchovy
Engraulis encrasicolus

Long Rough Dab
Hippoglossoides platessoides



Striped red mullet
Mullus surmuletus



Lesser weever
Echiichthys vipera

Greater weever
Trachinus draco

Grey gurnard
Eutrigla gurnardus



Flounder
Platichthys flesus



Pouting
Trisopterus luscus



Poor cod
Trisopterus minutus

Norway pout
Trisopterus esmarkii

Dragonet
Callionymus lyra

Lemon sole
Microstomus kitt

Scaldfish
Arnoglossus laterna

Brill
Scophthalmus rhombus

IFREMER Copyright 2008

Turbot
Psetta maxima

Common Sole
Solea solea