



Résultats de la mise en œuvre des réseaux REPHY et SRN.

Zones côtières de la manche orientale et de la Baie Sud de la Mer du Nord. Bilan de l'année 2024.





Fiche documentaire

Titre du rapport

Résultats de la mise en œuvre des réseaux REPHY et SRN – Zones côtières de la Manche orientale et de la baie sud de la Mer du Nord – Bilan de l'année 2024.

Référence interne :

IFREMER/ODE/COAST/LERBL/25.04

Diffusion

∐ libre (internet)

☐ restreinte (intranet)

levée d'embargo : AAAA/MM/JJ

☐ interdite (confidentielle)

levée de confidentialité : AAAA/MM/JJ

Date de publication :

23/04/2025

Version: 1.1

Référence de l'illustration de couverture

LERBL

Fabien Lebon

Vincent Duquesne

Langue(s): Français

Résumé / Abstract :

Le littoral Nord - Pas-de-Calais / Picardie montre de nombreux signes de dysfonctionnements induits principalement par l'activité anthropique. Ces signes se manifestent presque toujours par un déséquilibre des populations, qu'elles soient animales ou végétales. En effet, certaines espèces dominent. C'est le cas de la Prymnesiophycée *Phaeocystis* sp., une algue phytoplanctonique naturelle qui prolifère tous les ans au printemps. Le cycle de développement de l'espèce évolue depuis quelques années (modification de l'amplitude, de la durée et de l'extension graphique du bloom) et est fortement lié à la dynamique des sels nutritifs comme les nitrates et les phosphates par exemple.

Dans le cadre de l'évaluation de l'influence des apports continentaux en éléments nutritifs sur d'éventuels processus d'eutrophisation du milieu marin, de l'estimation de l'efficacité des stations d'épuration à éliminer de telles substances et afin d'établir un suivi à long terme permettant de suivre l'évolution de la qualité des eaux littorales, le réseau de Suivi Régional des Nutriments (SRN) a été mis en place par l'Ifremer en collaboration avec l'Agence de l'Eau Artois-Picardie en 1992 afin de compléter le réseau REPHY (Réseau Phytoplancton et Phycotoxines).

Ce rapport présente les principaux résultats de l'année 2024 en termes d'évolution temporelle des paramètres physico-chimiques et biologiques caractéristiques des masses d'eaux échantillonnées au niveau des points de surveillance de trois radiales situées à Dunkerque, à Boulogne-sur-Mer et en Baie de Somme.

Mots-clés / Key words :

Manche Orientale - baie sud de la Mer du Nord - Hydrologie - Phytoplancton- *Phaeocystis globosa*

Comment citer ce document :

Devreker David, Lefebvre Alain (2025). Résultats de la mise en œuvre des réseaux REPHY et SRN. Zones côtières de la Manche orientale et de la baie sud de la Mer du Nord. Bilan de l'année 2024. IFREMER/ODE/COAST/LERBL/25.04.

Disponibilité des données de la recherche :

DOI:

SRN - Regional Observation and Monitoring program for Phytoplankton and Hydrology in the eastern English Channel (2025). SRN dataset - Regional Observation and Monitoring Program for Phytoplankton and Hydrology in the eastern English Channel. SEANOE. https://doi.org/10.17882/50832

Commanditaire du rapport :	
Agence de l'Eau Artois-Picardie	
Nom / référence du contrat : □ Rapport intermédiaire (Réf. Bibliographique ⋈ Rapport définitif	: XXX)
Projets dans lesquels ce rapport s'inscrit (p Suivi Régional des Nutriments (SRN) et REsea PHYtoplancton (REPHY). Convention Ifremer/Agence de l'Eau Artois Pic	au d'observation et de surveillance du
Auteur(s) / adresse mail	Affiliation / Direction / Service, laboratoire
David Devreker / david.devreker@ifremer.fr	IFREMER/ODE/COAST/LER BL
Alain Lefebvre / alain.lefebvre@ifremer.fr	IFREMER/ODE/COAST/LER BL
Encadrement(s): Lefebvre Alain, Ifremer/LER/Boulogne-sur-Mer	:
Destinataires: Agences de l'Eau. DDTM59,62,80. DDPP. DREAL. Collaborateurs universitaires. ARS. ANSES. OFB. Ifremer.	
Validé par : Lefebvre Alain, Ifremer/LER/Boulogne-sur-Mer	

Table des matières

ln	troduction générale	4
1.	Présentation des sites d'échantillonnage	5
2.	Prélèvements et analyses	9
	2.1 Fréquence des prélèvements	9
	2.2 Prélèvements en mer	10
	2.2.1 Niskin	10
	2.2.2 Sonde Y.S.I	10
	2.3 Paramètres physico-chimiques	12
	2.3.1 Salinité et Température	12
	2.3.2 Turbidité	12
	2.3.3 L'oxygène dissous	12
	2.4 Paramètres biogéochimiques	13
	2.4.1 Ammonium	13
	2.4.1 Animonium	13
	2.4.3 Nitrite	13
	2.4.4 Phosphate	13
	2.4.5 Silicate	13
	2.4.6 Matières En Suspension (M.E.S.)	13
	2.4.7 Matières Organiques Particulaires (M.O.P.)	14
	2.5 Paramètres biologiques	14
	2.5.1 Chlorophylle- a	14
	2.5.2 Phytoplancton	14
	2.5.2.1 Observation en microscopie inversée	14
	2.5.2.2 Lecture des graphes	14
	2.6 Assurance qualité	15
	2.7 Interprétation des Figures	15
	2. Interpretation doe 1. Sales 1	10
3.	Résultats	18
	3.1 Paramètres hydrologiques	18
	3.1.1 Dunkerque	18
	3.1.1.1 <i>Température</i>	18
	3.1.1.2 <i>Salinité</i>	22
	3.1.1.3 Turbidité et matières en suspension	26
	3.1.1.4 M.E.S	30
	3.1.1.5 <i>Matière organique</i>	34
	* -	$\frac{34}{38}$
	3.1.1.6 Ammonium	42
	$3.1.1.7 \ Nitrite + Nitrate \dots \dots$	
	3.1.1.8 <i>Phosphate</i>	46
	3.1.1.9 <i>Silicate</i>	50
	$3.1.1.10~Oxyg\`ene~dissous$	54
	3.1.1.11 Limitation par les nutriments	58
	3.1.1.12 Chlorophylle-a	61
	3.1.2 Boulogne-sur-Mer	65
	3.1.2.1 <i>Température</i>	65
	$3.1.2.2 \; Salinit\'e \; \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots$	69
	3.1.2.3 Turbidité et matières en suspension	73
	3.1.2.4 <i>M.E.S.</i>	77
	3.1.2.5 Matière organique	81
	3.1.2.6 Ammonium	85
	3.1.2.7 Nitrite + Nitrate	89
	3.1.2.8 Phosphate	93
		93 97
	3.1.2.9 Silicate	
	3.1.2.10 Oxygène dissous	101
	3.1.2.11 Limitation par les nutriments	105
	3.1.2.12 Chlorophylle-a	108
	3.1.3 La Baie de Somme	112
	3.1.3.1 <i>Température</i>	112

3.1.3.2 <i>Salinité</i>	 . 117
3.1.3.3 Turbidité et matières en suspension	 . 122
3.1.3.4 <i>M.E.S.</i>	 . 127
3.1.3.5 Matière organique	 . 132
3.1.3.6 <i>Ammonium</i>	 . 137
$3.1.3.7\ Nitrite + Nitrate \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots$	
3.1.3.8 <i>Phosphate</i>	 . 147
3.1.3.9 <i>Silicate</i>	 . 152
3.1.3.10 Oxygène dissous	 . 157
3.1.3.11 Limitation par les nutriments	
3.1.3.12 Chlorophylle-a	 . 166
3.2 Paramètres biologiques	 . 171
3.2.1 Le phytoplancton	
3.2.2 Mesure de la diversité : Indice de Sanders	
3.2.3 Genres toxiques et Toxicités	 . 172
3.2.4. Dynamique phytoplanctonique	
3.2.4.1 Dunkerque	 . 173
3.2.4.2 Boulogne-sur-mer	 . 177
3.2.4.3 Baie de Somme	 . 181
4. Discussion et conclusion	186
Bibliographie	189
Annexes	190

Introduction générale

Les zones côtières consistent en une mosaïque d'écosystèmes interconnectés par des flux de composés dissous, de matières détritiques et d'organismes. Leur position comme zones d'interface entre océan et continent en fait des zones de transition stratégiques dans lesquelles les facteurs terrestres et océaniques se rencontrent, dont la dynamique détermine une grande variété des ressources naturelles. Ainsi, malgré une surface relativement faible, 10 % de surface des océans, les zones côtières sont les plus précieuses mais aussi les plus vulnérables des habitats sur Terre. La production primaire y est très importante, puisqu'elle représenterait à elle seule entre 14 et 30 % de la production primaire océanique totale et est le siège d'une activité de minéralisation très intense qui, dans les sédiments, peut représenter plus de la moitié de la minéralisation totale s'effectuant dans l'ensemble des sédiments marins. Toute cette activité biologique et biogéochimique est sous le contrôle des apports d'éléments nutritifs majeurs qui se font via les rivières, les eaux souterraines et l'atmosphère.

A la fin du XX^{ème} siècle, les apports naturels d'éléments nutritifs par les rivières ont considérablement augmenté comme une conséquence de divers facteurs, notamment l'utilisation massive d'engrais minéraux dans l'agriculture et l'accroissement des pressions urbaines le long des côtes (EEA, 2010). L'augmentation à long terme des apports azotés (N) et phosphatés (P) d'origine anthropique et une certaine stabilité des apports en silicates (Si) en zone côtière ont trois conséquences potentielles :

- l'induction d'une augmentation de la production primaire, qui était préalablement N et/ou P limitée, peut conduire à de sévères problèmes d'eutrophisation;
- le déclin des rapports Si/N, qui induit une limitation par le silicate pour les populations de diatomées et tout autre modification de l'équilibre stoechiométrique des éléments majeurs (N, P, Si), va aboutir à des changements de dominance et des modifications d'abondance des espèces phytoplanctoniques;
- une limitation par le silicate peut perturber la succession phytoplanctonique classique dans les eaux tempérées et peut provoquer un changement de dominance des espèces siliceuses (diatomées) vers les espèces non siliceuses (flagellés) avec une possible émergence de nouveaux types d'efflorescence dont les espèces caractéristiques sont parfois toxiques.

De plus, dans le contexte hydrodynamique local (régime mégatidal, présence d'une structure frontale «Le fleuve côtier» et d'une dérive résiduelle des masses d'eau vers la Mer du Nord), les apports marins en éléments majeurs ne sont pas négligeables : les apports d'azote inorganique dissous, de phosphate et de silicate de la Manche vers la Mer du Nord ont été estimés à 210.10^3 t/an, 41.10^3 t/an et 270.10^3 t/an respectivement.

Avant 1992, le suivi des nutriments sur le littoral était réalisé épisodiquement par l'intermédiaire du RNO (Réseau National d'Observation) ou du RNC (Réseau National de Contrôle). La nécessité de surveiller plus finement et sur une longue période les variations de concentration en sels nutritifs du milieu littoral a conduit l'Agence de l'Eau Artois-Picardie et l'Ifremer à mettre en place, en 1992, le SRN (Suivi Régional des Nutriments) sur la façade du littoral Nord / Pas-de-Calais / Picardie. Les objectifs de ce suivi sont d'évaluer l'influence des apports continentaux sur le milieu marin (sels azotés, phosphates, silicates) et leurs conséquences sur d'éventuels processus d'eutrophisation.

Il a pour but également d'estimer l'efficacité des stations d'épuration et des politiques d'aménagement et de gestion de la zone côtière et, plus généralement, l'éventuelle élimination de tels rejets. L'acquisition régulière des données permet l'établissement d'un suivi à long terme de l'évolution de la qualité des eaux littorales des trois radiales situées au large de Dunkerque, de Boulogne-sur-Mer et de la Baie de Somme, permettant de prétendre à pouvoir diminuer les effets des changements à grande échelle, des changements liés aux activités anthropiques, plus régionaux.

1. Présentation des sites d'échantillonnage

L'échantillonnage est réalisé au niveau de trois systèmes caractéristiques de la Manche orientale ou de la baie sud de la Mer du Nord : Baie de Somme, Boulogne-sur-Mer, Dunkerque (Tableau 1). Les radiales sont constituées de 3 ou 4 points de prélèvements positionnés selon un gradient côte-large (Figures 1, 2 et 3).

- La radiale de Dunkerque caractérise un système côtier de faible profondeur où dominent des apports industriels et où la faible pente des bassins versants est responsable d'écoulements continentaux lents
- La radiale de Boulogne-sur-Mer est représentative d'un système côtier sous influence d'une structure frontale générée par les apports de la Baie de Seine et où dominent des rejets d'origine agricole.
- La radiale de Baie de Somme caractérise un système estuarien où se concentre une activité conchylicole et agricole importante.

Ces trois systèmes sont structurés hydrodynamiquement et sédimentairement par un régime mégatidal. Les coordonnées des différents points sont précisées dans le Tableau 1. Suite à des modifications au niveau du chenal de navigation en Baie de Somme, un repositionnement du point Mimer a été nécessaire en 2004 (Tableau 1).

Tableau 1 – Coordonnées des points sur les trois radiales.

			RADIALES	
		DUNKERQUE	BOULOGNE	BAIE DE SOMME
	Point 0			Bif Latitude : 50°12.88' N Longitude : 01°35.96' E
SN	Point 1	DK1 Latitude: 51°04.30' N Longitude: 02°20.20' E	BL1 Latitude : 50°45.24' N Longitude : 01°33.00' E	Mimer (avant 2004 et depuis 2017) Latitude : 50°13.30' N Longitude : 01°32'40 E Mimer' (de 2004 à 2017) Latitude : 50°14.140' N Longitude : 01°32.963' E
STATIONS	Point 2		BL2 Latitude : 50°45.24' N Longitude : 01°31.22' E	Atso Latitude : 50°14.00' N Longitude : 01°28.50' E
	Point 3	DK3 Latitude : 51°06.70' N Longitude : 02°17.20' E	BL3 Latitude : 50°44.94' N Longitude : 01°27.05' E	
		La station Mer 1	n'est plus échantillonnée c	lepuis 2015
	Point 4	DK4 Latitude : 51°09.20' N Longitude : 02°15.10' E		Mer 2 Latitude: 50°13.15' N Longitude: 01°26.75' E

Dans la base de données Quadrige², d'où sont extraites les données ayant servies à réaliser ce rapport, les points des radiales sont labellisés comme suite : Point 1 Dunkerque, Point 3 SRN Dunkerque, Point 4 SRN Dunkerque, Point 1 Boulogne, Point 2 SRN Boulogne, Point 3 SRN Boulogne, Bif, Mimer, Atso et SRN Somme mer 2. Ces labels seront utilisés dans les figures et tableaux de la section résultats du rapport.




FIGURE 1 – Localisation des points de prélèvements de la radiale de Dunkerque




FIGURE 2 – Localisation des points de prélèvements de la radiale de Boulogne sur Mer




FIGURE 3 – Localisation des points de prélèvements de la radiale de la Baie de Somme

2. Prélèvements et analyses

2.1 Fréquence des prélèvements

Les prélèvements effectués sont regroupés au sein de deux réseaux de surveillance du milieu marin côtier : le REPHY et le SRN. Depuis 2017, dans le cadre du REPHY, la fréquence de prélèvements a évolué pour passer d'un prélèvement par mois au point le plus proche des côtes des trois radiales à deux, exception faite de la baie de Somme où cette modification concerne le point Atso. Ce réseau dépend alors théoriquement de 24 sorties en mer étendues sur l'année (la moitié de ces sorties étant commune aux deux réseaux). En ce qui concerne le SRN, la stratégie d'échantillonnage n'a pas été modifiée. Les prélèvements sont mensuels et s'étendent de la côte au large. Cependant, de mars à juin, une prolifération de la Prymnesiophycée *Phaeocystis* sp. est observable. Elle peut représenter une nuisance pour le système marin (Lancelot et al. 1998); c'est pourquoi, sur cette période, les prélèvements sont bimensuels. Les prélèvements pour le SRN représentent alors 16 sorties par an.

La cause de la modification de la stratégie d'échantillonnage du réseau REPHY est la création du réseau PHYTOBS (+ Directive Cadre sur l'Eau (2000/60/CE)), celui-ci regroupant deux composantes majeures de la surveillance de l'environnement marin côtier : le REPHY et le SOMLIT. Les objectifs du réseau PHYTOBS sont donc :

- analyser les réponses aux changements environnementaux,
- reconnaître les niches écologiques et les habitats,
- détecter les variations de phénologie,
- caractériser les traits et groupes fonctionnelles.




FIGURE 4 – Les différentes composantes du REPHY : le REPHY Observation répond à des questions de recherche (flore totale). Il correspond à la partie labellisée PHYTOBS. Le REPHY Surveillance répond aux directives européennes (DCE et DCSMM) (flore indicatrice). Le REPHY Sanitaire complète les deux autres en ciblant les espèces toxiques (flore toxique). Les points du SRN répondent à tout ou partie de ces trois composantes.

En 2024, certaines sorties ont dû être tronquées, en raison de conditions météorologiques défavorables et/ou de problèmes techniques ou d'indisponibilités des moyens nautiques; et dans certains cas, seule la station côtière (point de référence pour la Directive Cadre sur l'Eau 2000/60/CE et le réseau REPHY) a pu être échantillonnée. Sur les 24 sorties annuelles par station SRN/REPHY et 16 sorties annuelles par station SRN Historique prévues initialement, le bilan pour cette année est donné dans le tableau 1.

Le détail du nombre d'analyse réalisée par paramètre et par point est donné en Annexe 1.

Les méthodes d'analyse suivent les procédures décrites dans le manuel des analyses chimiques en milieu marin d'Aminot & Chaussepied (1983), Aminot & Kérouel (2004) et sont effectuées selon la procédure d'assurance de la qualité de l'Ifremer.

févr juin juil août déc Sum janv mars $_{\mathrm{mai}}$ sept octnov avr DK124 sur 24 BL1 22 sur 2424 sur 24At so DK3 $16 \, \mathrm{sur} \, 16$ DK4 $16 \, \mathrm{sur} \, 16$ BL213 sur 16 BL313 sur 16 MER2 16 sur 16 Mimer $16 \, \mathrm{sur} \, 16$ Bif 16 sur 16

Tableau 2 – Récapitulatif du nombre de sorties réalisées en 2024.

2.2 Prélèvements en mer

2.2.1 Niskin

Les prélèvements d'eau pour analyses sont effectués en sub-surface (-0,5 m à -1 m) à partir d'un bateau et à l'aide d'une bouteille Niskin (Figure 5) à pleine mer \pm 2h. C'est une bouteille qui, une fois immergée, se referme de part et d'autre grâce à un percuteur.

L'eau est alors transvasée directement dans un flacon plastique opaque brun de 1 litre pour les analyses de concentration en chlorophylle-a et les comptages du phytoplancton ou dans un flacon à usage courant pour les analyses de matières en suspension et de la turbidité.



FIGURE 5 – Bouteille de prélèvement Niskin

Pour les sels nutritifs, l'eau est préfiltrée (maille de $50~\mu m$) avant d'être transvasée dans un flacon. Pour l'ammonium, l'eau préfiltrée est versée dans un flacon opaque de 100~ml. Ces flacons sont placés en glacière en attendant le retour pour analyse au laboratoire.

2.2.2 Sonde Y.S.I.

Lors des campagnes de prélèvements, la sonde Ysi 6600 V2 (Figure 6) a été utilisée afin de caractériser la structure verticale des masses d'eaux des différents sites. Elle est déployée lors de chaque campagne de prélèvements en mode autonome ou en mode supervisé (avec ou sans câble et boîtier de contrôle) (Figure 6).

Cette sonde permet la mesure ou le calcul des paramètres présentés dans le tableau 3. La concentration en chlorophylle-a est estimée via une mesure de la fluorescence.

Pour les points côtiers DK1, BL1, Atso et Bif (Figure 1 à 3), seules les valeurs de sub-surface et de fond (extraites des profils de sonde) des paramètres température, salinité et de concentration en oxygène dissous sont bancarisées dans la base de données Quadrige². Pour les points plus au large, seules les valeurs de sub-surface sont bancarisées. Les données de fond ne sont pas présentées dans le rapport.




FIGURE 6 – La sonde multiparamètres Ysi 6600 V2 et son boîtier de contrôle.

Les profils de sonde complets sont toutefois accessibles sur le site de l'infrastructure de recherche CORIOLIS (http://www.coriolis.eu.org/).

Si la concentration en chlorophylle-a et la turbidité sont toutes les deux mesurées par la sonde Y.S.I. et par des prélèvements d'eau à la bouteille Niskin, seuls les résultats issus des analyses au laboratoire à partir des échantillons prélevés à la Niskin sont bancariseés dans la base de données Quadrige² et sont présentés dans ce rapport. A noter que ce sont donc les données Niskin de chlorophylle-a et de turbidité qui sont utilisées dans les simulations DCE.

De 0 à 9 m : $\pm 0,02$ m

De 0 à 60 m : \pm 0,12 m De 0 à 200 m : \pm 0,3 m

Paramètre Unité **Plage** Résolution Précision Degrés Celcius $-5^{\circ}C$ à $+45^{\circ}C$ $0.01^{\circ}C$ Température $\pm 0,15$ °C (°C) ± 0.5 % de la lecture 0,001 à 0,1 Conductivité mS/cm 0 à 100 mS/cm +0,001 mS/cmmS/cm ± 1 % de la lecture Salinité P.S.U. 0 à 70 0.01 ou 0.1 0 à 200 % : ± 2 % de la lecture % Oxygène dissous 0 à 500 % 0,1 % 200 à 500 % : ± 6 % de la lecture saturatuion 0 à 200 mg.l⁻¹ : ± 2 % de la lecture $mg.l^{-1}$ 0 à 50 mg.l⁻¹ 0,01 mg.l⁻¹ Oxygène dissous 200 à 500 mg.l $^{-1}$: ± 6 % de la lecture Unités de pH 0 à 14 unités pΗ 0,01 unités $\pm 0,2$ unités Turbidité N.T.U. 0 à 1000 F.N.U. 0,1 F.N.U. ± 5 % de la lecture ou 0.3 N.T.U.

 $0.1 \, \mu g.l^{-1}$

0,001 m

0 à 400 μg.l⁻¹

0-200 m

TABLEAU 3 – Tableau récapitulatif des paramètres acquis par la sonde Ysi 6600 V2

2.3 Paramètres physico-chimiques

 $\mu g.l^{-1}$

Mètres (m)

2.3.1 Salinité et Température

Chlorophylle-a

Profondeur

La température est, avec la salinité, un des descripteurs de base pour la connaissance du milieu. La température influe sur l'activité biologique dont dépend la production totale et sur la répartition des espèces. En milieu océanique, la température, associée à la salinité, est mesurée pour calculer la masse volumique de l'eau nécessaire à la détermination de la stratification de verticale. La salinité représente le contenu en sels dissous d'une eau. La mesure de la salinité se fait par sonde conductimétrique couplée à une sonde de température.

Le résultat est exprimé en Practical Salinity Unit (1 P.S.U. = 1 g de sel (NaCl) par kg d'eau de mer). L'UNESCO recommande l'utilisation de l'échelle de salinité comme un rapport sans préciser de dimension ou d'unité. Les notations p.p.t., ‰, g. kg⁻¹ ne sont plus utilisées et il n'est pas correct de préciser P.S.U. après le nombre. Les mesures de température et de salinité ont été réalisées grâce à l'utilisation de la sonde YSI (voir paragraphe 2.2.2)

2.3.2 Turbidité

La turbidité est un paramètre qui permet d'apprécier l'aspect visuel, c'est-à-dire le degré d'opacité ou de transparence d'une masse. La turbidité est le plus souvent le résultat des apports continentaux de matériels solides, de la remise en suspension des dépôts sédimentaires et aussi parfois de poussées phytoplanctoniques. De ce fait, elle est étroitement liée à la concentration en MES et influe sur la pénétration de la lumière dans la colonne d'eau et donc sur la production primaire photosynthétique.

La mesure de la turbidité se fait par néphélométrie et est exprimée en Nephelometric Turbidity Unit (N.T.U.). Elle consiste à mesurer la quantité de lumière diffusée à 90° par rapport à la lumière incidente.

2.3.3 L'oxygène dissous

Le niveau d'oxygène est un bon indicateur de la capacité d'un milieu à supporter la vie. L'oxygène en milieu aqueux provient à la fois des processus physiques (échanges atmosphériques entre l'air et l'eau), chimiques, ainsi que de l'activité photosynthétique des plantes. Des chutes des niveaux d'oxygène peuvent cependant résulter du métabolisme des organismes aquatiques lié au processus de respiration, de la

décomposition de la matière organique par les bactéries ou encore de l'oxydation chimique de composés organiques et inorganiques.

Sa mesure dans l'eau, en mg/L, a été réalisée grâce à l'utilisation de la sonde YSI (voir paragraphe 2.2.2).

2.4 Paramètres biogéochimiques

La mesure des concentrations pour l'ensemble des nutriments se fait par lecture au spectrophotomètre avec une relation Densité Optique (DO) / concentration selon une courbe de calibration réalisée à chaque série de mesures.

2.4.1 Ammonium

Dans l'eau, l'ammoniac existe sous deux principales formes : $\mathrm{NH_3}$ et $\mathrm{NH_4}^+$. Au pH usuel, l'ammonium ($\mathrm{NH_4}^+$) reste cependant la forme la plus dominante. Le dosage de l'ammonium est effectué selon la méthode de Koroleff (1969). Ce dosage permet de déterminer la totalité de l'azote ammoniacal. Après l'addition d'hypochlorite en milieu basique, il y a une formation de monochloramine. Cette monochloramine réagit avec le phénol pour donner du bleu d'indophénol possédant un maximum d'absorption à 630 nm. La réaction est catalysée par le nitroprussiate.

La concentration d'ammonium est exprimée en μ mol.l⁻¹. Le seuil de détection de l'appareil est de 0,15 μ mol.l⁻¹.

2.4.2 Nitrate

Après réduction des ions nitrates en ions nitrites, par passage sur une colonne au cadmium, la méthode appliquée est la méthode de Bendschneider & Robinson (1952). Les ions nitrites forment un complexe diazoïque avec la sulfanilamide en milieu acide. Ce complexe réagit avec le Nnaphtyl éthylène diamine pour former un complexe coloré rose ayant un maximum d'absorption à 543 nm. La limite de quantification est de $0.15~\mu \text{mol.l}^{-1}$.

2.4.3 Nitrite

Le dosage est effectué selon la méthode de Bendschneider & Robinson (1952). Les ions nitrites forment un complexe diazoïque avec la sulfanilamide en milieu acide. Ce complexe réagit avec le Nnaphtyl éthylène diamine pour former un complexe coloré rose ayant un maximum d'absorption à 543 nm. La limite de quantification est de $0,05~\mu \text{mol.l}^{-1}$.

2.4.4 Phosphate

Le phosphate désigne l'ensemble des formes dissoutes de l'ion orthophosphate (${\rm PO_4}^3$). Leur dosage s'effectue selon la méthode de Murphy & Riley (1962). Ce dosage permet de déterminer les ions orthophosphates dissous dans l'eau de mer. Les ions phosphates réagissent avec le molybdate d'ammonium, en présence d'antimoine, pour former un complexe que l'on réduit par ajout d'acide ascorbique. Cette forme réduite, de coloration bleue, a un maximum d'absorption à 885 nm. La concentration en phosphate est exprimée en μ mol.l⁻¹. La limite de quantification est de 0,05 μ mol.l⁻¹.

2.4.5 Silicate

Le terme silicate désigne les formes dissoutes de l'ion orthosillicate SiO_4 . Dans l'eau de mer, la forme majoritaire est l'acide orthosilicique, $Si(OH)_4$, forme sous laquelle est exprimé le silicate dissous.

Le dosage de cet élément est réalisé selon la méthode de Mullin & Riley (1955) adaptée par Strickland & Parsons (1972). Ce dosage permet de déterminer le silicium dissous réactif. Le silicium réactif forme un complexe silicomolybdique qui, par ajout d'un mélange réducteur, donne une coloration bleue intense. Ce complexe a un maximum d'absorption à 810 nm.

La concentration en silicate est exprimée en μ mol.l⁻¹. La limite de quantification est de 0,1 μ mol.l⁻¹.

2.4.6 Matières En Suspension (M.E.S.)

Dans l'eau, il existe des quantités plus ou moins importantes de particules insolubles présentes en suspension. L'importance de ces matières en suspension (M.E.S.) dans un milieu affecte la transparence de l'eau ainsi que la biologie. La filtration d'un échantillon sur une membrane filtrante permet de récupérer la matière

vivante ou morte de taille supérieure à $0,45~\mu\mathrm{m}$ contenue dans l'échantillon, sel de l'eau de mer exclu (le filtre est rincé pour éliminer l'excès de sel).

Par séchage à l'étuve (70 °C) de la matière totale pendant 24 heures puis par différence de pesée (avant et après séchage), le poids sec de la matière totale est déterminé. Les M.E.S. sont exprimées en mg.l⁻¹.

2.4.7 Matières Organiques Particulaires (M.O.P.)

C'est la fraction organique de la matière particulaire en suspension. Elle est exprimée en mg.l⁻¹. Pour obtenir sa mesure, le filtre préalablement traité pour la détermination des quantités de matières en suspension (paragraphe 1.4.8) est mis au four à moufle (450 °C) pendant 1 heure.

Le résultat de la différence de pesée avant / après passage au four permet l'estimation de la part de matière minérale (M.M.) dans l'échantillon. La quantité de M.O.P. est représentée par la différence entre M.E.S. et M.M.

2.5 Paramètres biologiques

2.5.1 Chlorophylle-a

La mesure de la concentration en chlorophylle-a constitue une estimation simple et spécifique de la biomasse du phytoplancton.

Par filtration sur membrane (filtre Whatman GF/C de 47 mm), le matériel particulaire est concentré. Les pigments sont ensuite extraits dans un solvant (acétone à 90 %). Après centrifugation pendant 20 minutes à 6000 tr.mn⁻¹, l'absorbance du surnageant est mesurée par spectrophotométrie à 665 et 750 nm, ce qui permet d'obtenir le taux de chlorophylle-a (son pic d'absorbance se situe à 665 nm).

Les concentrations en chlorophylle-a sont exprimées en μ g.l⁻¹ ou mg.m⁻³ (précision \pm 0,01). Le seuil de détection de ce pigment est de 0,04 μ g.l⁻¹.

2.5.2 Phytoplancton

2.5.2.1 Observation en microscopie inversée

La procédure utilisée est la méthode Ütermohl 322/89CSRU/BCM, classiquement utilisée pour l'identification et le dénombrement du phytoplancton dans le cadre des réseaux de surveillance phytoplanctonique. Les observations sont faites le plus vite possible, au moins pour les espèces cibles, et sur les deux types d'échantillons : vivants et fixés. La fixation se fait au lugol (2,5 ml par litre). La solution mère de lugol est à conserver à l'obscurité, la durée de vie en flacon brun est limitée à quelques mois.

L'observation se fait dans une cuve à sédimentation de 10 ml avec un grossissement adéquat. Le temps de décantation minimum est de 6 heures (au bout de 2 heures environ, 80 % des espèces sont déjà sur le fond de la cuve).

Pour la lecture, lorsqu'aucune espèce n'est à priori véritablement dominante, la cuve est parcourue entièrement. Dans le cas où une ou plusieurs espèces apparaîtraient très dominantes, un sous-échantillonnage est réalisé. Il consiste en une numération sur les diamètres de la cuve ou des champs choisis de manière aléatoire dans la cuve. Un coefficient multiplicateur permet d'estimer le nombre de cellules phytoplanctoniques observées en fonction du grossissement, du nombre de diamètres ou de champs observés. Le résultat est extrapolé à un volume de 1 litre (résultat en nombre de cellules par litre).

2.5.2.2 Lecture des graphes

Depuis 2011, les graphes des flores totales et des taxons dominants ont été largement modifiés :


- La biomasse est représentée par un graphe par point des concentrations en chlorophylle-a sur 5 ans. Les résultats de l'année (n-1) en bleu sont superposés aux résultats des 4 années précédentes en gris.
- L'abondance est représentée par un graphe par point de la somme des taxons dénombrés dans les flores totales sur 5 ans. Les résultats de l'année (n-1) en vert sont superposés aux résultats des 4 années précédentes en gris.
- La composition est représentée par des graphes par taxon sur l'année (n-1). La dominance des taxons est estimée en fonction de l'importance qu'occupe le taxon dans l'échantillon. On calcule la proportion du taxon dans l'échantillon par rapport à l'abondance totale, puis la somme des proportions d'un taxon a été calculée sur l'ensemble des échantillons de l'année. Le taxon a un score d'autant plus élevé qu'il est souvent présent et qu'il atteint des concentrations élevées.

2.6 Assurance qualité

L'ensemble des analyses réalisées au laboratoire LER du centre Ifremer Manche / Mer du Nord de Boulogne-sur-Mer se fait sous Assurance Qualité (Plan qualité physicochimie du 01/07/2000 et plan qualité métrologie du 23/07/2002). De plus, le laboratoire est impliqué dans le Programme d'Inter Comparaison QUASIMEME (Quality Assurance for Information from Marine Environmental Monitoring in Europe) pour les nutriments.

2.7 Interprétation des Figures

Les paramètres hydrologiques sont représentés par deux types de graphiques. D'abord, les boîtes de dispersion permettent de visualiser les variations saisonnières intégrées sur toute la période 1992 par rapport à l'année (n-1) d'édition du rapport (Figure 7). Elles représentent les paramètres de tendance centrale et de dispersion des valeurs pour chaque mois pour l'ensemble de la période considérée. L'évolution d'un paramètre, dans notre exemple, la température du point 1 de la radiale de Dunkerque lors de l'année (n-1) (2019, dans cet exemple) est superposée à la série moyenne et est représentée en rouge. Plus la boîte de dispersion est petite, plus les valeurs du milieu sont homogènes. A l'inverse, plus elle est grande, plus les valeurs du milieu sont hétérogènes ou dispersées. Également, plus l'étendue de la moustache est grande, plus les valeurs sont dispersées. En revanche, plus elle est petite, plus les valeurs sont homogènes. Il arrive parfois qu'il y ait des valeurs dites extrêmes, atypiques ou bien exceptionnelles, ce sont les outliers.



1001022 - Point 1 Dunkerque - Variations saisonnières Température

FIGURE 7 – Variations saisonnières mensuelles (année 2019 en rouge) de la température (°C) pour le point 1 de la radiale de Dunkerque (1992-2019).

Le deuxième type de graphique (Figure 8) met en évidence les rapports stoechiométriques N/P, Si/N et Si/P qui ont été calculés pour chaque date de prélèvements et pour chaque point. Les résultats sont représentés par mois. Le graphique illustre l'évolution des rapports N/P et Si/N. En fonction des valeurs des ratios, les points se retrouvent de part et d'autre des courbes seuils (valeurs de 16 et 1), ce qui permet ensuite de mettre en évidence la limitation par tel ou tel nutriment, par ordre de priorité.

Il est à noter que les rapports Si/N ou N/P sont calculés afin d'aborder la notion de limitation potentielle de la production de biomasse par les nutriments. En effet, selon Redfield et al. (1963) et Brzezinski (1985), la composition élémentaire du phytoplancton en carbone : azote : silice : phosphore (C : N : Si : P) est proche de 106 : 16 : 16 : 1.

Ratios au point Point 1 Boulogne pour l'année 2019




FIGURE 8 – Évolution temporelle des rapports stoechiométriques définissant les éléments nutritifs potentiellement limitants au point 1 de la radiale de Boulogne-sur-Mer en 2019.

D'après cette composition élémentaire, le rapport N/P (16/1) dans le phytoplancton vaut 16 et le rapport Si/N (16/16) quant à lui, serait égal à 1. Dans l'eau de mer, le rapport molaire entre l'azote et le phosphore reste approximativement le même que dans le phytoplancton, ce qui optimise la croissance des algues. Il en découle donc les observations suivantes :

- Si le rapport N/P est **inférieur à 16**, l'azote est alors potentiellement en carence dans le milieu et la croissance du phytoplancton peut alors être limitée. Inversement, si le rapport N/P est supérieur à 16, le phosphore est alors potentiellement limitant pour la croissance du phytoplancton.
- De même, si le rapport Si/N est **inférieur à 1**, le silicate est alors potentiellement en carence dans le milieu et la croissance du phytoplancton (les diatomées) peut alors être limitée. Au contraire, si le rapport Si/N est **supérieur à 1**, l'azote est alors potentiellement en carence dans le milieu et la croissance du phytoplancton peut alors être limitée.
- Pour certains paramètres, les caractéristiques de tendance centrale et de dispersion sur la période 1992-2024 sont synthétisées dans un tableau. Les abréviations utilisées sont les suivantes :

Min : minimum

Q1 : 1er quartile (quantile 25) Q3 : 3em quartile (quantile 75)

Max : maximumn : nombre de données

3. Résultats

3.1 Paramètres hydrologiques

3.1.1 Dunkerque

3.1.1.1 Température

De 1990 à 2023, la température était comprise entre 1 et 22 °C. Les températures moyennes des trois points de la radiale sur cette période sont 12.44; 11.98 et 11.99 °C, de la côte au large (Tableau 4). L'évolution saisonnière de ce paramètre est classique pour un tel écosystème tempéré. Les courbes pluriannuelles de température indiquent une dynamique comparable d'une année sur l'autre.

Les valeurs extrêmes inférieures (et supérieures) ont été observées au cours des années : 1997, 2012, 2013 (1997, 2009, 2018, 2020, 2022, 2024) (Figures 9 à 11).

TABLEAU 4 – Paramètres de tendance centrale et de dispersion pour la température (°C) pour la radiale de Dunkerque sur la période 1990 à 2023.

	Min	Q1	Médiane	Moyenne	Ecart-type	Q3	Max	n
Point 1 Dunkerque	1	8.4	12.1	12.44	4.65	16.7	21.7	449
Point 3 SRN Dunkerque	1.5	8	11.5	11.98	4.46	15.8	21	345
Point 4 SRN Dunkerque	2	8.5	11.6	11.99	4.4	15.9	22	333

TABLEAU 5 – Paramètres de tendance centrale et de dispersion pour la température (°C) pour la radiale de Dunkerque en 2024.

	Min	Q1	Médiane	Moyenne	Ecart-type	Q3	Max	n
Point 1 Dunkerque	6.2	9.73	13.25	13.5	4.41	17.45	20.7	24
Point 3 SRN Dunkerque	7	10.2	13.5	13.41	4.07	16.7	19.9	15
Point 4 SRN Dunkerque	8	10.15	13.3	13.44	3.86	16.7	19.6	15

En 2024, les valeurs se situent entre 6.2 et 20.7 °C et les moyennes sont égales à 13.5, 13.41 et 13.44 °C de la côte au large (Tableaux 4 et 5).

Le gradient côte-large traduit la différence des valeurs entre le point le plus proche de la côte et celui le plus éloigné de celle-ci. Sur la radiale de Dunkerque, en 2024, celui-ci est compris entre -1.1 °C en août et 1.8 °C en janvier (Annexe 1).




FIGURE 9 – Evolution temporelle de la température (°C), des anomalies (écart à la moyenne mensuel) et boîtes de dispersions pour le point 1 de la radiale de Dunkerque et pour la période 1990-2024 (année 2024 en rouge)




FIGURE 10 – Evolution temporelle de la température (°C), des anomalies (écart à la moyenne mensuel) et boîtes de dispersions pour le point 2 de la radiale de Dunkerque et pour la période 1990-2024 (année 2024 en rouge)




FIGURE 11 – Evolution temporelle de la température (°C), des anomalies (écart à la moyenne mensuel) et boîtes de dispersions pour le point 3 de la radiale de Dunkerque et pour la période 1990-2024 (année 2024 en rouge)

3.1.1.2 Salinité

De 1990 à 2023, la salinité était comprise entre 29.9 et 35.7. Les salinités moyennes des trois points de la radiale sur cette période sont 34.07; 34.36 et 34.45, de la côte au large (Tableau 6).

Les valeurs extrêmes inférieures (et supérieures) ont été observées au cours des années : 1992, 1995, 1998, 2002, 2005, 2010, 2020, 2021, 2022 (2004, 2011, 2012, 2013) (Figures 12 à 14).

Tableau 6 – Paramètres de tendance centrale et de dispersion pour la salinité (PSU) pour la radiale de Dunkerque sur la période 1990 à 2023.

	Min	Q1	Médiane	Moyenne	Ecart-type	Q3	Max	n
Point 1 Dunkerque	29.9	33.7	34.2	34.07	0.78	34.6	35.5	472
Point 3 SRN Dunkerque	31.93	34.05	34.46	34.36	0.62	34.79	35.6	367
Point 4 SRN Dunkerque	32.25	34.2	34.5	34.45	0.54	34.8	35.7	354

Tableau 7 – Paramètres de tendance centrale et de dispersion pour la salinité (PSU) pour la radiale de Dunkerque en 2024.

	Min	Q1	Médiane	Moyenne	Ecart-type	Q3	Max	n
Point 1 Dunkerque	32.9	33.7	33.9	33.88	0.43	34.2	34.6	25
Point 3 SRN Dunkerque	33.9	34	34.1	34.17	0.26	34.23	34.8	16
Point 4 SRN Dunkerque	34	34.18	34.3	34.31	0.23	34.4	34.9	16

En 2024, les valeurs se situent entre 32.9 et 34.9 et les moyennes sont égales à 33.88, 34.17 et 34.31 de la côte au large (Tableaux 6 et 7).

Le gradient côte-large traduit la différence des valeurs entre le point le plus proche de la côte et celui le plus éloigné de celle-ci. Sur la radiale de Dunkerque, en 2024, celui-ci est compris entre 0.1 en août et 1.5 en janvier (Annexe 1).




FIGURE 12 – Evolution temporelle de la salinité (PSU), des anomalies (écart à la moyenne mensuel) et boîtes de dispersions pour le point 1 de la radiale de Dunkerque et pour la période 1990-2024 (année 2024 en rouge)




FIGURE 13 – Evolution temporelle de la salinité (PSU), des anomalies (écart à la moyenne mensuel) et boîtes de dispersions pour le point 2 de la radiale de Dunkerque et pour la période 1990-2024 (année 2024 en rouge)




FIGURE 14 – Evolution temporelle de la salinité (PSU), des anomalies (écart à la moyenne mensuel) et boîtes de dispersions pour le point 3 de la radiale de Dunkerque et pour la période 1990-2024 (année 2024 en rouge)

3.1.1.3 Turbidité et matières en suspension .

De 1990 à 2023, la turbidité était comprise entre 0.1 et 63.1. Les turbidités moyennes des trois points de la radiale sur cette période sont 6.83; 3.76 et 2.34, de la côte au large (Tableau 8).

Les valeurs extrêmes inférieures (et supérieures) ont été observées au cours des années : 1993, 1996, 2002, 2003, 2007, 2012, 2014, 2015 (1996, 1998, 1999, 2005, 2006, 2013, 2015, 2016, 2017, 2024) (Figures 15 à 17).

TABLEAU 8 – Paramètres de tendance centrale et de dispersion pour la turbidité (NTU) pour la radiale de Dunkerque sur la période 1990 à 2023.

	Min	Q1	Médiane	Moyenne	Ecart-type	Q3	Max	n
Point 1 Dunkerque	0.6	2.8	4.9	6.83	6.59	8.6	63.1	461
Point 3 SRN Dunkerque	0.1	1.5	2.59	3.76	3.3	4.78	21.1	359
Point 4 SRN Dunkerque	0.1	0.95	1.56	2.34	2.37	2.75	18	350

TABLEAU 9 – Paramètres de tendance centrale et de dispersion pour la turbidité (NTU) pour la radiale de Dunkerque en 2024.

	Min	Q1	Médiane	Moyenne	Ecart-type	Q3	Max	n
Point 1 Dunkerque	3.35	4.89	6.06	8.86	5.27	12.8	24.5	25
Point 3 SRN Dunkerque	1.88	2.78	3.12	4.1	2.67	3.92	11.8	16
Point 4 SRN Dunkerque	0.5	1.18	1.36	1.92	1.25	2.28	4.68	16

En 2024, les valeurs se situent entre 0.5 et 24.5 et les moyennes sont égales à 8.86, 4.1 et 1.92 de la côte au large (Tableaux 8 et 9).

Le gradient côte-large traduit la différence des valeurs entre le point le plus proche de la côte et celui le plus éloigné de celle-ci. Sur la radiale de Dunkerque, en 2024, celui-ci est compris entre -12.05 en février et -2.25 en août (Annexe 1).




FIGURE 15 – Evolution temporelle de la turbidité (NTU), des anomalies (écart à la moyenne mensuel) et boîtes de dispersions pour le point 1 de la radiale de Dunkerque et pour la période 1990-2024 (année 2024 en rouge)




FIGURE 16 – Evolution temporelle de la turbidité (NTU), des anomalies (écart à la moyenne mensuel) et boîtes de dispersions pour le point 2 de la radiale de Dunkerque et pour la période 1990-2024 (année 2024 en rouge)




FIGURE 17 – Evolution temporelle de la turbidité (NTU), des anomalies (écart à la moyenne mensuel) et boîtes de dispersions pour le point 3 de la radiale de Dunkerque et pour la période 1990-2024 (année 2024 en rouge)

3.1.1.4 *M.E.S.* .

De 1990 à 2023, la concentration en matière en suspension était comprise entre 0.3 et 95.2 mg.l⁻¹. Les concentrations en M.E.S moyennes des trois points de la radiale sur cette période sont 13.18; 8.81 et 5.43, de la côte au large (Tableau 10).

Les valeurs extrêmes inférieures (et supérieures) ont été observées au cours des années : 1996, 1998, 2005, 2006, 2007, 2009 (1995, 2005, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2019) (Figures 18 à 20).

Tableau 10 – Paramètres de tendance centrale et de dispersion pour la concentration en M.E.S (mg.l-1) pour la radiale de Dunkerque sur la période 1990 à 2023.

	Min	Q1	Médiane	Moyenne	Ecart-type	Q3	Max	n
Point 1 Dunkerque	1.6	6.15	9.9	13.18	10.83	16.6	95.2	447
Point 3 SRN Dunkerque	0.6	3.8	6.5	8.81	7.23	11.57	46	358
Point 4 SRN Dunkerque	0.3	2.38	3.9	5.43	5.45	6.03	39	344

Tableau 11 – Paramètres de tendance centrale et de dispersion pour la concentration en M.E.S (mg.l-1) pour la radiale de Dunkerque en 2024.

	Min	Q1	Médiane	Moyenne	Ecart-type	Q3	Max	n
Point 1 Dunkerque	5.4	9.1	12.5	13.11	6.14	15.6	31.8	25
Point 3 SRN Dunkerque	3.1	4.88	6.15	6.79	2.82	7.35	13.3	16
Point 4 SRN Dunkerque	1.5	2.48	3.5	3.62	1.38	4.62	5.7	16

En 2024, les valeurs se situent entre 1.5 et 31.8 et les moyennes sont égales à 13.11, 6.79 et 3.62 de la côte au large (Tableaux 10 et 11).

Le gradient côte-large traduit la différence des valeurs entre le point le plus proche de la côte et celui le plus éloigné de celle-ci. Sur la radiale de Dunkerque, en 2024, celui-ci est compris entre -18.4 en mai et -2 en novembre (Annexe 1).




FIGURE 18 – Evolution temporelle de la concentration en M.E.S (mg.l $^{-1}$), des anomalies (écart à la moyenne mensuel) et boîtes de dispersions pour le point 1 de la radiale de Dunkerque et pour la période 1990-2024 (année 2024 en rouge)




FIGURE 19 – Evolution temporelle de la concentration en M.E.S (mg.l⁻¹), des anomalies (écart à la moyenne mensuel) et boîtes de dispersions pour le point 2 de la radiale de Dunkerque et pour la période 1990-2024 (année 2024 en rouge)




FIGURE 20 – Evolution temporelle de la concentration en M.E.S (mg.l⁻¹), des anomalies (écart à la moyenne mensuel) et boîtes de dispersions pour le point 3 de la radiale de Dunkerque et pour la période 1990-2024 (année 2024 en rouge)

3.1.1.5 Matière organique .

De 1990 à 2023, la concentration en M.E.S organique était comprise entre 0.05 et 32.3 mg.l⁻¹. Les concentrations en matière organique moyennes des trois points de la radiale sur cette période sont 2.63; 2.03 et 1.56 mg.l⁻¹, de la côte au large (Tableau 12).

Les valeurs extrêmes inférieures (et supérieures) ont été observées au cours des années : 1995, 1996, 1997, 2003, 2006 (1996, 2001, 2010, 2013, 2014, 2017, 2021) (Figures 21 à 23).

Tableau 12 – Paramètres de tendance centrale et de dispersion pour la concentration en M.E.S organique (mg.l-1) pour la radiale de Dunkerque sur la période 1990 à 2023.

	Min	Q1	Médiane	Moyenne	Ecart-type	Q3	Max	n
Point 1 Dunkerque	0.05	1.45	2	2.63	2.33	2.9	32.3	447
Point 3 SRN Dunkerque	0.05	1.2	1.6	2.03	1.69	2.3	16.7	358
Point 4 SRN Dunkerque	0.07	0.9	1.2	1.56	1.23	1.7	10.4	344

Tableau 13 – Paramètres de tendance centrale et de dispersion pour la concentration en M.E.S organique (mg.l-1) pour la radiale de Dunkerque en 2024.

	Min	Q1	Médiane	Moyenne	Ecart-type	Q3	Max	n
Point 1 Dunkerque	0.9	2.2	2.4	2.82	1.39	2.8	7.5	25
Point 3 SRN Dunkerque	0.4	1.7	1.85	2.03	0.7	2.32	3.5	16
Point 4 SRN Dunkerque	0.6	1.25	1.35	1.38	0.37	1.55	2.2	16

En 2024, les valeurs se situent entre 0.4 et 7.5 mg.l⁻¹ et les moyennes sont égales à 2.82, 2.03 et 1.38 mg.l⁻¹ de la côte au large (Tableaux 12 et 13).

Le gradient côte-large traduit la différence des valeurs entre le point le plus proche de la côte et celui le plus éloigné de celle-ci. Sur la radiale de Dunkerque, en 2024, celui-ci est compris entre -5.8 mg.l⁻¹ en octobre et 0.1 mg.l⁻¹ en novembre (Annexe 1).




FIGURE 21 – Evolution temporelle de la concentration en M.E.S organique (mg.l $^{-1}$), des anomalies (écart à la moyenne mensuel) et boîtes de dispersions pour le point 1 de la radiale de Dunkerque et pour la période 1990-2024 (année 2024 en rouge)




FIGURE 22 – Evolution temporelle de la concentration en M.E.S organique (mg.l⁻¹), des anomalies (écart à la moyenne mensuel) et boîtes de dispersions pour le point 2 de la radiale de Dunkerque et pour la période 1990-2024 (année 2024 en rouge)




FIGURE 23 – Evolution temporelle de la concentration en M.E.S organique (mg.l $^{-1}$), des anomalies (écart à la moyenne mensuel) et boîtes de dispersions pour le point 3 de la radiale de Dunkerque et pour la période 1990-2024 (année 2024 en rouge)

3.1.1.6 *Ammonium* .

De 1990 à 2023, la concentration en ammonium était comprise entre 0.1 et 29.4 μmol.l⁻¹. Les concentrations en ammonium moyennes des trois points de la radiale sur cette période sont 2.32; 1.39 et 1.43 μmol.l⁻¹, de la côte au large (Tableau 14).

Les valeurs extrêmes inférieures (et supérieures) ont été observées au cours des années : 2019, 2022, 2024, 2024 (1992, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2010, 2020) (Figures $24 \ge 26$).

Tableau 14 – Paramètres de tendance centrale et de dispersion pour la concentration en ammonium (µmol.l-1) pour la radiale de Dunkerque sur la période 1990 à 2023.

	Min	Q1	Médiane	Moyenne	Ecart-type	Q3	Max	n
Point 1 Dunkerque	0.1	0.39	1.58	2.32	2.7	3.4	29.4	460
Point 3 SRN Dunkerque	0.15	0.15	0.68	1.39	1.6	2.1	11.2	366
Point 4 SRN Dunkerque	0.15	0.19	0.72	1.43	1.64	2.2	9.4	353

Tableau 15 – Paramètres de tendance centrale et de dispersion pour la concentration en ammonium (µmol.l-1) pour la radiale de Dunkerque en 2024.

	Min	Q1	Médiane	Moyenne	Ecart-type	Q3	Max	n
Point 1 Dunkerque	0.1	0.32	1.1	2.04	2.08	2.9	6.7	25
Point 3 SRN Dunkerque	0.15	0.28	0.7	0.79	0.64	1.05	2.19	16
Point 4 SRN Dunkerque	0.15	0.34	0.72	0.81	0.62	1.04	2	16

En 2024, les valeurs se situent entre 0.1 et $6.7 \,\mu\text{mol.l}^{-1}$ et les moyennes sont égales à 2.04, 0.79 et $0.81 \,\mu\text{mol.l}^{-1}$ de la côte au large (Tableaux 14 et 15).

Le gradient côte-large traduit la différence des valeurs entre le point le plus proche de la côte et celui le plus éloigné de celle-ci. Sur la radiale de Dunkerque, en 2024, celui-ci est compris entre -4.25 μ mol.l⁻¹ en décembre et 0.42 μ mol.l⁻¹ en avril (Annexe 1).




Figure 24 – Evolution temporelle de la concentration en ammonium (μ mol.l⁻¹), des anomalies (écart à la moyenne mensuel) et boîtes de dispersions pour le point 1 de la radiale de Dunkerque et pour la période 1990-2024 (année 2024 en rouge)




FIGURE 25 – Evolution temporelle de la concentration en ammonium (μ mol.l⁻¹), des anomalies (écart à la moyenne mensuel) et boîtes de dispersions pour le point 2 de la radiale de Dunkerque et pour la période 1990-2024 (année 2024 en rouge)




FIGURE 26 – Evolution temporelle de la concentration en ammonium (μ mol.l⁻¹), des anomalies (écart à la moyenne mensuel) et boîtes de dispersions pour le point 3 de la radiale de Dunkerque et pour la période 1990-2024 (année 2024 en rouge)

$3.1.1.7\ Nitrite + Nitrate$

De 1990 à 2023, la concentration en nitrite + nitrate était comprise entre 0.1 et 54.77 µmol.l⁻¹. Les concentrations en nitrite + nitrate des trois points de la radiale sur cette période sont 7.97; 6.39 et 6.16 µmol.l⁻¹, de la côte au large (Tableau 16).

Les valeurs extrêmes inférieures (et supérieures) ont été observées au cours des années : 1994, 1996, 2017, 2018, 2023, 2024 (1992, 1993, 1995, 1998, 2005, 2006, 2009, 2013) (Figures 27 à 29).

Tableau 16 – Paramètres de tendance centrale et de dispersion pour la concentration en nitrite + nitrate (µmol.l-1) pour la radiale de Dunkerque sur la période 1990 à 2023.

	Min	Q1	Médiane	Moyenne	Ecart-type	Q3	Max	n
Point 1 Dunkerque	0.11	0.6	2.45	7.97	10.5	14.03	54.77	458
Point 3 SRN Dunkerque	0.1	0.25	1.95	6.39	8.52	10.83	40.15	367
Point 4 SRN Dunkerque	0.15	0.29	2.1	6.16	7.98	9.83	41.57	353

Tableau 17 – Paramètres de tendance centrale et de dispersion pour la concentration en nitrite + nitrate (µmol.l-1) pour la radiale de Dunkerque en 2024.

	Min	Q1	Médiane	Moyenne	Ecart-type	Q3	Max	n
Point 1 Dunkerque	0.12	0.57	2.3	8.64	10.81	16.8	37.2	25
Point 3 SRN Dunkerque	0.15	0.28	1.81	4.52	6.06	5.13	20.54	16
Point 4 SRN Dunkerque	0.15	0.68	2.18	4.05	5.04	5.06	16.46	16

En 2024, les valeurs se situent entre 0.12 et $37.2 \,\mu\text{mol.l}^{-1}$ et les moyennes sont égales à 8.64, 4.52 et $4.05 \,\mu\text{mol.l}^{-1}$ de la côte au large (Tableaux 16 et 17).

Le gradient côte-large traduit la différence des valeurs entre le point le plus proche de la côte et celui le plus éloigné de celle-ci. Sur la radiale de Dunkerque, en 2024, celui-ci est compris entre -17.53 µmol.l⁻¹ en novembre et 0.6 µmol.l⁻¹ en septembre (Annexe 1).




FIGURE 27 – Evolution temporelle de la concentration en nitrates + nitrites (µmol.l⁻¹), des anomalies (écart à la moyenne mensuel) et boîtes de dispersions pour le point 1 de la radiale de Dunkerque et pour la période 1990-2024 (année 2024 en rouge)




FIGURE 28 – Evolution temporelle de la concentration en nitrates + nitrites (µmol.l⁻¹), des anomalies (écart à la moyenne mensuel) et boîtes de dispersions pour le point 2 de la radiale de Dunkerque et pour la période 1990-2024 (année 2024 en rouge)




FIGURE 29 – Evolution temporelle de la concentration en nitrates + nitrites (μ mol.l⁻¹), des anomalies (écart à la moyenne mensuel) et boîtes de dispersions pour le point 3 de la radiale de Dunkerque et pour la période 1990-2024 (année 2024 en rouge)

3.1.1.8 Phosphate

De 1990 à 2023, la concentration en phosphate était comprise entre 0.01 et 9.8 μmol.l⁻¹. Les concentrations en phosphate moyennes des trois points de la radiale sur cette période sont 0.49; 0.44 et 0.43 μmol.l⁻¹, de la côte au large (Tableau 18).

Les valeurs extrêmes inférieures (et supérieures) ont été observées au cours des années : 1996 (1992, 1993, 1995, 1997, 2004, 2005, 2006, 2009) (Figures 30 à 32).

Tableau 18 – Paramètres de tendance centrale et de dispersion pour la concentration en phosphate (µmol.l-1) pour la radiale de Dunkerque sur la période 1990 à 2023.

	Min	Q1	Médiane	Moyenne	Ecart-type	Q3	Max	n
Point 1 Dunkerque	0.01	0.17	0.37	0.49	0.62	0.63	9.8	459
Point 3 SRN Dunkerque	0.05	0.14	0.35	0.44	0.36	0.63	2	366
Point 4 SRN Dunkerque	0.05	0.13	0.32	0.43	0.39	0.6	2.69	353

Tableau 19 – Paramètres de tendance centrale et de dispersion pour la concentration en phosphate (µmol.l-1) pour la radiale de Dunkerque en 2024.

	Min	Q1	Médiane	Moyenne	Ecart-type	Q3	Max	n
Point 1 Dunkerque	0.05	0.08	0.22	0.3	0.28	0.52	0.98	25
Point 3 SRN Dunkerque	0.05	0.1	0.17	0.24	0.21	0.28	0.73	16
Point 4 SRN Dunkerque	0.05	0.08	0.17	0.22	0.19	0.3	0.61	16

En 2024, les valeurs se situent entre 0.05 et 0.98 µmol.l⁻¹ et les moyennes sont égales à 0.3, 0.24 et 0.22 µmol.l⁻¹ de la côte au large (Tableaux 18 et 19).

Le gradient côte-large traduit la différence des valeurs entre le point le plus proche de la côte et celui le plus éloigné de celle-ci. Sur la radiale de Dunkerque, en 2024, celui-ci est compris entre -0.35 μ mol.l⁻¹ en novembre et 0.15 μ mol.l⁻¹ en mai (Annexe 1).




FIGURE 30 – Evolution temporelle de la concentration en phosphate (μ mol.l⁻¹), des anomalies (écart à la moyenne mensuel) et boîtes de dispersions pour le point 1 de la radiale de Dunkerque et pour la période 1990-2024 (année 2024 en rouge)




FIGURE 31 – Evolution temporelle de la concentration en phosphate (μ mol.l⁻¹), des anomalies (écart à la moyenne mensuel) et boîtes de dispersions pour le point 2 de la radiale de Dunkerque et pour la période 1990-2024 (année 2024 en rouge)




FIGURE 32 – Evolution temporelle de la concentration en phosphate (μ mol.l⁻¹), des anomalies (écart à la moyenne mensuel) et boîtes de dispersions pour le point 3 de la radiale de Dunkerque et pour la période 1990-2024 (année 2024 en rouge)

3.1.1.9 Silicate

De 1990 à 2023, la concentration en silicate était comprise entre 0.1 et $35.2 \,\mu\text{mol.l}^{-1}$. Les concentrations en silicate moyennes des trois points de la radiale sur cette période sont 5.05; 3.07 et $3.03 \,\mu\text{mol.l}^{-1}$, de la côte au large (Tableau 20).

Les valeurs extrêmes inférieures (et supérieures) ont été observées au cours des années : (1993, 1994, 1995, 1998, 2005, 2013, 2024) (Figures 33 à 35).

Tableau 20 – Paramètres de tendance centrale et de dispersion pour la concentration en silicate (µmol.l-1) pour la radiale de Dunkerque sur la période 1990 à 2023.

	Min	Q1	Médiane	Moyenne	Ecart-type	Q3	Max	n
Point 1 Dunkerque	0.1	1.2	3.35	5.05	5.31	6.8	35.2	457
Point 3 SRN Dunkerque	0.1	0.45	1.51	3.07	4.08	4.01	26	365
Point 4 SRN Dunkerque	0.1	0.5	1.6	3.03	3.84	4.2	25.9	353

Tableau 21 – Paramètres de tendance centrale et de dispersion pour la concentration en silicate (µmol.l-1) pour la radiale de Dunkerque en 2024.

	Min	Q1	Médiane	Moyenne	Ecart-type	Q3	Max	n
Point 1 Dunkerque	1.4	2.4	4.2	6.09	5.35	6.9	21.4	25
Point 3 SRN Dunkerque	0.66	0.95	1.44	2.68	3.31	2.54	13.69	16
Point 4 SRN Dunkerque	0.51	0.98	2.52	2.76	2.44	3.07	9.35	15

En 2024, les valeurs se situent entre 0.51 et $21.4 \,\mu\text{mol.l}^{-1}$ et les moyennes sont égales à 6.09, 2.68 et $2.76 \,\mu\text{mol.l}^{-1}$ de la côte au large (Tableaux 20 et 21).

Le gradient côte-large traduit la différence des valeurs entre le point le plus proche de la côte et celui le plus éloigné de celle-ci. Sur la radiale de Dunkerque, en 2024, celui-ci est compris entre -10.15 µmol. l^{-1} en janvier et 0.74 µmol. l^{-1} en août (Annexe 1).




FIGURE 33 – Evolution temporelle de la concentration en silicate (μ mol.l⁻¹), des anomalies (écart à la moyenne mensuel) et boîtes de dispersions pour le point 1 de la radiale de Dunkerque et pour la période 1990-2024 (année 2024 en rouge)




FIGURE 34 – Evolution temporelle de la concentration en silicate (µmol.l⁻¹), des anomalies (écart à la moyenne mensuel) et boîtes de dispersions pour le point 2 de la radiale de Dunkerque et pour la période 1990-2024 (année 2024 en rouge)




FIGURE 35 – Evolution temporelle de la concentration en silicate (μ mol.l⁻¹), des anomalies (écart à la moyenne mensuel) et boîtes de dispersions pour le point 3 de la radiale de Dunkerque et pour la période 1990-2024 (année 2024 en rouge)

3.1.1.10 Oxygène dissous

De 1990 à 2023, la concentration en oxygène dissous était comprise entre 6.91 et 19.2 mg.l⁻¹. Les concentrations en oxygène moyennes des trois points de la radiale sur cette période sont 9.18; 9.14 et 9.15 mg.l⁻¹, de la côte au large (Tableau 22).

Les valeurs extrêmes inférieures (et supérieures) ont été observées au cours des années : 2009, 2020, 2022, 2023 (2008, 2009, 2017) (Figures 36 à 38).

Tableau 22 – Paramètres de tendance centrale et de dispersion pour la concentration en oxygène dissous (mg.l-1) pour la radiale de Dunkerque sur la période 1990 à 2023.

	Min	Q1	Médiane	Moyenne	Ecart-type	Q3	Max	n
Point 1 Dunkerque	6.91	8.02	8.81	9.18	1.54	9.93	19.2	269
Point 3 SRN Dunkerque	7.27	8.16	8.95	9.14	1.15	9.98	11.96	106
Point 4 SRN Dunkerque	7.33	8.16	8.9	9.15	1.18	10.13	12.38	107

Tableau 23 – Paramètres de tendance centrale et de dispersion pour la concentration en oxygène dissous (mg.l-1) pour la radiale de Dunkerque en 2024.

	Min	Q1	Médiane	Moyenne	Ecart-type	Q3	Max	n
Point 1 Dunkerque	7.37	7.93	8.19	8.73	1.09	9.82	10.49	17
Point 3 SRN Dunkerque	7.7	8.18	8.38	8.99	1.13	10.09	10.51	9
Point 4 SRN Dunkerque	7.4	7.62	8.18	8.72	1.19	9.66	10.35	9

En 2024, les valeurs se situent entre 7.37 et 10.51 mg.l^{-1} et les moyennes sont égales à 8.73, 8.99 et 8.72 mg.l⁻¹ de la côte au large (Tableaux 22 et 23).

Le gradient côte-large traduit la différence des valeurs entre le point le plus proche de la côte et celui le plus éloigné de celle-ci. Sur la radiale de Dunkerque, en 2024, celui-ci est compris entre -0.82 mg.l⁻¹ en janvier et 0.3 mg.l⁻¹ en mars (Annexe 1).




FIGURE 36 – Evolution temporelle de l'oxygène dissous (mg.l⁻¹), des anomalies (écart à la moyenne mensuel) et boîtes de dispersions pour le point 1 de la radiale de Dunkerque et pour la période 1990-2024 (année 2024 en rouge)




FIGURE 37 — Evolution temporelle de l'oxygène dissous (mg.l $^{-1}$), des anomalies (écart à la moyenne mensuel) et boîtes de dispersions pour le point 2 de la radiale de Dunkerque et pour la période 1990-2024 (année 2024 en rouge)




FIGURE 38 – Evolution temporelle de l'oxygène dissous (mg.l⁻¹), des anomalies (écart à la moyenne mensuel) et boîtes de dispersions pour le point 3 de la radiale de Dunkerque et pour la période 1990-2024 (année 2024 en rouge)

3.1.1.11 Limitation par les nutriments

Les Figures 39 à 41 représentent l'évolution temporelle des éléments nutritifs potentiellement limitants le long de la radiale de Dunkerque. Les figures délimitent six zones qui définissent, par ordre de priorité, l'élément qui limite majoritairement la croissance des algues au point considéré. En effet, les changements de concentrations en nutriments induisent des changements des rapports stœchiométriques.

Ratios au point Point 1 Dunkerque pour l'année 2024




FIGURE 39 – Évolution temporelle des rapports stœchiométriques définissant les éléments nutritifs potentiellement limitants au point 1 de la radiale de Dunkerque en 2024

Ratios au point Point 3 SRN Dunkerque pour l'année 2024




FIGURE 40 – Évolution temporelle des rapports stœchiométriques définissant les éléments nutritifs potentiellement limitants au point 3 de la radiale de Dunkerque en 2024

Ratios au point Point 4 SRN Dunkerque pour l'année 2024




FIGURE 41 – Évolution temporelle des rapports stœchiométriques définissant les éléments nutritifs potentiellement limitants au point 4 de la radiale de Dunkerque en 2024

3.1.1.12 Chlorophylle-a .

De 1990 à 2023, la concentration en chlorophylle-a était comprise entre 0.05 et 57.28 µg.l⁻¹. Les concentrations en chlorophylle-a moyennes des trois points de la radiale sur cette période sont 6.5; 5.6 et 3.72 µg.l⁻¹, de la côte au large (Tableau 24).

Les valeurs extrêmes inférieures (et supérieures) ont été observées au cours des années : 1993, 1998, 1999, 2002, 2007 (1993, 1994, 1996, 1999, 2001, 2010, 2013, 2016, 2024) (Figures $42 \ à 44$).

Tableau 24 – Paramètres de tendance centrale et de dispersion pour la concentration en chlorophylle-a (µg.l-1) pour la radiale de Dunkerque sur la période 1990 à 2023.

	Min	Q1	Médiane	Moyenne	Ecart-type	Q3	Max	n
Point 1 Dunkerque	0.24	2.46	4.43	6.5	6.9	7.48	53.18	469
Point 3 SRN Dunkerque	0.26	1.95	3.4	5.6	6	7.27	57.28	364
Point 4 SRN Dunkerque	0.05	1.5	2.55	3.72	3.67	4.5	29.2	353

Tableau 25 – Paramètres de tendance centrale et de dispersion pour la concentration en chlorophylle-a (µg.l-1) pour la radiale de Dunkerque en 2024.

	Min	Q1	Médiane	Moyenne	Ecart-type	Q3	Max	n
Point 1 Dunkerque	1.12	2.83	3.84	6.31	6.75	7.21	34.18	25
Point 3 SRN Dunkerque	0.96	3.36	5.16	7.78	8.42	6.52	32.36	16
Point 4 SRN Dunkerque	0.91	2.3	2.76	3.86	3.77	3.31	15.58	16

En 2024, les valeurs se situent entre 0.91 et 34.18 μ g.l⁻¹ et les moyennes sont égales à 6.31, 7.78 et 3.86 μ g.l⁻¹ de la côte au large (Tableaux 24 et 25).

Le gradient côte-large traduit la différence des valeurs entre le point le plus proche de la côte et celui le plus éloigné de celle-ci. Sur la radiale de Dunkerque, en 2024, celui-ci est compris entre -18.6 μ g.l⁻¹ en avril et 0.06 μ g.l⁻¹ en août (Annexe 1).




FIGURE 42 – Evolution temporelle de la chlorophylle-a ($\mu g.l^{-1}$), des anomalies (écart à la moyenne mensuel) et boîtes de dispersions pour le point 1 de la radiale de Dunkerque et pour la période 1990-2024 (année 2024 en rouge)




FIGURE 43 – Evolution temporelle de la chlorophylle-a ($\mu g.l^{-1}$), des anomalies (écart à la moyenne mensuel) et boîtes de dispersions pour le point 2 de la radiale de Dunkerque et pour la période 1990-2024 (année 2024 en rouge)




FIGURE 44 – Evolution temporelle de la chlorophylle-a (µg.l⁻¹), des anomalies (écart à la moyenne mensuel) et boîtes de dispersions pour le point 3 de la radiale de Dunkerque et pour la période 1990-2024 (année 2024 en rouge)

3.1.2 Boulogne-sur-Mer

3.1.2.1 Température

De 1990 à 2023, la température était comprise entre 2.1 et 22.1 °C. Les températures moyennes des trois points de la radiale sur cette période sont 12.74; 12.32 et 12.33 °C, de la côte au large (Tableau 26). L'évolution saisonnière de ce paramètre est classique pour un tel écosystème tempéré. Les courbes pluriannuelles de température indiquent une dynamique comparable d'une année sur l'autre.

Les valeurs extrêmes inférieures (et supérieures) ont été observées au cours des années : 1997, 2005, 2006, 2010, 2013 (1999, 2002, 2003, 2004, 2008, 2018, 2022) (Figures $45 \ à 47$).

Tableau 26 – Paramètres de tendance centrale et de dispersion pour la température (°C) pour la radiale de Boulogne-sur-Mer sur la période 1990 à 2023.

	Min	Q1	Médiane	Moyenne	Ecart-type	Q3	Max	n
Point 1 Boulogne	2.1	8.83	12.5	12.74	4.43	16.78	22.1	522
Point 2 SRN Boulogne	3.5	8.62	12	12.32	4.2	16.1	21.8	418
Point 3 SRN Boulogne	3.7	8.9	12.2	12.33	4.04	16	21.8	412

TABLEAU 27 – Paramètres de tendance centrale et de dispersion pour la température (°C) pour la radiale de Boulogne-sur-Mer en 2024.

	Min	Q1	Médiane	Moyenne	Ecart-type	Q3	Max	n
Point 1 Boulogne	8	9.95	14.15	13.62	3.87	16.62	20.1	24
Point 2 SRN Boulogne	8.3	11.7	14.3	14.08	3.52	16.3	19.3	13
Point 3 SRN Boulogne	9.8	12.18	14.4	14.61	3.05	16.42	19.2	12

En 2024, les valeurs se situent entre 8 et 20.1 °C et les moyennes sont égales à 13.62, 14.08 et 14.61 °C de la côte au large (Tableaux 26 et 27).

Le gradient côte-large traduit la différence des valeurs entre le point le plus proche de la côte et celui le plus éloigné de celle-ci. Sur la radiale de Boulogne-sur-Mer, en 2024, celui-ci est compris entre -1.4 °C en juin et 1.4 °C en décembre (Annexe 1).




FIGURE 45 – Evolution temporelle de la température (°C), des anomalies (écart à la moyenne mensuel) et boîtes de dispersions pour le point 1 de la radiale de Boulogne-sur-Mer et pour la période 1990-2024 (année 2024 en rouge)




FIGURE 46 – Evolution temporelle de la température (°C), des anomalies (écart à la moyenne mensuel) et boîtes de dispersions pour le point 2 de la radiale de Boulogne-sur-Mer et pour la période 1990-2024 (année 2024 en rouge)




FIGURE 47 – Evolution temporelle de la température (°C), des anomalies (écart à la moyenne mensuel) et boîtes de dispersions pour le point 3 de la radiale de Boulogne-sur-Mer et pour la période 1990-2024 (année 2024 en rouge)

3.1.2.2 Salinité

De 1990 à 2023, la salinité était comprise entre 29.14 et 35.9. Les salinités moyennes des trois points de la radiale sur cette période sont 33.96; 34.27 et 34.51, de la côte au large (Tableau 28).

Les valeurs extrêmes inférieures (et supérieures) ont été observées au cours des années : 1993, 1994, 1995, 1996 (2004, 2006, 2007, 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2017, 2018) (Figures 48 à 50).

Tableau 28 – Paramètres de tendance centrale et de dispersion pour la salinité (PSU) pour la radiale de Boulogne-sur-Mer sur la période 1990 à 2023.

	Min	Q1	Médiane	Moyenne	Ecart-type	Q3	Max	n
Point 1 Boulogne	29.14	33.6	34.2	33.96	0.91	34.5	35.3	530
Point 2 SRN Boulogne	29.28	34	34.4	34.27	0.89	34.8	35.6	421
Point 3 SRN Boulogne	29.28	34.2	34.7	34.51	0.87	35	35.9	416

TABLEAU 29 – Paramètres de tendance centrale et de dispersion pour la salinité (PSU) pour la radiale de Boulogne-sur-Mer en 2024.

	Min	Q1	Médiane	Moyenne	Ecart-type	Q3	Max	n
Point 1 Boulogne	33	33.58	33.85	33.81	0.39	34.1	34.5	24
Point 2 SRN Boulogne	33.6	34.1	34.4	34.29	0.33	34.5	34.8	13
Point 3 SRN Boulogne	33.5	34.4	34.5	34.44	0.4	34.6	34.9	13

En 2024, les valeurs se situent entre 33 et 34.9 et les moyennes sont égales à 33.81, 34.29 et 34.44 de la côte au large (Tableaux 28 et 29).

Le gradient côte-large traduit la différence des valeurs entre le point le plus proche de la côte et celui le plus éloigné de celle-ci. Sur la radiale de Boulogne-sur-Mer, en 2024, celui-ci est compris entre 0 en mai et 1 en décembre (Annexe 1).




FIGURE 48 – Evolution temporelle de la salinité (PSU), des anomalies (écart à la moyenne mensuel) et boîtes de dispersions pour le point 1 de la radiale de Boulogne-sur-Mer et pour la période 1990-2024 (année 2024 en rouge)




FIGURE 49 – Evolution temporelle de la salinité (PSU), des anomalies (écart à la moyenne mensuel) et boîtes de dispersions pour le point 2 de la radiale de Boulogne-sur-Mer et pour la période 1990-2024 (année 2024 en rouge)




FIGURE 50 – Evolution temporelle de la salinité (PSU), des anomalies (écart à la moyenne mensuel) et boîtes de dispersions pour le point 3 de la radiale de Boulogne-sur-Mer et pour la période 1990-2024 (année 2024 en rouge)

3.1.2.3 Turbidité et matières en suspension .

De 1990 à 2023, la turbidité était comprise entre 0.1 et 31.9. Les turbidités moyennes des trois points de la radiale sur cette période sont 3.69; 2.3 et 1.34, de la côte au large (Tableau 30).

Les valeurs extrêmes inférieures (et supérieures) ont été observées au cours des années : 1995, 1996, 2001, 2012 (1997, 1998, 2000, 2003, 2004, 2005, 2007, 2013, 2016, 2017, 2022) (Figures 51 à 53).

Tableau 30 – Paramètres de tendance centrale et de dispersion pour la turbidité (NTU) pour la radiale de Boulogne-sur-Mer sur la période 1990 à 2023.

	Min	Q1	Médiane	Moyenne	Ecart-type	Q3	Max	n
Point 1 Boulogne	0.1	1.5	2.6	3.69	3.69	4.2	31.9	534
Point 2 SRN Boulogne	0.11	1.1	1.76	2.3	1.9	2.82	13.8	430
Point 3 SRN Boulogne	0.1	0.73	1.1	1.34	1.03	1.6	9.75	423

TABLEAU 31 – Paramètres de tendance centrale et de dispersion pour la turbidité (NTU) pour la radiale de Boulogne-sur-Mer en 2024.

	Min	Q1	Médiane	Moyenne	Ecart-type	Q3	Max	n
Point 1 Boulogne	1.56	2.03	2.49	3.51	2.25	4.12	11.2	24
Point 2 SRN Boulogne	0.76	1.66	1.95	2.26	1.1	2.37	4.64	13
Point 3 SRN Boulogne	0.91	1.09	1.26	1.56	0.89	1.55	4.15	13

En 2024, les valeurs se situent entre 0.76 et 11.2 et les moyennes sont égales à 3.51, 2.26 et 1.56 de la côte au large (Tableaux 30 et 31).

Le gradient côte-large traduit la différence des valeurs entre le point le plus proche de la côte et celui le plus éloigné de celle-ci. Sur la radiale de Boulogne-sur-Mer, en 2024, celui-ci est compris entre -5.73 en avril et -0.4 en mai (Annexe 1).




FIGURE 51 – Evolution temporelle de la turbidité (NTU), des anomalies (écart à la moyenne mensuel) et boîtes de dispersions pour le point 1 de la radiale de Boulogne-sur-Mer et pour la période 1990-2024 (année 2024 en rouge)




FIGURE 52 – Evolution temporelle de la turbidité (NTU), des anomalies (écart à la moyenne mensuel) et boîtes de dispersions pour le point 2 de la radiale de Boulogne-sur-Mer et pour la période 1990-2024 (année 2024 en rouge)




FIGURE 53 – Evolution temporelle de la turbidité (NTU), des anomalies (écart à la moyenne mensuel) et boîtes de dispersions pour le point 3 de la radiale de Boulogne-sur-Mer et pour la période 1990-2024 (année 2024 en rouge)

3.1.2.4 M.E.S. .

De 1990 à 2023, la concentration en matière en suspension était comprise entre 0.05 et 95.2 mg.l⁻¹. Les concentrations en M.E.S moyennes des trois points de la radiale sur cette période sont 8.1; 5.33 et 3.67, de la côte au large (Tableau 32).

Les valeurs extrêmes inférieures (et supérieures) ont été observées au cours des années : 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1999 (1995, 1996, 2000, 2002, 2003, 2004, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2021) (Figures 54 à 56).

Tableau 32 – Paramètres de tendance centrale et de dispersion pour la concentration en M.E.S (mg.l-1) pour la radiale de Boulogne-sur-Mer sur la période 1990 à 2023.

	Min	Q1	Médiane	Moyenne	Ecart-type	Q3	Max	n
Point 1 Boulogne	0.05	3.5	5.65	8.1	7.65	9.2	46.4	510
Point 2 SRN Boulogne	0.05	2.2	3.8	5.33	5.76	6.1	46.3	430
Point 3 SRN Boulogne	0.05	1.2	2.3	3.67	6.43	3.7	95.2	422

Tableau 33 – Paramètres de tendance centrale et de dispersion pour la concentration en M.E.S (mg.l-1) pour la radiale de Boulogne-sur-Mer en 2024.

	Min	Q1	Médiane	Moyenne	Ecart-type	Q3	Max	n
Point 1 Boulogne	1.9	3.15	4.7	5.13	2.64	6.43	12.3	24
Point 2 SRN Boulogne	2	2.6	4.2	4.06	1.65	4.9	6.9	13
Point 3 SRN Boulogne	0.9	1.9	2.8	2.98	1.64	4	6.6	13

En 2024, les valeurs se situent entre 0.9 et 12.3 et les moyennes sont égales à 5.13, 4.06 et 2.98 de la côte au large (Tableaux 32 et 33)..

Le gradient côte-large traduit la différence des valeurs entre le point le plus proche de la côte et celui le plus éloigné de celle-ci. Sur la radiale de Boulogne-sur-Mer, en 2024, celui-ci est compris entre -7.5 en avril et 0.4 en octobre (Annexe 1).




FIGURE 54 – Evolution temporelle de la concentration en M.E.S (mg.l $^{-1}$), des anomalies (écart à la moyenne mensuel) et boîtes de dispersions pour le point 1 de la radiale de Boulogne-sur-Mer et pour la période 1990-2024 (année 2024 en rouge)




FIGURE 55 – Evolution temporelle de la concentration en M.E.S (mg.l $^{-1}$), des anomalies (écart à la moyenne mensuel) et boîtes de dispersions pour le point 2 de la radiale de Boulogne-sur-Mer et pour la période 1990-2024 (année 2024 en rouge)




FIGURE 56 – Evolution temporelle de la concentration en M.E.S (mg.l $^{-1}$), des anomalies (écart à la moyenne mensuel) et boîtes de dispersions pour le point 3 de la radiale de Boulogne-sur-Mer et pour la période 1990-2024 (année 2024 en rouge)

3.1.2.5 Matière organique .

De 1990 à 2023, la concentration en M.E.S organique était comprise entre 0 et 34.7 mg.l⁻¹. Les concentrations en matière organique moyennes des trois points de la radiale sur cette période sont 1.9; 1.45 et 1.2 mg.l⁻¹, de la côte au large (Tableau 34).

Les valeurs extrêmes inférieures (et supérieures) ont été observées au cours des années : 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2006 (2002, 2003, 2011, 2012, 2013, 2014, 2021) (Figures 57 à 59).

Tableau 34 – Paramètres de tendance centrale et de dispersion pour la concentration en M.E.S organique (mg.l-1) pour la radiale de Boulogne-sur-Mer sur la période 1990 à 2023.

	Min	Q1	Médiane	Moyenne	Ecart-type	Q3	Max	n
Point 1 Boulogne	0	1.1	1.44	1.9	2.04	2	34.7	511
Point 2 SRN Boulogne	0	0.8	1.1	1.45	1.23	1.6	9.9	429
Point 3 SRN Boulogne	0	0.7	0.9	1.2	1.13	1.3	8.8	422

Tableau 35 – Paramètres de tendance centrale et de dispersion pour la concentration en M.E.S organique (mg.l-1) pour la radiale de Boulogne-sur-Mer en 2024.

	Min	Q1	Médiane	Moyenne	Ecart-type	Q3	Max	n
Point 1 Boulogne	0.7	1.1	1.4	1.5	0.53	1.72	2.8	24
Point 2 SRN Boulogne	0.9	1.2	1.4	1.43	0.33	1.6	2.1	13
Point 3 SRN Boulogne	0.7	0.9	1.1	1.28	0.48	1.6	2.2	13

En 2024, les valeurs se situent entre 0.7 et 2.8 mg.l⁻¹ et les moyennes sont égales à 1.5, 1.43 et 1.28 mg.l⁻¹ de la côte au large (Tableaux 34 et 35).

Le gradient côte-large traduit la différence des valeurs entre le point le plus proche de la côte et celui le plus éloigné de celle-ci. Sur la radiale de Boulogne-sur-Mer, en 2024, celui-ci est compris entre -0.9 mg.l⁻¹ en mars et 0.8 mg.l⁻¹ en février (Annexe 1).




FIGURE 57 – Evolution temporelle de la concentration en M.E.S organique (mg.l $^{-1}$), des anomalies (écart à la moyenne mensuel) et boîtes de dispersions pour le point 1 de la radiale de Boulogne-sur-Mer et pour la période 1990-2024 (année 2024 en rouge)




FIGURE 58 – Evolution temporelle de la concentration en M.E.S organique (mg.l $^{-1}$), des anomalies (écart à la moyenne mensuel) et boîtes de dispersions pour le point 2 de la radiale de Boulogne-sur-Mer et pour la période 1990-2024 (année 2024 en rouge)




FIGURE 59 – Evolution temporelle de la concentration en M.E.S organique (mg.l $^{-1}$), des anomalies (écart à la moyenne mensuel) et boîtes de dispersions pour le point 3 de la radiale de Boulogne-sur-Mer et pour la période 1990-2024 (année 2024 en rouge)

3.1.2.6 *Ammonium* .

De 1990 à 2023, la concentration en ammonium était comprise entre 0.04 et 10.82 μmol.l⁻¹. Les concentrations en ammonium moyennes des trois points de la radiale sur cette période sont 1.41; 1.07 et 0.96 μmol.l⁻¹, de la côte au large (Tableau 36).

Les valeurs extrêmes inférieures (et supérieures) ont été observées au cours des années : 1992, 1994 (1995, 1997, 1998, 2002, 2013, 2018, 2020, 2021, 2024) (Figures $60 \stackrel{.}{a} 62$).

Tableau 36 – Paramètres de tendance centrale et de dispersion pour la concentration en ammonium (µmol.l-1) pour la radiale de Boulogne-sur-Mer sur la période 1990 à 2023.

	Min	Q1	Médiane	Moyenne	Ecart-type	Q3	Max	n
Point 1 Boulogne	0.06	0.42	1	1.41	1.39	1.9	10.2	516
Point 2 SRN Boulogne	0.1	0.4	0.78	1.07	1.07	1.33	10.82	429
Point 3 SRN Boulogne	0.04	0.34	0.65	0.96	1	1.3	9.77	422

Tableau 37 – Paramètres de tendance centrale et de dispersion pour la concentration en ammonium (µmol.l-1) pour la radiale de Boulogne-sur-Mer en 2024.

	Min	Q1	Médiane	Moyenne	Ecart-type	Q3	Max	n
Point 1 Boulogne	0.1	1.08	2.5	3.06	2.23	4.78	7.6	24
Point 2 SRN Boulogne	0.15	0.59	1.28	1.53	1.28	2.18	4.17	13
Point 3 SRN Boulogne	0.15	0.76	1.07	1.34	1.04	1.61	3.41	13

En 2024, les valeurs se situent entre 0.1 et 7.6 µmol.l⁻¹ et les moyennes sont égales à 3.06, 1.53 et 1.34 µmol.l⁻¹ de la côte au large (Tableaux 36 et 37).

Le gradient côte-large traduit la différence des valeurs entre le point le plus proche de la côte et celui le plus éloigné de celle-ci. Sur la radiale de Boulogne-sur-Mer, en 2024, celui-ci est compris entre -6.27 µmol.l⁻¹ en avril et 1.29 µmol.l⁻¹ en septembre (Annexe 1).




Figure 60 – Evolution temporelle de la concentration en ammonium (µmol.l $^{-1}$), des anomalies (écart à la moyenne mensuel) et boîtes de dispersions pour le point 1 de la radiale de Boulogne-sur-Mer et pour la période 1990-2024 (année 2024 en rouge)




Figure 61 – Evolution temporelle de la concentration en ammonium (µmol.l $^{-1}$), des anomalies (écart à la moyenne mensuel) et boîtes de dispersions pour le point 2 de la radiale de Boulogne-sur-Mer et pour la période 1990-2024 (année 2024 en rouge)




FIGURE 62 – Evolution temporelle de la concentration en ammonium (µmol.l $^{-1}$), des anomalies (écart à la moyenne mensuel) et boîtes de dispersions pour le point 3 de la radiale de Boulogne-sur-Mer et pour la période 1990-2024 (année 2024 en rouge)

$3.1.2.7 \ Nitrite + Nitrate$

De 1990 à 2023, la concentration en nitrite + nitrate était comprise entre 0.12 et 64.59 µmol.l⁻¹. Les concentrations en nitrite + nitrate des trois points de la radiale sur cette période sont 6.58; 5.7 et 5.02 µmol.l⁻¹, de la côte au large (Tableau 38).

Les valeurs extrêmes inférieures (et supérieures) ont été observées au cours des années : 2017, 2022, 2023 (1994, 2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2012) (Figures 63 à 65).

Tableau 38 – Paramètres de tendance centrale et de dispersion pour la concentration en nitrite + nitrate (µmol.l-1) pour la radiale de Boulogne-sur-Mer sur la période 1990 à 2023.

	Min	Q1	Médiane	Moyenne	Ecart-type	Q3	Max	n
Point 1 Boulogne	0.12	0.57	2	6.58	8.47	11.28	43.81	514
Point 2 SRN Boulogne	0.15	0.31	1.63	5.7	7.28	10.6	44.38	428
Point 3 SRN Boulogne	0.14	0.3	1.57	5.02	6.81	8.65	64.59	419

Tableau 39 – Paramètres de tendance centrale et de dispersion pour la concentration en nitrite + nitrate (µmol.l-1) pour la radiale de Boulogne-sur-Mer en 2024.

	Min	Q1	Médiane	Moyenne	Ecart-type	Q3	Max	n
Point 1 Boulogne	0.64	3.08	8.65	9.78	7.73	15.65	26.8	24
Point 2 SRN Boulogne	0.36	1.01	2.11	4.4	4.79	5.05	16.05	13
Point 3 SRN Boulogne	0.26	1.15	2.29	3.6	3.93	3.53	13.87	13

En 2024, les valeurs se situent entre 0.26 et $26.8 \ \mu mol.l^{-1}$ et les moyennes sont égales à 9.78, 4.4 et $3.6 \ \mu mol.l^{-1}$ de la côte au large (Tableaux 38 et 39).

Le gradient côte-large traduit la différence des valeurs entre le point le plus proche de la côte et celui le plus éloigné de celle-ci. Sur la radiale de Boulogne-sur-Mer, en 2024, celui-ci est compris entre -10.21 µmol.l⁻¹ en décembre et 0.57 µmol.l⁻¹ en septembre (Annexe 1).




FIGURE 63 – Evolution temporelle de la concentration en nitrates + nitrites (μ mol.l⁻¹), des anomalies (écart à la moyenne mensuel) et boîtes de dispersions pour le point 1 de la radiale de Boulogne-sur-Mer et pour la période 1990-2024 (année 2024 en rouge)




FIGURE 64 – Evolution temporelle de la concentration en nitrates + nitrites (μ mol.l⁻¹), des anomalies (écart à la moyenne mensuel) et boîtes de dispersions pour le point 2 de la radiale de Boulogne-sur-Mer et pour la période 1990-2024 (année 2024 en rouge)




FIGURE 65 – Evolution temporelle de la concentration en nitrates + nitrites (μ mol.l⁻¹), des anomalies (écart à la moyenne mensuel) et boîtes de dispersions pour le point 3 de la radiale de Boulogne-sur-Mer et pour la période 1990-2024 (année 2024 en rouge)

3.1.2.8 Phosphate

De 1990 à 2023, la concentration en phosphate était comprise entre 0.04 et 3.1 μmol.l⁻¹. Les concentrations en phosphate moyennes des trois points de la radiale sur cette période sont 0.39; 0.41 et 0.38 μmol.l⁻¹, de la côte au large (Tableau 40).

Les valeurs extrêmes inférieures (et supérieures) ont été observées au cours des années : 1994 (1993, 1995, 1996, 2005, 2007, 2008, 2009, 2012) (Figures 66 à 68).

Tableau 40 – Paramètres de tendance centrale et de dispersion pour la concentration en phosphate (µmol.l-1) pour la radiale de Boulogne-sur-Mer sur la période 1990 à 2023.

	Min	Q1	Médiane	Moyenne	Ecart-type	Q3	Max	n
Point 1 Boulogne	0.05	0.14	0.26	0.39	0.37	0.52	3.1	518
Point 2 SRN Boulogne	0.05	0.11	0.3	0.41	0.37	0.6	2.4	431
Point 3 SRN Boulogne	0.04	0.11	0.3	0.38	0.34	0.56	2.3	423

Tableau 41 – Paramètres de tendance centrale et de dispersion pour la concentration en phosphate (µmol.l-1) pour la radiale de Boulogne-sur-Mer en 2024.

	Min	Q1	Médiane	Moyenne	Ecart-type	Q3	Max	n
Point 1 Boulogne	0.05	0.18	0.3	0.31	0.18	0.47	0.6	24
Point 2 SRN Boulogne	0.05	0.1	0.2	0.27	0.2	0.47	0.63	13
Point 3 SRN Boulogne	0.05	0.09	0.13	0.24	0.21	0.35	0.74	13

En 2024, les valeurs se situent entre 0.05 et 0.74 µmol.l⁻¹ et les moyennes sont égales à 0.31, 0.27 et 0.24 µmol.l⁻¹ de la côte au large (Tableaux 40 et 41)..

Le gradient côte-large traduit la différence des valeurs entre le point le plus proche de la côte et celui le plus éloigné de celle-ci. Sur la radiale de Boulogne-sur-Mer, en 2024, celui-ci est compris entre -0.47 μ mol.l⁻¹ en juin et 0.3 μ mol.l⁻¹ en mai (Annexe 1).




FIGURE 66 – Evolution temporelle de la concentration en phosphate (μ mol.l⁻¹), des anomalies (écart à la moyenne mensuel) et boîtes de dispersions pour le point 1 de la radiale de Boulogne-sur-Mer et pour la période 1990-2024 (année 2024 en rouge)




FIGURE 67 – Evolution temporelle de la concentration en phosphate (μ mol.l⁻¹), des anomalies (écart à la moyenne mensuel) et boîtes de dispersions pour le point 2 de la radiale de Boulogne-sur-Mer et pour la période 1990-2024 (année 2024 en rouge)




FIGURE 68 – Evolution temporelle de la concentration en phosphate (μ mol.l⁻¹), des anomalies (écart à la moyenne mensuel) et boîtes de dispersions pour le point 3 de la radiale de Boulogne-sur-Mer et pour la période 1990-2024 (année 2024 en rouge)

3.1.2.9 Silicate

De 1990 à 2023, la concentration en silicate était comprise entre 0.1 et $19.01 \,\mu\text{mol.l}^{-1}$. Les concentrations en silicate moyennes des trois points de la radiale sur cette période sont 3.28; 2.63 et $2.37 \,\mu\text{mol.l}^{-1}$, de la côte au large (Tableau 42).

Les valeurs extrêmes inférieures (et supérieures) ont été observées au cours des années : (1994, 2002, 2003, 2005, 2007, 2009, 2012, 2014, 2023, 2024) (Figures 69 à 71).

Tableau 42 – Paramètres de tendance centrale et de dispersion pour la concentration en silicate (µmol.l-1) pour la radiale de Boulogne-sur-Mer sur la période 1990 à 2023.

	Min	Q1	Médiane	Moyenne	Ecart-type	Q3	Max	n
Point 1 Boulogne	0.1	0.52	1.82	3.28	3.72	4.4	19.01	514
Point 2 SRN Boulogne	0.1	0.25	1.52	2.63	3.02	3.78	18.9	428
Point 3 SRN Boulogne	0.1	0.25	1.65	2.37	2.66	3.42	16.5	420

Tableau 43 – Paramètres de tendance centrale et de dispersion pour la concentration en silicate (µmol.l-1) pour la radiale de Boulogne-sur-Mer en 2024.

	Min	Q1	Médiane	Moyenne	Ecart-type	Q3	Max	n
Point 1 Boulogne	1.3	3.7	6	6.41	4.36	8.17	21.6	24
Point 2 SRN Boulogne	0.84	2.1	2.53	3.35	2.21	6.14	6.97	13
Point 3 SRN Boulogne	0.76	1.25	2.29	2.81	1.9	4.96	5.92	13

En 2024, les valeurs se situent entre 0.76 et $21.6 \ \mu mol.l^{-1}$ et les moyennes sont égales à 6.41, 3.35 et $2.81 \ \mu mol.l^{-1}$ de la côte au large (Tableaux 42 et 43).

Le gradient côte-large traduit la différence des valeurs entre le point le plus proche de la côte et celui le plus éloigné de celle-ci. Sur la radiale de Boulogne-sur-Mer, en 2024, celui-ci est compris entre -5.85 μ mol.l⁻¹ en août et 1.34 μ mol.l⁻¹ en juin (Annexe 1).




FIGURE 69 – Evolution temporelle de la concentration en silicate (μ mol.l⁻¹), des anomalies (écart à la moyenne mensuel) et boîtes de dispersions pour le point 1 de la radiale de Boulogne-sur-Mer et pour la période 1990-2024 (année 2024 en rouge)




FIGURE 70 – Evolution temporelle de la concentration en silicate (μ mol.l⁻¹), des anomalies (écart à la moyenne mensuel) et boîtes de dispersions pour le point 2 de la radiale de Boulogne-sur-Mer et pour la période 1990-2024 (année 2024 en rouge)




FIGURE 71 – Evolution temporelle de la concentration en silicate (μ mol.l⁻¹), des anomalies (écart à la moyenne mensuel) et boîtes de dispersions pour le point 3 de la radiale de Boulogne-sur-Mer et pour la période 1990-2024 (année 2024 en rouge)

3.1.2.10 Oxygène dissous

De 1990 à 2023, la concentration en oxygène dissous était comprise entre 6.26 et 12.5 mg.l⁻¹. Les concentrations en oxygène moyennes des trois points de la radiale sur cette période sont 8.88; 8.8 et 8.91 mg.l⁻¹, de la côte au large (Tableau 44).

Les valeurs extrêmes inférieures (et supérieures) ont été observées au cours des années : 2007, 2008, 2009, 2022, 2024 (2007, 2008, 2011, 2017, 2018) (Figures $72 \grave{a} 74$).

Tableau 44 – Paramètres de tendance centrale et de dispersion pour la concentration en oxygène dissous (mg.l-1) pour la radiale de Boulogne-sur-Mer sur la période 1990 à 2023.

	Min	Q1	Médiane	Moyenne	Ecart-type	Q3	Max	n
Point 1 Boulogne	6.26	7.91	8.59	8.88	1.21	9.77	12.5	288
Point 2 SRN Boulogne	6.69	7.96	8.59	8.8	1.06	9.57	11.31	112
Point 3 SRN Boulogne	7.22	8.04	8.82	8.91	1.03	9.81	11.35	114

Tableau 45 – Paramètres de tendance centrale et de dispersion pour la concentration en oxygène dissous (mg.l-1) pour la radiale de Boulogne-sur-Mer en 2024.

	Min	Q1	Médiane	Moyenne	Ecart-type	Q3	Max	n
Point 1 Boulogne	6.73	7.19	7.6	8.24	1.32	9.04	11.34	21
Point 2 SRN Boulogne	7.26	7.39	8.17	8.44	1.23	9.13	11.2	11
Point 3 SRN Boulogne	7.23	7.46	8.02	8.3	1.21	8.61	11.32	10

En 2024, les valeurs se situent entre 6.73 et 11.34 mg.l⁻¹ et les moyennes sont égales à 8.24, 8.44 et 8.3 mg.l⁻¹ de la côte au large (Tableaux 44 et 45).

Le gradient côte-large traduit la différence des valeurs entre le point le plus proche de la côte et celui le plus éloigné de celle-ci. Sur la radiale de Boulogne-sur-Mer, en 2024, celui-ci est compris entre -0.26 mg.l⁻¹ en septembre et 0.88 mg.l⁻¹ en juillet (Annexe 1).




FIGURE 72 – Evolution temporelle de l'oxygène dissous (mg.l $^{-1}$), des anomalies (écart à la moyenne mensuel) et boîtes de dispersions pour le point 1 de la radiale de Boulogne-sur-Mer et pour la période 1990-2024 (année 2024 en rouge)




FIGURE 73 – Evolution temporelle de l'oxygène dissous (mg.l $^{-1}$), des anomalies (écart à la moyenne mensuel) et boîtes de dispersions pour le point 2 de la radiale de Boulogne-sur-Mer et pour la période 1990-2024 (année 2024 en rouge)




FIGURE 74 – Evolution temporelle de l'oxygène dissous (mg.l $^{-1}$), des anomalies (écart à la moyenne mensuel) et boîtes de dispersions pour le point 3 de la radiale de Boulogne-sur-Mer et pour la période 1990-2024 (année 2024 en rouge)

3.1.2.11 Limitation par les nutriments

Les Figures 75 à 77 représentent l'évolution temporelle des éléments nutritifs potentiellement limitants le long de la radiale de Boulogne-sur-mer. Les figures délimitent six zones qui définissent, par ordre de priorité, l'élément qui limite majoritairement la croissance des algues au point considéré. En effet, les changements de concentrations en nutriments induisent des changements des rapports stœchiométriques.

Ratios au point Point 1 Boulogne pour l'année 2024




FIGURE 75 – Évolution temporelle des rapports stœchiométriques définissant les éléments nutritifs potentiellement limitants au point 1 de la radiale de Boulogne-sur-Mer en 2024

Ratios au point Point 2 SRN Boulogne pour l'année 2024




FIGURE 76 – Évolution temporelle des rapports stœchiométriques définissant les éléments nutritifs potentiellement limitants au point 2 de la radiale de Boulogne-sur-Mer en 2024

Ratios au point Point 3 SRN Boulogne pour l'année 2024




FIGURE 77 – Évolution temporelle des rapports stœchiométriques définissant les éléments nutritifs potentiellement limitants au point 3 de la radiale de Boulogne-sur-Mer en 2024

3.1.2.12 Chlorophylle-a .

De 1990 à 2023, la concentration en chlorophylle-a était comprise entre 0.01 et 29.6 μ g.l⁻¹. Les concentrations en chlorophylle-a moyennes des trois points de la radiale sur cette période sont 5.01; 3.43 et 2.13 μ g.l⁻¹, de la côte au large (Tableau 46).

Les valeurs extrêmes inférieures (et supérieures) ont été observées au cours des années : 1992, 2002 (1994, 2000, 2002, 2003, 2008, 2009, 2011, 2015, 2024) (Figures 78 à 80).

Tableau 46 – Paramètres de tendance centrale et de dispersion pour la concentration en chlorophylle-a (µg.l-1) pour la radiale de Boulogne-sur-Mer sur la période 1990 à 2023.

	Min	Q1	Médiane	Moyenne	Ecart-type	Q3	Max	n
Point 1 Boulogne	0.01	1.74	3.33	5.01	4.63	6.94	29.6	534
Point 2 SRN Boulogne	0.05	1.29	2.29	3.43	3.32	4.49	19.22	426
Point 3 SRN Boulogne	0.02	0.82	1.38	2.13	2.21	2.56	16.32	416

Tableau 47 – Paramètres de tendance centrale et de dispersion pour la concentration en chlorophylle-a (µg.l-1) pour la radiale de Boulogne-sur-Mer en 2024.

	Min	Q1	Médiane	Moyenne	Ecart-type	Q3	Max	n
Point 1 Boulogne	0.64	1.02	1.63	3.99	7.4	2.59	35.24	24
Point 2 SRN Boulogne	0.41	1.01	1.6	3.71	6.73	3.33	25.69	13
Point 3 SRN Boulogne	0.6	0.76	1.28	2.84	5.22	2.03	20.03	13

En 2024, les valeurs se situent entre 0.41 et $35.24 \mu g.l^{-1}$ et les moyennes sont égales à 3.99, 3.71 et $2.84 \mu g.l^{-1}$ de la côte au large (Tableaux 46 et 47).

Le gradient côte-large traduit la différence des valeurs entre le point le plus proche de la côte et celui le plus éloigné de celle-ci. Sur la radiale de Boulogne-sur-Mer, en 2024, celui-ci est compris entre -15.21 $\mu g.l^{-1}$ en mars et 0.06 $\mu g.l^{-1}$ en octobre (Annexe 1).




FIGURE 78 – Evolution temporelle de la chlorophylle-a (µg.l⁻¹), des anomalies (écart à la moyenne mensuel) et boîtes de dispersions pour le point 1 de la radiale de Boulogne-sur-Mer et pour la période 1990-2024 (année 2024 en rouge)




FIGURE 79 – Evolution temporelle de la chlorophylle-a (µg.l⁻¹), des anomalies (écart à la moyenne mensuel) et boîtes de dispersions pour le point 2 de la radiale de Boulogne-sur-Mer et pour la période 1990-2024 (année 2024 en rouge)




FIGURE 80 – Evolution temporelle de la chlorophylle-a (µg.l⁻¹), des anomalies (écart à la moyenne mensuel) et boîtes de dispersions pour le point 3 de la radiale de Boulogne-sur-Mer et pour la période 1990-2024 (année 2024 en rouge)

3.1.3 La Baie de Somme

3.1.3.1 Température

De 1990 à 2023, la température était comprise entre 2 et 22.9 °C. Les températures moyennes des quatre points de la radiale sur cette période sont 13.11; 12.64; 12.85 et 12.77 °C, de la côte au large (Tableau 48). L'évolution saisonnière de ce paramètre est classique pour un tel écosystème tempéré. Les courbes pluriannuelles de température indiquent une dynamique comparable d'une année sur l'autre.

Les valeurs extrêmes inférieures (et supérieures) ont été observées au cours des années : 1997, 2010, 2012, 2013, 2018 (2003, 2018, 2020, 2022) (Figures 81 à 84).

Tableau 48 – Paramètres de tendance centrale et de dispersion pour la température (°C) pour la radiale de la Baie de Somme sur la période 1990 à 2023.

	Min	Q1	Médiane	Moyenne	Ecart-type	Q3	Max	n
At so	2	9	13	13.11	4.72	17.5	22.1	509
Bif	2.5	8.36	12.4	12.64	4.76	17	22.9	447
Mimer	3	8.53	12.55	12.85	4.77	17.2	22.8	362
SRN Somme mer 2	3	9	12.5	12.77	4.46	16.7	21.9	413

TABLEAU 49 – Paramètres de tendance centrale et de dispersion pour la température (°C) pour la radiale de la Baie de Somme en 2024.

	Min	Q1	Médiane	Moyenne	Ecart-type	Q3	Max	n
At so	7.6	9.58	13.4	13.59	4.45	17.62	20.9	24
Bif	4.7	9.8	13.25	13.47	4.62	16.4	20.9	16
Mimer	5.8	9.88	13.2	13.5	4.42	16.38	20.7	16
SRN Somme mer 2	7.9	10.62	13.55	13.6	4.09	16.68	20.5	16

En 2024, les valeurs se situent entre 4.7 et 20.9 °C et les moyennes sont égales à 13.47, 13.5, 13.59 et 13.6 °C de la côte au large (Tableaux 48 et 49).

Le gradient côte-large traduit la différence des valeurs entre le point le plus proche de la côte et celui le plus éloigné de celle-ci. Sur la radiale de la Baie de Somme, en 2024, celui-ci est compris entre -0.4 °C en juin et 0.6 °C en décembre (Annexe 1).




FIGURE 81 – Evolution temporelle de la température (°C), des anomalies (écart à la moyenne mensuel) et boîtes de dispersions pour le point 'Bif' de la radiale de la Baie de Somme et pour la période 1990-2024 (année 2024 en rouge)




FIGURE 82 – Evolution temporelle de la température (°C), des anomalies (écart à la moyenne mensuel) et boîtes de dispersions pour le point 'At so' de la radiale de Baie de Somme et pour la période 1990-2024 (année 2024 en rouge)




Figure 83 – Evolution temporelle de la température (°C), des anomalies (écart à la moyenne mensuel) et boîtes de dispersions pour le point 'Mimer' de la radiale de Baie de Somme et pour la période 1990-2024 (année 2024 en rouge)




FIGURE 84 – Evolution temporelle de la température (°C), des anomalies (écart à la moyenne mensuel) et boîtes de dispersions pour le point 'SRN Somme mer 2' de la radiale de Baie de Somme et pour la période 1990-2024 (année 2024 en rouge)

3.1.3.2 Salinité

De 1990 à 2023, la salinité était comprise entre 9.1 et 35.8. Les salinités moyennes des quatre points de la radiale sur cette période sont 32.81; 31.67; 32.69 et 33.32, de la côte au large (Tableau 50).

Les valeurs extrêmes inférieures (et supérieures) ont été observées au cours des années : 1992, 1993, 1994, 1996, 2000, 2001, 2002, 2009, 2014 (2003, 2004, 2007, 2010, 2011, 2017, 2019, 2023) (Figures 85 à 88).

Tableau 50 – Paramètres de tendance centrale et de dispersion pour la salinité (PSU) pour la radiale de la Baie de Somme sur la période 1990 à 2023.

	Min	Q1	Médiane	Moyenne	Ecart-type	Q3	Max	n
At so	26	32.3	33.2	32.81	1.41	33.7	35.1	517
Bif	9.1	31.2	32.2	31.67	2.48	33.1	35	453
Mimer	29.2	32.23	32.8	32.69	0.83	33.3	34.7	370
SRN Somme mer 2	28	32.82	33.6	33.32	1.29	34.2	35.8	418

Tableau 51 – Paramètres de tendance centrale et de dispersion pour la salinité (PSU) pour la radiale de la baie de Somme en 2024.

	Min	Q1	Médiane	Moyenne	Ecart-type	Q3	Max	n
At so	31.9	32.58	32.8	32.83	0.52	33.12	34.2	24
Bif	30.2	31.48	31.95	31.84	0.76	32.32	32.9	16
Mimer	30.8	31.8	32.2	32.14	0.54	32.52	32.9	16
SRN Somme mer 2	32.3	32.9	33.15	33.12	0.44	33.5	33.9	16

En 2024, les valeurs se situent entre 30.2 et 34.2 et les moyennes sont égales à 31.84, 32.14, 32.83 et 33.12 de la côte au large (Tableaux 50 et 51).

Le gradient côte-large traduit la différence des valeurs entre le point le plus proche de la côte et celui le plus éloigné de celle-ci. Sur la radiale de la Baie de Somme, en 2024, celui-ci est compris entre 0.1 en juin, novembre et 0.5 en juin, décembre (Annexe 1).




FIGURE 85 – Evolution temporelle de la salinité (PSU), des anomalies (écart à la moyenne mensuel) et boîtes de dispersions pour le point 'Bif' de la radiale de la Baie de Somme et pour la période 1990-2024 (année 2024 en rouge)




FIGURE 86 – Evolution temporelle de la salinité (PSU), des anomalies (écart à la moyenne mensuel) et boîtes de dispersions pour le point 'At so' de la radiale de Baie de Somme et pour la période 1990-2024 (année 2024 en rouge)




FIGURE 87 – Evolution temporelle de la salinité (PSU), des anomalies (écart à la moyenne mensuel) et boîtes de dispersions pour le point 'Mimer' de la radiale de Baie de Somme et pour la période 1990-2024 (année 2024 en rouge)




FIGURE 88 – Evolution temporelle de la salinité (PSU), des anomalies (écart à la moyenne mensuel) et boîtes de dispersions pour le point 'SRN Somme mer 2' de la radiale de Baie de Somme et pour la période 1990-2024 (année 2024 en rouge)

3.1.3.3 Turbidité et matières en suspension .

De 1990 à 2023, la turbidité était comprise entre 0.23 et 150. Les turbidités moyennes des quatre points de la radiale sur cette période sont 8.35; 21.63; 21.47 et 3.23, de la côte au large (Tableau 52).

Les valeurs extrêmes inférieures (et supérieures) ont été observées au cours des années : 2003, 2004, 2005, 2008, 2009, 2010, 2012, 2016, 2017, 2020 (1995, 1997, 2008, 2009, 2012, 2013, 2014, 2016, 2020, 2021, 2023) (Figures 89 à 92).

TABLEAU 52 – Paramètres de tendance centrale et de dispersion pour la turbidité (NTU) pour la radiale de la Baie de Somme sur la période 1990 à 2023.

	Min	Q1	Médiane	Moyenne	Ecart-type	Q3	Max	n
At so	0.51	3.35	5.61	8.35	7.58	10.47	55	450
Bif	0.93	8	16	21.63	19.04	28.9	139	394
Mimer	1.32	6.83	13.2	21.47	22.24	28	150	369
SRN Somme mer 2	0.23	1.42	2.2	3.23	3.37	3.6	23	360

TABLEAU 53 – Paramètres de tendance centrale et de dispersion pour la turbidité (NTU) pour la radiale de la Baie de Somme en 2024.

	Min	Q1	Médiane	Moyenne	Ecart-type	Q3	Max	n
At so	2.77	4.89	6.17	8	4.69	10.5	20.2	24
Bif	3.37	8.29	14.9	19.43	15.85	27.52	60.3	16
Mimer	2.49	12.41	22.45	26.76	20.04	42.7	60.1	16
SRN Somme mer 2	0.96	2.06	3.2	3.11	1.33	3.79	6.03	16

En 2024, les valeurs se situent entre 0.96 et 60.3 et les moyennes sont égales à 19.43, 26.76, 8 et 3.11 de la côte au large (Tableaux 52 et 53).

Le gradient côte-large traduit la différence des valeurs entre le point le plus proche de la côte et celui le plus éloigné de celle-ci. Sur la radiale de la Baie de Somme, en 2024, celui-ci est compris entre -7.66 en avril et 0.52 en juin (Annexe 1).




FIGURE 89 – Evolution temporelle de la turbidité (NTU), des anomalies (écart à la moyenne mensuel) et boîtes de dispersions pour le point 'Bif' de la radiale de la Baie de Somme et pour la période 1990-2024 (année 2024 en rouge)




FIGURE 90 – Evolution temporelle de la turbidité (NTU), des anomalies (écart à la moyenne mensuel) et boîtes de dispersions pour le point 'At so' de la radiale de Baie de Somme et pour la période 1990-2024 (année 2024 en rouge)




FIGURE 91 – Evolution temporelle de la turbidité (NTU), des anomalies (écart à la moyenne mensuel) et boîtes de dispersions pour le point 'Mimer' de la radiale de Baie de Somme et pour la période 1990-2024 (année 2024 en rouge)




FIGURE 92 – Evolution temporelle de la turbidité (NTU), des anomalies (écart à la moyenne mensuel) et boîtes de dispersions pour le point 'SRN Somme mer 2' de la radiale de Baie de Somme et pour la période 1990-2024 (année 2024 en rouge)

3.1.3.4 M.E.S.

De 1990 à 2023, la concentration en matière en suspension était comprise entre 0.4 et 239.2 mg.l⁻¹. Les concentrations en M.E.S moyennes des quatre points de la radiale sur cette période sont 18.73; 39.5; 32.52 et 12.57, de la côte au large (Tableau 54).

Les valeurs extrêmes inférieures (et supérieures) ont été observées au cours des années : 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2016, 2022 (1993, 1996, 2000, 2008, 2009, 2012, 2013, 2014, 2023) (Figures 93 à 96).

Tableau 54 – Paramètres de tendance centrale et de dispersion pour la concentration en M.E.S (mg.l-1) pour la radiale de la Baie de Somme sur la période 1990 à 2023.

	Min	Q1	Médiane	Moyenne	Ecart-type	Q3	Max	n
At so	0.9	6.8	13	18.73	17.33	25.23	167	493
Bif	3.5	17.9	29.5	39.5	31.51	53.25	239.2	438
Mimer	2.5	13.1	22.3	32.52	30.33	42.2	239.2	369
SRN Somme mer 2	0.4	3.88	6.2	12.57	15.55	13.22	101.3	420

TABLEAU 55 – Paramètres de tendance centrale et de dispersion pour la concentration en M.E.S (mg.l-1) pour la radiale de la Baie de Somme en 2024.

	Min	Q1	Médiane	Moyenne	Ecart-type	Q3	Max	n
At so	4	6.23	9.55	10.22	4.71	13.15	22.3	24
Bif	11.1	14.08	21.2	24.96	13.59	30.33	61.6	16
Mimer	10.8	21.25	33.05	34.54	18.32	45	76.6	16
SRN Somme mer 2	2.1	4.07	4.7	5.36	2.12	6.9	9.2	16

En 2024, les valeurs se situent entre 2.1 et 76.6 et les moyennes sont égales à 24.96, 34.54, 10.22 et 5.36 de la côte au large (Tableaux 54 et 55).

Le gradient côte-large traduit la différence des valeurs entre le point le plus proche de la côte et celui le plus éloigné de celle-ci. Sur la radiale de la Baie de Somme, en 2024, celui-ci est compris entre -7.8 en avril et 1.1 en juin (Annexe 1).




FIGURE 93 – Evolution temporelle de la concentration en M.E.S (mg.l $^{-1}$), des anomalies (écart à la moyenne mensuel) et boîtes de dispersions pour le point 'Bif' de la radiale de la Baie de Somme et pour la période 1990-2024 (année 2024 en rouge)




FIGURE 94 – Evolution temporelle de la concentration en M.E.S (mg.l $^{-1}$), des anomalies (écart à la moyenne mensuel) et boîtes de dispersions pour le point 'At so' de la radiale de Baie de Somme et pour la période 1990-2024 (année 2024 en rouge)




FIGURE 95 – Evolution temporelle de la concentration en M.E.S (mg.l $^{-1}$), des anomalies (écart à la moyenne mensuel) et boîtes de dispersions pour le point 'Mimer' de la radiale de Baie de Somme et pour la période 1990-2024 (année 2024 en rouge)




FIGURE 96 – Evolution temporelle de la concentration en M.E.S (mg.l $^{-1}$), des anomalies (écart à la moyenne mensuel) et boîtes de dispersions pour le point 'SRN Somme mer 2' de la radiale de Baie de Somme et pour la période 1990-2024 (année 2024 en rouge)

3.1.3.5 Matière organique .

De 1990 à 2023, la concentration en matière organique était comprise entre 0.1 et 48 mg.l⁻¹. Les concentrations en M.E.S organique moyennes des quatre points de la radiale sur cette période sont 4.04; 6.84; 5.09 et 3.29, de la côte au large (Tableau 56).

Les valeurs extrêmes inférieures (et supérieures) ont été observées au cours des années : 1992, 2003, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2019 (1992, 1994, 1996, 1999, 2000, 2001, 2012, 2014) (Figures $97 \ge 100$).

Tableau 56 – Paramètres de tendance centrale et de dispersion pour la concentration en M.E.S organique (mg.l-1) pour la radiale de la Baie de Somme sur la période 1990 à 2023.

	Min	Q1	Médiane	Moyenne	Ecart-type	Q3	Max	n
At so	0.2	1.6	2.5	4.04	3.96	5.3	39	491
Bif	0.6	2.8	4.75	6.84	6.1	8.99	45.04	422
Mimer	0.1	2.1	3.6	5.09	4.72	6.5	48	369
SRN Somme mer 2	0.2	1.2	1.9	3.29	3.43	4.07	24.7	420

Tableau 57 – Paramètres de tendance centrale et de dispersion pour la concentration en M.E.S organique (mg.l-1) pour la radiale de la Baie de Somme en 2024.

	Min	Q1	Médiane	Moyenne	Ecart-type	Q3	Max	n
At so	1	1.58	2.05	2.04	0.65	2.18	3.5	24
Bif	1.8	2.8	3.4	3.56	0.97	4.25	5.2	16
Mimer	2.1	3.68	4.7	4.58	1.25	5.25	6.6	16
SRN Somme mer 2	1.2	1.3	1.5	1.77	0.62	2.15	3	16

En 2024, les valeurs se situent entre 1 et 6.6 et les moyennes sont égales à 3.56, 4.58, 2.04 et 1.77 de la côte au large (Tableaux 56 et 57).

Le gradient côte-large traduit la différence des valeurs entre le point le plus proche de la côte et celui le plus éloigné de celle-ci. Sur la radiale de la Baie de Somme, en 2024, celui-ci est compris entre -1.4 en août et 0.3 en novembre (Annexe 1).




FIGURE 97 – Evolution temporelle de la concentration en M.E.S organique (mg.l⁻¹), des anomalies (écart à la moyenne mensuel) et boîtes de dispersions pour le point 'Bif' de la radiale de la Baie de Somme et pour la période 1990-2024 (année 2024 en rouge)




FIGURE 98 – Evolution temporelle de la concentration en M.E.S organique (mg.l⁻¹), des anomalies (écart à la moyenne mensuel) et boîtes de dispersions pour le point 'At so' de la radiale de Baie de Somme et pour la période 1990-2024 (année 2024 en rouge)




FIGURE 99 – Evolution temporelle de la concentration en M.E.S organique (mg.l $^{-1}$), des anomalies (écart à la moyenne mensuel) et boîtes de dispersions pour le point 'Mimer' de la radiale de Baie de Somme et pour la période 1990-2024 (année 2024 en rouge)




FIGURE 100 – Evolution temporelle de la concentration en M.E.S organique (mg.l⁻¹), des anomalies (écart à la moyenne mensuel) et boîtes de dispersions pour le point 'SRN Somme mer 2' de la radiale de Baie de Somme et pour la période 1990-2024 (année 2024 en rouge)

3.1.3.6 *Ammonium* .

De 1990 à 2023, la concentration en ammonium était comprise entre 0.01 et 33.06 µmol.l⁻¹. Les concentrations en ammonium moyennes des quatre points de la radiale sur cette période sont 1.9; 2.35; 2.01 et 1.1 µmol.l⁻¹, de la côte au large (Tableau 58).

Les valeurs extrêmes inférieures (et supérieures) ont été observées au cours des années : 1992, 1993, 1995, 1996, 2000, 2001 (1992, 1997, 1998) (Figures 101 à 104).

Tableau 58 – Paramètres de tendance centrale et de dispersion pour la concentration en ammonium (µmol.l-1) pour la radiale de la Baie de Somme sur la période 1990 à 2023.

	Min	Q1	Médiane	Moyenne	Ecart-type	Q3	Max	n
At so	0.02	0.35	0.9	1.9	3.26	2.43	30.7	489
Bif	0.01	0.44	1.18	2.35	3.04	3.02	24.67	443
Mimer	0.01	0.33	1.08	2.01	2.65	2.89	24.18	370
SRN Somme mer 2	0.05	0.15	0.38	1.1	2.45	1.12	33.06	419

Tableau 59 – Paramètres de tendance centrale et de dispersion pour la concentration en ammonium (µmol.l-1) pour la radiale de la Baie de Somme en 2024.

	Min	Q1	Médiane	Moyenne	Ecart-type	Q3	Max	n
At so	0.19	0.73	1.05	2.13	2.27	2.2	7.8	24
Bif	0.16	0.36	0.72	1.68	1.87	2.57	6.7	16
Mimer	0.23	0.41	1.1	1.56	1.42	2.68	5.11	16
SRN Somme mer 2	0.15	0.32	0.61	0.94	0.83	1.23	2.83	16

En 2024, les valeurs se situent entre 0.15 et $7.8 \ \mu mol.l^{-1}$ et les moyennes sont égales à 1.68, 1.56, 2.13 et $0.94 \ \mu mol.l^{-1}$ de la côte au large (Tableaux 58 et 59).

Le gradient côte-large traduit la différence des valeurs entre le point le plus proche de la côte et celui le plus éloigné de celle-ci. Sur la radiale de la Baie de Somme, en 2024, celui-ci est compris entre -4.36 µmol.l⁻¹ en novembre et 1.57 µmol.l⁻¹ en juillet (Annexe 1).




FIGURE 101 – Evolution temporelle de la concentration en ammonium (μ mol.l⁻¹), des anomalies (écart à la moyenne mensuel) et boîtes de dispersions pour le point 'Bif' de la radiale de la Baie de Somme et pour la période 1990-2024 (année 2024 en rouge)




FIGURE 102 – Evolution temporelle de la concentration en ammonium (µmol.l⁻¹), des anomalies (écart à la moyenne mensuel) et boîtes de dispersions pour le point 'At so' de la radiale de Baie de Somme et pour la période 1990-2024 (année 2024 en rouge)




FIGURE 103 – Evolution temporelle de la concentration en ammonium (μmol.l⁻¹), des anomalies (écart à la moyenne mensuel) et boîtes de dispersions pour le point 'Mimer' de la radiale de Baie de Somme et pour la période 1990-2024 (année 2024 en rouge)




FIGURE 104 – Evolution temporelle de la concentration en ammonium (μmol.l⁻¹), des anomalies (écart à la moyenne mensuel) et boîtes de dispersions pour le point 'SRN Somme mer 2' de la radiale de Baie de Somme et pour la période 1990-2024 (année 2024 en rouge)

$3.1.3.7\ Nitrite + Nitrate$

De 1990 à 2023, la concentration en nitrite + nitrate était comprise entre 0.03 et 133.9 μmol.l⁻¹. Les concentrations en nitrite + nitrate des quatre points de la radiale sur cette période sont 11.97; 18.23; 14.16 et 9.35 μmol.l⁻¹, de la côte au large (Tableau 60).

Les valeurs extrêmes inférieures (et supérieures) ont été observées au cours des années : 1992, 1997, 2017, 2019, 2021 (1992, 1994, 1995, 2000, 2002, 2008, 2012, 2014, 2016, 2024) (Figures 105 à 108).

Tableau 60 – Paramètres de tendance centrale et de dispersion pour la concentration en nitrite + nitrate (µmol.l-1) pour la radiale de la Baie de Somme sur la période 1990 à 2023.

	Min	Q1	Médiane	Moyenne	Ecart-type	Q3	Max	n
At so	0.1	1.75	6.85	11.97	12.49	19.84	56.86	488
Bif	0.15	3.51	13.1	18.23	18.29	28.24	133.9	443
Mimer	0.15	2.63	8.96	14.16	13.69	23.03	64.23	369
SRN Somme mer 2	0.03	0.71	4.05	9.35	11.06	16.51	51.48	417

Tableau 61 – Paramètres de tendance centrale et de dispersion pour la concentration en nitrite + nitrate (µmol.l-1) pour la radiale de la Baie de Somme en 2024.

	Min	Q1	Médiane	Moyenne	Ecart-type	Q3	Max	n
At so	1.1	7.73	15.3	19.73	13.32	32.75	39.6	24
Bif	3.9	12.93	23.05	27.25	18.06	39.2	74	16
Mimer	2.39	9.23	17.35	19.98	13.39	28.74	44.09	16
SRN Somme mer 2	0.32	5.79	11.5	14.96	11.92	24.71	36.5	16

En 2024, les valeurs se situent entre 0.32 et 74 µmol.l⁻¹ et les moyennes sont égales à 27.25, 19.98, 19.73 et 14.96 µmol.l⁻¹ de la côte au large (Tableaux 60 et 61).

Le gradient côte-large traduit la différence des valeurs entre le point le plus proche de la côte et celui le plus éloigné de celle-ci. Sur la radiale de la Baie de Somme, en 2024, celui-ci est compris entre -7.67 μ mol.l⁻¹ en décembre et -0.61 μ mol.l⁻¹ en juin (Annexe 1).




FIGURE 105 – Evolution temporelle de la concentration en nitrates + nitrites (µmol.l⁻¹), des anomalies (écart à la moyenne mensuel) et boîtes de dispersions pour le point 'Bif' de la radiale de la Baie de Somme et pour la période 1990-2024 (année 2024 en rouge)




FIGURE 106 – Evolution temporelle de la concentration en nitrates + nitrites (µmol.l⁻¹), des anomalies (écart à la moyenne mensuel) et boîtes de dispersions pour le point 'At so' de la radiale de Baie de Somme et pour la période 1990-2024 (année 2024 en rouge)




FIGURE 107 – Evolution temporelle de la concentration en nitrates + nitrites (µmol.l⁻¹), des anomalies (écart à la moyenne mensuel) et boîtes de dispersions pour le point 'Mimer' de la radiale de Baie de Somme et pour la période 1990-2024 (année 2024 en rouge)




FIGURE 108 – Evolution temporelle de la concentration en nitrates + nitrites (µmol.l⁻¹), des anomalies (écart à la moyenne mensuel) et boîtes de dispersions pour le point 'SRN Somme mer 2' de la radiale de Baie de Somme et pour la période 1990-2024 (année 2024 en rouge)

3.1.3.8 Phosphate .

De 1990 à 2023, la concentration en phosphate était comprise entre 0.02 et 14.81 µmol.l⁻¹. Les concentrations en phosphate moyennes des quatre points de la radiale sur cette période sont 0.41; 0.69; 0.55 et 0.41 µmol.l⁻¹, de la côte au large (Tableau 62).

Les valeurs extrêmes inférieures (et supérieures) ont été observées au cours des années : 1992, 1995, 1996, 1999, 2000 (1992, 1993, 2007, 2008) (Figures 109 à 112).

Tableau 62 – Paramètres de tendance centrale et de dispersion pour la concentration en phosphate (µmol.l-1) pour la radiale de la Baie de Somme sur la période 1990 à 2023.

	Min	Q1	Médiane	Moyenne	Ecart-type	Q3	Max	n
At so	0.03	0.14	0.27	0.41	0.38	0.59	3.03	489
Bif	0.02	0.19	0.35	0.69	1.35	0.76	14.81	437
Mimer	0.03	0.19	0.42	0.55	0.51	0.77	4.73	369
SRN Somme mer 2	0.03	0.1	0.26	0.41	0.44	0.62	3.32	420

Tableau 63 – Paramètres de tendance centrale et de dispersion pour la concentration en phosphate (µmol.l-1) pour la radiale de la Baie de Somme en 2024.

	Min	Q1	Médiane	Moyenne	Ecart-type	Q3	Max	n
At so	0.05	0.11	0.35	0.35	0.25	0.56	0.84	23
Bif	0.1	0.16	0.22	0.34	0.24	0.48	0.86	15
Mimer	0.18	0.26	0.34	0.49	0.33	0.57	1.22	16
SRN Somme mer 2	0.08	0.16	0.26	0.38	0.28	0.54	0.93	16

En 2024, les valeurs se situent entre 0.05 et $1.22 \,\mu\text{mol.l}^{-1}$ et les moyennes sont égales à 0.34, 0.49, 0.35 et $0.38 \,\mu\text{mol.l}^{-1}$ de la côte au large (Tableaux 62 et 63).

Le gradient côte-large traduit la différence des valeurs entre le point le plus proche de la côte et celui le plus éloigné de celle-ci. Sur la radiale de la Baie de Somme, en 2024, celui-ci est compris entre -0.11 µmol.l⁻¹ en octobre et 0.24 µmol.l⁻¹ en mars (Annexe 1).




FIGURE 109 – Evolution temporelle de la concentration en phosphate (μ mol.l⁻¹), des anomalies (écart à la moyenne mensuel) et boîtes de dispersions pour le point 'Bif' de la radiale de la Baie de Somme et pour la période 1990-2024 (année 2024 en rouge)




FIGURE 110 – Evolution temporelle de la concentration en phosphate (μ mol.l⁻¹), des anomalies (écart à la moyenne mensuel) et boîtes de dispersions pour le point 'At so' de la radiale de Baie de Somme et pour la période 1990-2024 (année 2024 en rouge)




Figure 111 – Evolution temporelle de la concentration en phosphate (μ mol.l⁻¹), des anomalies (écart à la moyenne mensuel) et boîtes de dispersions pour le point 'Mimer' de la radiale de Baie de Somme et pour la période 1990-2024 (année 2024 en rouge)




Figure 112 – Evolution temporelle de la concentration en phosphate (μ mol.l⁻¹), des anomalies (écart à la moyenne mensuel) et boîtes de dispersions pour le point 'SRN Somme mer 2' de la radiale de Baie de Somme et pour la période 1990-2024 (année 2024 en rouge)

3.1.3.9 Silicate

De 1990 à 2023, la concentration en silicate était comprise entre 0.06 et 108.78 μmol.l⁻¹. Les concentrations en silicate moyennes des quatre points de la radiale sur cette période sont 6.23; 8.77; 7.3 et 4.37 μmol.l⁻¹, de la côte au large (Tableau 64).

Les valeurs extrêmes inférieures (et supérieures) ont été observées au cours des années : 1992, 1993 (1994, 2001, 2002, 2005, 2007, 2012, 2013, 2014, 2016, 2019, 2023, 2024) (Figures 113 à 116).

Tableau 64 – Paramètres de tendance centrale et de dispersion pour la concentration en silicate (µmol.l-1) pour la radiale de la Baie de Somme sur la période 1990 à 2023.

	Min	Q1	Médiane	Moyenne	Ecart-type	Q3	Max	n
At so	0.06	1.15	3.6	6.23	6.58	10.22	41	486
Bif	0.09	1.86	4.78	8.77	10.23	13.37	108.78	442
Mimer	0.1	1.49	4.58	7.3	7.22	11.84	32.1	369
SRN Somme mer 2	0.06	0.6	2	4.37	5.38	6.52	45.78	420

Tableau 65 – Paramètres de tendance centrale et de dispersion pour la concentration en silicate (µmol.l-1) pour la radiale de la Baie de Somme en 2024.

	Min	Q1	Médiane	Moyenne	Ecart-type	Q3	Max	n
At so	1.3	4.52	8.95	9.36	5.89	13.43	21.1	24
Bif	1.6	4.03	9.1	12.09	10.65	18.08	40.5	16
Mimer	0.2	1.87	6.06	8.18	7.36	11.19	24.84	16
SRN Somme mer 2	0.3	1.22	5.26	6.76	6.78	9.23	26.16	16

En 2024, les valeurs se situent entre 0.2 et $40.5 \ \mu mol.l^{-1}$ et les moyennes sont égales à 12.09, 8.18, 9.36 et $6.76 \ \mu mol.l^{-1}$ de la côte au large (Tableaux 64 et 65).

Le gradient côte-large traduit la différence des valeurs entre le point le plus proche de la côte et celui le plus éloigné de celle-ci. Sur la radiale de la Baie de Somme, en 2024, celui-ci est compris entre -7.47 µmol.l⁻¹ en octobre et 5.06 µmol.l⁻¹ en janvier (Annexe 1).




FIGURE 113 – Evolution temporelle de la concentration en silicate (µmol.l⁻¹), des anomalies (écart à la moyenne mensuel) et boîtes de dispersions pour le point 'Bif' de la radiale de la Baie de Somme et pour la période 1990-2024 (année 2024 en rouge)




FIGURE 114 – Evolution temporelle de la concentration en silicate (μ mol.l⁻¹), des anomalies (écart à la moyenne mensuel) et boîtes de dispersions pour le point 'At so' de la radiale de Baie de Somme et pour la période 1990-2024 (année 2024 en rouge)




FIGURE 115 – Evolution temporelle de la concentration en silicate (μ mol.l⁻¹), des anomalies (écart à la moyenne mensuel) et boîtes de dispersions pour le point 'Mimer' de la radiale de Baie de Somme et pour la période 1990-2024 (année 2024 en rouge)




FIGURE 116 – Evolution temporelle de la concentration en silicate (µmol.l⁻¹), des anomalies (écart à la moyenne mensuel) et boîtes de dispersions pour le point 'SRN Somme mer 2' de la radiale de Baie de Somme et pour la période 1990-2024 (année 2024 en rouge)

3.1.3.10 Oxygène dissous

De 1990 à 2023, la concentration en oxygène dissous était comprise entre 4.06 et 13.98 mg.l⁻¹. Les concentrations en oxygène moyennes des quatre points de la radiale sur cette période sont 9.18; 9.46; 9.26 et 9.39 mg.l⁻¹, de la côte au large (Tableau 66).

Les valeurs extrêmes inférieures (et supérieures) ont été observées au cours des années : 2008, 2018, 2022, 2023 (2007, 2012, 2024) (Figures 117 à 120).

Tableau 66 – Paramètres de tendance centrale et de dispersion pour la concentration en oxygène dissous (mg.l-1) pour la radiale de la Baie de Somme sur la période 1990 à 2023.

	Min	Q1	Médiane	Moyenne	Ecart-type	Q3	Max	n
At so	4.06	8.14	9	9.18	1.37	9.97	13.98	276
Bif	7.04	8.49	9.48	9.46	1.23	10.23	12.67	203
Mimer	7.04	8.24	9.27	9.26	1.17	10.06	11.9	129
SRN Somme mer 2	7.14	8.51	9.34	9.39	1.22	10.19	12.28	132

Tableau 67 – Paramètres de tendance centrale et de dispersion pour la concentration en oxygène dissous (mg.l-1) pour la radiale de la Baie de Somme en 2024.

	Min	Q1	Médiane	Moyenne	Ecart-type	Q3	Max	n
At so	7.28	7.58	7.99	8.51	1.21	9.17	11.84	18
Bif	7.69	8.03	8.8	9.14	1.71	9.2	13.47	11
Mimer	7.75	7.88	8.72	9.07	1.6	9.41	12.71	11
SRN Somme mer 2	7.52	7.88	8.75	8.89	1.23	9.41	11.67	11

En 2024, les valeurs se situent entre 7.28 et 13.47 mg.l^{-1} et les moyennes sont égales à 9.14, 9.07,8.51 et 8.89 mg.l⁻¹ de la côte au large (Tableaux 66 et 67).

Le gradient côte-large traduit la différence des valeurs entre le point le plus proche de la côte et celui le plus éloigné de celle-ci. Sur la radiale de la Baie de Somme, en 2024, celui-ci est compris entre -0.21 mg.l⁻¹ en mars et 0.82 mg.l⁻¹ en juillet (Annexe 1).




FIGURE 117 – Evolution temporelle de l'oxygène dissous (mg.l $^{-1}$), des anomalies (écart à la moyenne mensuel) et boîtes de dispersions pour le point 'Bif' de la radiale de la Baie de Somme et pour la période 1990-2024 (année 2024 en rouge)




FIGURE 118 – Evolution temporelle de l'oxygène dissous (mg.l $^{-1}$), des anomalies (écart à la moyenne mensuel) et boîtes de dispersions pour le point 'At so' de la radiale de Baie de Somme et pour la période 1990-2024 (année 2024 en rouge)




FIGURE 119 – Evolution temporelle de l'oxygène dissous (mg.l $^{-1}$), des anomalies (écart à la moyenne mensuel) et boîtes de dispersions pour le point 'Mimer' de la radiale de Baie de Somme et pour la période 1990-2024 (année 2024 en rouge)





FIGURE 120 – Evolution temporelle de l'oxygène dissous (mg.l $^{-1}$), des anomalies (écart à la moyenne mensuel) et boîtes de dispersions pour le point 'SRN Somme mer 2' de la radiale de Baie de Somme et pour la période 1990-2024 (année 2024 en rouge)

3.1.3.11 Limitation par les nutriments

Les Figures 121 à 124 représentent l'évolution temporelle des éléments nutritifs potentiellement limitants le long de la radiale Baie de Somme. Les figures délimitent six zones qui définissent, par ordre de priorité, l'élément qui limite majoritairement la croissance des algues au point considéré. En effet, les changements de concentrations en nutriments induisent des changements des rapports stœchiométriques.

Ratios au point Bif pour l'année 2024



 $FIGURE\ 121-\'Evolution\ temporelle\ des\ rapports\ stœchiométriques\ définissant\ les\ éléments\ nutritifs\ potentiellement\ limitants\ au\ point\ 'Bif'\ de\ la\ radiale\ de\ la\ Baie\ de\ Somme\ en\ 2024$

Ratios au point Mimer pour l'année 2024




FIGURE 122 – Évolution temporelle des rapports stœchiométriques définissant les éléments nutritifs potentiellement limitants au point 'Mimer' de la radiale de la Baie de Somme en 2024

Ratios au point At so pour l'année 2024




FIGURE 123 – Évolution temporelle des rapports stœchiométriques définissant les éléments nutritifs potentiellement limitants au point 'At so' de la radiale de la Baie de Somme en 2024

Ratios au point SRN Somme mer 2 pour l'année 2024




FIGURE 124 – Évolution temporelle des rapports stœchiométriques définissant les éléments nutritifs potentiellement limitants au point 'Mer 2' de la radiale de la Baie de Somme en 2024

3.1.3.12 Chlorophylle-a .

De 1990 à 2023, la concentration en chlorophylle-a était comprise entre 0.05 et 128.16 µg.l⁻¹. Les concentrations en chlorophylle-a moyennes des quatre points de la radiale sur cette période sont 8.06; 16.66; 12.58 et 6.09 µg.l⁻¹, de la côte au large (Tableau 68).

Les valeurs extrêmes inférieures (et supérieures) ont été observées au cours des années : 1992, 1994, 1995, 2002 (1996, 1998, 2000, 2001, 2008, 2009, 2011, 2015, 2017, 2018) (Figures 125 à 128).

TABLEAU 68 – Paramètres de tendance centrale et de dispersion pour la concentration en chlorophylle-a (μg.l-1) pour la radiale de la Baie de Somme sur la période 1990 à 2023.

	Min	Q1	Médiane	Moyenne	Ecart-type	Q3	Max	n
At so	0.21	2.99	5.75	8.06	7.56	10.53	58.53	498
Bif	0.32	4.6	11.63	16.66	17.93	20.61	128.16	443
Mimer	0.19	3.84	8.25	12.58	13.2	16.47	88.17	368
SRN Somme mer 2	0.05	2.35	4.64	6.09	5.31	8.48	34.6	419

Tableau 69 – Paramètres de tendance centrale et de dispersion pour la concentration en chlorophylle-a (µg.l-1) pour la radiale de la Baie de Somme en 2024.

	Min	Q1	Médiane	Moyenne	Ecart-type	Q3	Max	n
At so	0.85	2	5.26	6.6	7.33	6.94	36.58	24
Bif	0.91	6.4	12.2	15.06	11.5	22.55	36.69	16
Mimer	0.8	5.72	10.25	13	11.89	14.48	46.78	16
SRN Somme mer 2	0.84	3.12	5.89	7.43	6.34	8.27	24.11	16

En 2024, les valeurs se situent entre 0.8 et 46.78 µg.l⁻¹ et les moyennes sont égales à 15.06, 13, 6.6 et 7.43 µg.l⁻¹ de la côte au large (Tableaux 68 et 69).

Le gradient côte-large traduit la différence des valeurs entre le point le plus proche de la côte et celui le plus éloigné de celle-ci. Sur la radiale de la Baie de Somme, en 2024, celui-ci est compris entre -12.47 µg.l⁻¹ en avril et 8.81 µg.l⁻¹ en juillet (Annexe 1).




FIGURE 125 – Evolution temporelle de la chlorophylle-a (µg.l⁻¹), des anomalies (écart à la moyenne mensuel) et boîtes de dispersions pour le point 'Bif' de la radiale de la Baie de Somme et pour la période 1990-2024 (année 2024 en rouge)




FIGURE 126 – Evolution temporelle de la chlorophylle-a (µg.l⁻¹), des anomalies (écart à la moyenne mensuel) et boîtes de dispersions pour le point 'At so' de la radiale de Baie de Somme et pour la période 1990-2024 (année 2024 en rouge)




FIGURE 127 – Evolution temporelle de la chlorophylle-a (µg.l⁻¹), des anomalies (écart à la moyenne mensuel) et boîtes de dispersions pour le point 'Mimer' de la radiale de Baie de Somme et pour la période 1990-2024 (année 2024 en rouge)




FIGURE 128 – Evolution temporelle de la chlorophylle-a (µg.l⁻¹), des anomalies (écart à la moyenne mensuel) et boîtes de dispersions pour le point 'SRN Somme mer 2' de la radiale de Baie de Somme et pour la période 1990-2024 (année 2024 en rouge)

3.2 Paramètres biologiques

3.2.1 Le phytoplancton

Le risque environnemental provoqué par la prolifération de certaines espèces d'algues microscopiques est à l'origine de la mise en veille de certaines masses d'eau marines côtières. On observe, au cours de l'année, des apparitions des blooms sans qu'on en soit capable d'en prédire la date ni la durée. Il existe environ 4 000 espèces phytoplanctoniques dans le monde; certaines d'entre elles (environ 250) peuvent proliférer de façon importante en formant des eaux rouges, brunes ou vertes. D'autres espèces (environ 70) sont toxiques, mais la plupart d'entre elles sont totalement inoffensives. Parmi les espèces toxiques, certaines contiennent des toxines dangereuses pour l'homme, les coquillages ou les poissons. Face à ces menaces, il est important de procéder à des observations régulières pour mieux suivre la dynamique des efflorescences phytoplanctoniques dans les eaux marines. C'est donc en raison du risque pour la santé publique qu'un réseau de surveillance du phytoplancton (REPHY) fonctionne depuis 1984 sur tout le littoral français. Le S.R.N (Suivi Régional des Nutriments) complète ce réseau vers le large.

Le phytoplancton est le premier maillon de la chaîne alimentaire puisqu'il se situe à la base d'un ensemble d'interactions qui structurent un réseau trophique. Sa présence dans un milieu est fonction de la disponibilité en nutriment et aussi la présence de facteurs physiques favorables à son développement (température, éclairement, turbulence, turbidité des masses d'eau, etc.). La production primaire est le processus par lequel les algues microplanctoniques transforment la matière minérale en matière organique nécessaire pour leur croissance. En effet, dans les conditions normales d'abondance en éléments nutritifs : allongement des jours d'éclairement et de réchauffement progressif des masses d'eau, la croissance du phytoplancton se fait de façon optimale. Au cours des périodes post-automnales, la température et surtout l'ensoleillement diminuent, limitant ainsi la croissance du phytoplancton. Ceci permet la reconstitution des stocks des éléments nutritifs par la minéralisation de la matière organique. L'apparition des blooms printaniers et estivaux entraîne généralement, dans les écosystèmes peu soumis aux apports terrigènes, une diminution progressive des concentrations en éléments nutritifs. Il arrive donc que certains éléments soient absents ou au-dessous des seuils pouvant permettre le développement des blooms. Cette limitation a pu être mise en évidence dans le chapitre précédent où de nombreux éléments ont été identifiés comme potentiellement limitants pour le phytoplancton au cours de l'année.

La Manche orientale est considérée comme ultime réceptacle de certains fleuves chargés en sels nutritifs, comme la Seine et la Somme. Elle représente donc un lieu propice au développement des blooms printaniers par exemple, susceptibles d'être envahissants, gênants ou même toxiques.

Le bassin de la Manche orientale montre une grande diversité d'espèces benthiques et pélagiques. Les communautés phytoplanctoniques présentent une forte variation et se succèdent au fur et à mesure des saisons. On observe généralement une succession printanière de Phaeocystis et de Diatomées. Pendant la période estivale, on observe les dinoflagellés dont la croissance et les besoins nutritionnels sont moindres. Une efflorescence accessoire de diatomées intervient en automne.

Ce chapitre est consacré à l'étude des variations d'abondance des espèces et de densité spécifique de la communauté phytoplanctonique, grâce notamment à l'utilisation d'un indice écologique.

3.2.2 Mesure de la diversité : Indice de Sanders

L'indice biologique d'une espèce est l'addition des rangs occupés par cette espèce pour toutes les dates (dates auxquelles l'espèce a été dénombrée). Le rang de l'espèce pour une date donnée est fonction de sa dominance par rapport à celles des autres espèces présentes. L'indice biologique est calculé selon la méthode de Sanders (1960). Pour chaque date, les espèces sont classées en fonction de leur abondance. La plus abondante, donc la plus dominante à cette date, est notée 10, la seconde 9, la troisième 8 jusqu'à la dixième 1; les suivantes étant notées 0. Ainsi pour chaque date, 10 espèces sont classées. Pour chaque espèce, les notes obtenues à toutes les dates sont additionnées et leur somme correspond à l'indice de Sanders rencontré dans les tableaux de résultats. Guille (1970) propose la classification biocénotique suivante des espèces en fonction de la valeur de l'indice de SANDERS pour un site donné :

- les espèces classées dans les dix premières sont appelées espèces préférantes du site,
- les espèces classées dans les dix suivantes sont les espèces accompagnatrices du site,
- les espèces dont l'indice de SANDERS est égal à 0 sont dites accessoires du site.

Les 10 taxons dominants, par point et par mois, pour l'année considérée, sont représentés dans un tableau qui indique une classe d'abondance. Ces taxons sont ordonnés de haut en bas en fonction de leur indice de Sanders. Le taxon en première ligne est jugé le plus caractéristique du point pour le mois considéré.

3.2.3 Genres toxiques et Toxicités

Une surveillance régulière de l'ensemble des espèces phytoplanctoniques permet la détection des espèces toxiques et nuisibles connues, mais également d'espèces potentiellement toxiques. Les résultats sont disponibles sur internet : http://envlit.ifremer.fr/infos/rephy_info_toxines

Plusieurs espèces de *Pseudo-nitzschia* produisent des toxines amnésiantes (dites toxines ASP ou Amnesic Shellfish Poison). *Dinophysis* produit des toxines diarrhéiques (dites toxines DSP ou Diarrheic Shellfish Poison). Plusieurs autres espèces d'*Alexandrium* produisent des toxines paralysantes (dites toxines PSP ou Paralytic Shellfish Poison).

C'est la présence de ces espèces toxiques dans l'eau, lorsqu'elles dépassent un seuil, qui déclenche la surveillance des toxines dans les coquillages.

Les espèces potentiellement toxiques et nuisibles avec leur seuil d'alerte faisant l'objet d'une surveillance dans les masses d'eaux côtières du littoral Nord / Pas-de-Calais / Picardie sont :

- Pseudo-nitzschia delicatissima (groupe des fines) avec un seuil d'alerte > 300 000 cell./L
- Pseudo-nitzschia seriata (groupe des larges) avec un seuil d'alerte > 100 000 cell./L
- Pseudo-nitzschia sp. (autres groupes) avec un seuil d'alerte > 100 000 cell./L
- Dinophysis alerte dès présence ou 500 cell./L si une toxicité n'a jamais été observée
- Alexandrium minutum avec un seuil d'alerte $> 10~000~{\rm cell./L}$
- Alexandrium catenella ou tamarense avec un seuil d'alerte > 5 000 cell./L

3.2.4. Dynamique phytoplanctonique

3.2.4.1 Dunkerque

La chlorophylle-a, soit le proxy de la biomasse du phytoplancton, présente la même dynamique de 2020 à 2023 sur la radiale de Dunkerque (Figures 129 à 131). Elle augmente lors de la période productive avant de revenir à des valeurs plus basses et présentant une faible étendue. En ce qui concerne l'année 2024, la biomasse suit une dynamique saisonnière semblable à celle des années 2020 à 2023.

A l'instar de la biomasse, l'abondance des cellules augmente considérablement de mars à mai. Des valeurs plus faibles se distinguent lors des périodes froides.

Les 10 taxons dominants au sens de l'indice de Sanders pour la radiale de Dunkerque sont identifiés sur les figures 129 à 131 et dans l'annexe 2.

Résultats REPHY

001-P-015 Frontière belge - Cap Gris Nez / Point 1 Dunkerque Biomasse et abondance Taxons dominants par classe (cellules/L) Années 2020-2023 Chlorophylle a 2024 < 1 000 **100 000-1 000 000** 35 1 000-10 000 >1 000 000 10 000-100 000 30 25 Bacillariophyceae Chaetoceros + 20 Jg Leptocylindrus + 15 Asterionellopsis 10 Paralia Pseudo-nitzschia + 5 Jul-Sep Oct-Dec 0 Dinophyceae Gymnodiniales Heterocapsa 10 000 Prorocentrum ė Gyrodinium 1 000 Millier de cellules/L Protoperidinium + Jul-Sep 100 Autres Cryptophyceae Phaeocystis 10 Eutreptiella Scenedesmus Dictyocha Jan-Mar Jul-Sep Oct-Dec 0 Ν D

FIGURE 129 – Évolution de l'abondance phytoplanctonique totale entre 2020 et 2024 et classement des taxons dominants au sens de l'indice de Sanders pour le point 1 de la radiale de Dunkerque.

Source Ifremer, banque Quadrige²

Résultats REPHY 001-P-016 Frontière belge - Cap Gris Nez / Point 3 SRN Dunkerque




FIGURE 130 – Évolution de l'abondance phytoplanctonique totale entre 2020 et 2024 et classement des taxons dominants au sens de l'indice de Sanders pour le point 2 de la radiale de Dunkerque.

Résultats REPHY 001-P-017 Frontière belge - Cap Gris Nez / Point 4 SRN Dunkerque




FIGURE 131 – Évolution de l'abondance phytoplanctonique totale entre 2020 et 2024 et classement des taxons dominants au sens de l'indice de Sanders pour le point 3 de la radiale de Dunkerque.

• Abondance du phytoplancton toxique

Le seuil d'alerte de la surveillance REPHY pour le phytoplancton toxique ne concerne que le point 1 de la radiale de Dunkerque.

Résultats REPHY Zone marine 001-P-015 Frontière belge - Cap Gris Nez / Point 1 Dunkerque




FIGURE 132 – Évolution de l'abondance du phytoplancton toxique sur le point côtier de la radiale de Dunkerque pour les 4 dernières années (symboles grisés) et pour l'année 2024 (symboles en couleur).

3.2.4.2 Boulogne-sur-mer

La chlorophylle-a, soit le proxy de la biomasse du phytoplancton, présente la même dynamique de 2020 à 2023 sur la radiale de Boulogne-sur-mer (Figures 133 à 135). Elle augmente lors de la période productive avant de revenir à des valeurs plus basses et présentant une faible étendue. En ce qui concerne l'année 2024, la biomasse suit une dynamique saisonnière semblable à celle des années 2020 à 2023.

A l'instar de la biomasse, l'abondance des cellules augmente considérablement de mars à mai. Des valeurs plus faibles se distinguent lors des périodes froides.

Les 10 taxons dominants au sens de l'indice de Sanders pour la radiale de Boulogne-sur-mer sont identifiés sur les figures 133 à 135 et dans l'annexe 2.

Résultats REPHY 002-P-007 Cap Gris Nez - Le Boulonnais / Point 1 Boulogne




FIGURE 133 – Évolution de l'abondance phytoplanctonique totale entre 2020 et 2024 et classement des taxons dominants au sens de l'indice de Sanders pour le point 1 de la radiale de Boulogne-sur-Mer.)

Résultats REPHY 001-P-016 Frontière belge - Cap Gris Nez / Point 3 SRN Dunkerque




FIGURE 134 – Évolution de l'abondance phytoplanctonique totale entre 2020 et 2024 et classement des taxons dominants au sens de l'indice de Sanders pour le point 2 de la radiale de Boulogne-sur-Mer.)

Résultats REPHY 002-P-030 Cap Gris Nez - Le Boulonnais / Point 3 SRN Boulogne




FIGURE 135 – Évolution de l'abondance phytoplanctonique totale entre 2020 et 2024 et classement des taxons dominants au sens de l'indice de Sanders pour le point 3 de la radiale de Boulogne-sur-Mer.)

• Abondance du phytoplancton toxique

Le seuil d'alerte de la surveillance REPHY pour le phytoplancton toxique ne concerne que le point 1 de la radiale de Boulogne.

Résultats REPHY Zone marine 002-P-007 Cap Gris Nez - Le Boulonnais / Point 1 Boulogne




FIGURE 136 – Évolution de l'abondance du phytoplancton toxique sur le point côtier de la radiale de Boulogne-sur-Mer pour les 4 dernières années (symboles grisés) et pour l'année 2024 (symboles en couleur)

3.2.4.3 Baie de Somme

La chlorophylle-a, soit le proxy de la biomasse du phytoplancton, présente la même dynamique de 2020 à 2023 sur la radiale Baie de Somme (Figures 137 à 139). Elle augmente lors de la période productive avant de revenir à des valeurs plus basses et présentant une faible étendue. En ce qui concerne l'année 2024, la biomasse suit une dynamique saisonnière semblable à celle des années 2020 à 2023.

A l'instar de la biomasse, l'abondance des cellules augmente considérablement de mars à mai. Des valeurs plus faibles se distinguent lors des périodes froides.

Les 10 taxons dominants au sens de l'indice de Sanders pour la radiale Baie de Somme sont identifiés sur les figures 137 à 139 et dans l'annexe 2.

Résultats REPHY

007-P-008 Baie de Somme / Bif Biomasse et abondance Taxons dominants par classe (cellules/L) Années 2020-2023 <1 000 Chlorophylle a 2024 100 000-1 000 000 40 1 000-10 000 >1 000 000 10 000-100 000 Bacillariophyceae Chaetoceros + hg/F 20 Lauderia + Thalassiosira + Paralia Pseudo-nitzschia + Jul-Sep Dinophyceae Abondance2024 Gymnodiniales 10 000 Heterocapsa Protoperidinium + Prorocentrum Millier de cellules/L 1 000 Gyrodinium Jul-Sep Jan-Mar Oct-Dec 100 Cryptophyceae Phaeocystis 10 Eutreptiella Choanofila Scenedesmus

FIGURE 137 – Évolution de l'abondance phytoplanctonique totale entre 2020 et 2024 et classement des taxons dominants au sens de l'indice de Sanders pour le point 'Bif' de la radiale de la Baie de Somme.)

S O N D

Jan-Mar

Jul-Sep

Oct-Dec

Résultats REPHY 006-P-008 Baie de Somme - large / Mimer




FIGURE 138 – Évolution de l'abondance phytoplanctonique totale entre 2020 et 2024 et classement des taxons dominants au sens de l'indice de Sanders pour le point 'Mimer' de la radiale de la Baie de Somme.)

Résultats REPHY 006-P-001 Baie de Somme - large / At so




FIGURE 139 – Évolution de l'abondance phytoplanctonique totale entre 2020 et 2024 et classement des taxons dominants au sens de l'indice de Sanders pour le point 'Atso' de la radiale de la Baie de Somme.)

Résultats REPHY 006-P-007 Baie de Somme - large / SRN Somme mer 2





FIGURE 140 – Évolution de l'abondance phytoplanctonique totale entre 2020 et 2024 et classement des taxons dominants au sens de l'indice de Sanders pour le point 'Somme Mer 2' de la radiale de la Baie de Somme.)

• Abondance du phytoplancton toxique

Le seuil d'alerte de la surveillance REPHY pour le phytoplancton toxique ne concerne que le point Atso de la radiale Baie de Somme.

Résultats REPHY Zone marine 007-P-008 Baie de Somme / Bif

Abondance du phytoplancton toxique



Résultats REPHY Zone marine 006-P-001 Baie de Somme - large / At so

Abondance du phytoplancton toxique




FIGURE 141 – Évolution de l'abondance du phytoplancton toxique sur les points côtier (Bif) et large (Atso) de la radiale de la Baie de Somme pour les 4 dernières années (symboles grisés) et pour l'année 2024 (symboles en couleur)

4. Discussion et conclusion

L'observation et la surveillance des écosystèmes se font généralement par la mise en place de réseaux de suivi des paramètres hydrologiques et biologiques qui constituent la base indispensable à la caractérisation globale du système aquatique. De ce fait, les descripteurs environnementaux sont très nombreux et sont reliés par des relations de cause à effet; d'autres sont directement influencés par les activités anthropiques.

Dans le cadre du SRN (Suivi Régional des Nutriments), un ensemble de paramètres physico-chimiques et biologiques est utilisé comme indicateur de la qualité du milieu marin en vue de définir l'évolution spatiale et temporelle de quelques paramètres significatifs dans la compréhension de la dynamique du phytoplancton, de la qualité de l'eau et, plus particulièrement du processus d'eutrophisation des eaux côtières de la Manche orientale et la baie sud de la mer du Nord.

Le présent rapport résume ainsi les principaux résultats obtenus pour les campagnes de l'année 2024. Il constitue un outil de synthèse permettant de caractériser les masses d'eau échantillonnées au niveau des points de surveillance de trois radiales situées à Dunkerque, à Boulogne-sur-Mer et en Baie de Somme, c'est-à-dire au niveau de trois écosystèmes contrastés, caractéristiques de notre littoral.

La dynamique temporelle de l'ensemble des paramètres physico-chimiques observés au cours de l'année 2024 suit le schéma classique d'un système tempéré côtier. Les températures sont plus chaudes en été et plus froides en hiver. De même, le gradient thermique semble bien établi sur l'ensemble de la région, même si des études ont montré que l'écart thermique entre les eaux du large et côtières dépasse rarement 1 °C (Brylinsky & Lagadeuc 1990).

Le bassin oriental de la Manche est une mer épicontinentale à régime macrotidal qui génère des courants de marée rapides sensiblement parallèles à la côte et un courant résiduel en direction du nord-est. Cette dynamique est sous le contrôle des fortes contraintes hydrodynamiques qui caractérisent l'écosystème de la Manche et qui sont à l'origine d'une homogénéisation des masses d'eau sur la verticale, empêchant ainsi l'établissement d'une thermocline estivale.

La salinité varie peu au sein de la zone étudiée, à l'exception des sites directement influencés par les apports d'eaux douces en provenance des côtes où les valeurs mesurées sont plus basses (essentiellement au point Bif). Ces valeurs de salinité sont très proches de celles définies par Connor and Committee (2006) comme étant caractéristiques des zones côtières sous l'influence des eaux douces (32-34). Ces valeurs ne sont cependant pas représentatives de l'étendue des salinités observables dans cette zone dans la mesure où les prélèvements ne se font qu'à un moment restreint de la marée : PM + / - 2h.

Les apports fluviaux le long de la côte française, de la baie de Seine au Cap Gris-Nez, génèrent une masse d'eau côtière qui dérive le long du littoral, séparée de l'océan par une zone frontale. La frange d'eau côtière est nettement influencée par les apports terrestres : la salinité y est plus faible qu'au large et les valeurs de turbidité plus élevées. En effet, la plupart des paramètres hydrologiques et biologiques montrent l'existence d'un gradient côte-large bien marqué. Les valeurs de turbidité sont en moyenne fortes en hiver, faibles en été et diminent à mesure de l'éloignement de la côte. La dynamique des M.E.S contribue à celle de la turbidité puisqu'elle résulte de la présence de particules minérales ou organiques en suspension. Néanmoins, la turbidité résulte également de la forte concentration des organismes vivants. De plus, une augmentation de la turbidité peut être la conséquence directe de mouvements sous l'action des vents et des courants corrélés au coefficient de marée. Sur l'ensemble des trois radiales, la Baie de Somme présente les valeurs de turbidité les plus fortes par comparaison aux deux autres radiales.

Le vent joue également un rôle particulièrement important dans la remise en suspension, la dispersion et la régulation de la turbidité entre les côtes et le large

La dynamique des matières en suspension et, par conséquent celle de la turbidité en zone côtière, jouent un rôle majeur dans la productivité de ces systèmes. L'évolution de la matière organique des sédiments témoigne de l'activité biologique sur les différentes stations. Elle est liée, en effet, au développement phytoplanctonique qui prédomine pendant les périodes de forte productivité biologique. Les valeurs sont plus fortes au printemps et en été, indiquant une activité de production importante.

La fluctuation de la quantité de matières organiques en Baie de Somme est liée à la dynamique sédimentaire du milieu avec, cependant, des valeurs supérieures à celles observées dans certains autres milieux estuariens. Des études dans d'autres estuaires ont montré que la matière organique contenue dans les sédiments reste en général très faible (Etcheber et al. 2007). Les fortes concentrations en matières organiques déterminent également les taux de minéralisation par les bactéries hétérotrophes.

L'apparition de certaines espèces responsables de blooms phytoplanctoniques au cours de la période productive peut expliquer les hausses de concentrations en matières organiques sur les trois radiales. C'est

le cas de l'espèce *Phaeocystis globosa*, responsable de blooms importants sur l'ensemble des points de mesure des stations. La dynamique de cette espèce et celle des autres sont sous le contrôle direct des apports en nutriments depuis les bassins versants. En période hivernale, la faiblesse de l'ensoleillement, de faibles températures et d'autres paramètres, comme la turbidité, limitent le développement du phytoplancton. Le stock de nutriment n'étant pas consommé lors de cette période, il atteint une valeur maximale. Au printemps, le phytoplancton bénéficie de l'ensoleillement nécessaire à sa croissance et de ce stock conséquent de nutriments.

La dynamique des sels nutritifs au cours de l'année 2024 est classique et confirme la présence de cycles de nutriments caractéristiques des milieux tempérés. Sur l'ensemble des sites, on observe une utilisation notable des éléments nutritifs en période productive contrairement aux périodes non productives. Pendant la période non productive, en automne notamment, la reconstitution du stock a lieu en absence de consommateurs et lors de l'augmentation des débits des rivières, ce qui contribue à maintenir les stocks élevés observés au niveau des différentes stations.

Pendant la période productive, l'apparition des blooms coïncide avec une utilisation des nutriments. En effet, la quantité de cellules par litre augmente considérablement entre mars et avril, période à laquelle la concentration en nitrate diminue fortement.

Les concentrations en silicates diminuent au printemps et sont faibles en été du fait de l'apparition en mars et en juin des communautés de Bacillariophycées (diatomées) utilisant la silice pour fabriquer leur structure. L'ammonium chute lors des périodes productives en lien avec les fortes abondances de P. globosa. Cette chute prématurée de l'ammonium est caractéristique de l'évolution des formes azotées dans le milieu naturel. En effet, sur un cycle, l'azote ammoniacal apparaît le premier, suivent ensuite les nitrites et enfin les nitrates. Les propriétés chimiques de l'ammonium font que le phytoplancton utilise préférentiellement cet élément.

Il en est de même pour les phosphates qui sont faiblement présents en début d'année; cependant leurs concentrations diminuent jusqu'à être proches de la limite de détection en été. Les concentrations augmentent dès l'automne, dues aux apports accrus des rivières. De plus, des phénomènes d'adsorption/désorption du phosphore dans les sédiments ont été identifiés dans les écosystèmes côtiers, ce qui contribue à sa remise à disposition.

Du fait de leur importance, certains de ces éléments ont été identifiés comme potentiellement limitants pour la croissance du phytoplancton. Sur les différents points de mesures en 2024, des épisodes de limitation de la croissance principalement par la silice et, dans une moindre mesure, par l'azote et les phosphates, ont été mis en évidence. Ces résultats ont été obtenus grâce à l'étude des rapports stœchiométriques de Redfield et al. (1963) et Brzezinski (1985). A l'échelle annuelle, est observée une variabilité de la limitation potentielle. La période automnale et hivernale est de type P:Si:N,Si:P:N ou Si:N:P limitant; l'été est de type N:Si:P ou N:P:Si. La période productive présente, quant à elle, l'ensemble des limitations possibles. Cette distinction de limitation montre l'importance de la prise en compte de chaque élément et de leurs rapports afin de mieux comprendre le lien entre ces nutriments et la dynamique du phytoplancton et, par conséquent, permet d'identifier les priorités en termes de réduction des apports de nutriments.

La dynamique saisonnière des différents éléments joue un rôle important dans l'apparition des efflorescences phytoplanctoniques dans le milieu. L'absence ou la présence de l'un ou l'autre des éléments majeurs se répercute sur l'apparition et l'amplitude des blooms. Même si la limitation par le phosphore a été identifiée, cela n'empêche pas une apparition de bloom de certaines espèces aux périodes où la limitation est constatée. Dans le cas de l'azote, au contraire, des travaux en modélisation de la variation saisonnière des sels nutritifs réalisés sur la côte belge, ont montré que seule la réduction des apports d'azote pouvait induire une diminution significative des blooms de Phaeocystis globosa (Lancelot et al., 2009).

Lorsqu'on se réfère à la succession des espèces phytoplanctoniques au cours de l'année et qu'on l'associe à celle des sels nutritifs, on peut résumer la distribution saisonnière du phytoplancton en trois étapes. D'abord, une apparition de diatomées en février-mars avec par exemple Asterionellopsis glacialis et Chaetoceros, puis ces Bacillariophycées disparaissent pour laisser apparaître le bloom phytoplanctonique du groupe des Prymnésiophycées représenté par l'espèce Phaeocystis globosa entre mars et mai. Pour finir, on a encore une fois une dominance de certaines Bacillariophycées (Asterionellopsis glacialis, Chaetoceros, Leptocylindrus) en été. Les résultats de l'année 2024 acquis dans le cadre du suivi REPHY/SRN permettent de compléter les études réalisées sur le même site d'étude (Lefebvre et al., 2004; Brunet, 1996) et complètent les observations et conclusions proposées par Lefebvre et al. (2011) élaborées à partir de cette série de données à long terme.

Les observations des années antérieures ont permis de dresser un schéma type de la succession phytoplanctonique (Figure 142),




FIGURE 142 – Schéma type de la succession phytoplanctonique avant, pendant et après le bloom printanier de *Phaeocystis globosa*.

En 2024, la dynamique phytoplanctonique est semblable à celle des années précédentes si l'on considère la succession *Bacillariophycées/P.globosa/Bacillariophycées*. Les espèces observées ne sont cependant pas tout à fait les mêmes avant et après le bloom.

Bibliographie

Aminot, A. and M. Chaussepied. 1983. Manuel des analyses chimiques en milieu marin. Centre National pour l'Exploitation des Océans : 395.

Aminot, A. and R. Kérouel. 2004. Hydrologie des écosystèmes marins. Paramètres et analyses. Page 336. Ifremer.

Bendschneider, K. and R. J. Robinson. 1952. A new spectrophotometric method for the determination of nitrite in sea water. Journal of Marine Research. 11:86-96.

Brunet, C., J. M. Brylinski, L. Bodineau, G. Thoumelin, D. Bentley, and D. Hilde. 1996. Phytoplankton Dynamics During the Spring Bloom in the South-eastern English Channel. Estuarine, Coastal and Shelf Science 43:469-483.

Brylinsky, J. M. and Y. Lagadeuc. 1990. L'interface eaux côtières / eaux du large dans le Pas-de-Calais (côtes françaises) : une zone frontale. Compte rendu de l'académie des sciences de Paris 311 :535-540.

Brzezinski, M. A. 1985. THE Si :C :N Ratio of Marine Diatoms : Interspecific variability and the effect of some environmental variables. Journal of Phycology 21 :347-357.

Connor, D. W. and J. N. C. Committee. 2006. UKSeaMap: the mapping of seabed and water column features of UK seas. Joint Nature Conservation Committee.

Etcheber, H., Taillez, A., Abril, G. et al. 2007. Particulate organic carbon in the estuarine turbidity maxima of the Gironde, Loire and Seine estuaries: origin and lability. Hydrobiologia 588: 245–259.

Guille, A. 1970. Benthic bionomy of continental shelf of the french catalane coast. II. Benthic communities of the macrofauna. Vie Milieu 21(8): 239-250.

Koroleff, F. 1969. Direct determination of ammonia in natural waters as indophenol blue. International Conference on Evolvable Systems.C.M.C: 9.19.1969.

Lancelot, C., V. Rousseau, and N. Gypens. 2009. Ecologically based indicators for Phaeocystis disturbance in eutrophied Belgian coastal waters (Southern North Sea) based on field observations and ecological modelling. Journal of Sea Research 61:44-49.

Lefebvre, A., N. Guiselin, F. Barbet, and F. L. Artigas. 2011. Long-term hydrological and phytoplankton monitoring (1992–2007) of three potentially eutrophic systems in the eastern English Channel and the Southern Bight of the North Sea. ICES Journal of Marine Science: Journal du Conseil 68:2029-2043.

Mullin, J. B. and J. P. Riley. 1955. The spectrophotometric determination of silicates-silicon in natural waters with special references to sea water. Analytica Chimica Acta 12:162-170.

Murphy, J. and J. P. Riley. 1962. A modified single solution method for the determination of phosphate in natural waters. Analytica Chimica Acta 27:31-36.

Redfield, A. C., B. H. Ketchum, and F. A. Richards. 1963. The influence of organisms on the composition of seawater. Pages 27-77 in M. N. Hill, editor. The Sea, New-York.

Sanders, H. L. 1960. Benthic studies in Buzzards Bay. III. The structure of the soft- bottom community. Limnol. Oceanogr. 5:138-153.

Strickland, J. D. H. and T. R. Parsons. 1972. A practical handbook of seawater analysis. Bull.Fish.Res.Bd.Can. 167:311.

Annexes

- \bullet Annexe 1 : Bilan du nombre d'analyse (et donc de données bancarisées) par paramètre et par point et gradient large-côte pour l'ensemble des radiales en 2024
- Annexe 2 Correspondance entre les intitulés de la base de données Quadrige 2 et la classe taxonomique pour toutes les radiales
- \bullet Annexe 3 Tableau de synthèse des limitations potentielles en nutriments pour l'ensemble des radiales en 2024

- \bullet $\bf Annexe~1$: Données brutes des analyses physico-chimiques et gradient large-côte pour l'ensemble des radiales en 2024
- Bilan REPHY Observation-DCE/SRN : nombre de données bancarisées par paramètre et par point en 2024

Tableau 70 – Données CHLOROA

	janv	févr	mars	avr	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc	Sum
DK1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24 sur 24
BL1	1	3	2	1	2	2	2	1	2	2	2	2	22 sur 24
Atso	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24 sur 24
DK3	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	16 sur 16
DK4	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	16 sur 16
BL2	0	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	13 sur 16
BL3	0	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	13 sur 16
MER2	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	16 sur 16
Mimer	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	16 sur 16
Bif	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	$16~{\rm sur}~16$

Tableau 71 – Données MES

	janv	févr	mars	avr	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc	Sum
DK1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24 sur 24
BL1	1	3	2	1	2	2	2	1	2	2	2	2	22 sur 24
Atso	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24 sur 24
DK3	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	16 sur 16
DK4	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	16 sur 16
BL2	0	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	13 sur 16
BL3	0	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	13 sur 16
MER2	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	16 sur 16
Mimer	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	16 sur 16
Bif	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	16 sur 16

Tableau 72 – Données MESORG

	janv	févr	mars	avr	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	$d\acute{e}c$	Sum
DK1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24 sur 24
BL1	1	3	2	1	2	2	2	1	2	2	2	2	22 sur 24
Atso	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24 sur 24
DK3	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	16 sur 16
DK4	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	16 sur 16
BL2	0	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	13 sur 16
BL3	0	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	13 sur 16
MER2	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	$16 \mathrm{~sur~} 16$
Mimer	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	$16 \mathrm{~sur~} 16$
Bif	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	$16~{\rm sur}~16$

Tableau 73 – Données NH4

	janv	févr	mars	avr	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc	Sum
DK1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24 sur 24
BL1	1	3	2	1	2	2	2	1	2	2	2	2	$22~{\rm sur}~24$
Atso	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24 sur 24
DK3	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	16 sur 16

	janv	févr	mars	avr	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc	Sum
DK4	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	16 sur 16
BL2	0	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	13 sur 16
BL3	0	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	13 sur 16
MER2	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	16 sur 16
Mimer	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	16 sur 16
Bif	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	16 sur 16

Tableau 74 – Données NO2

	janv	févr	mars	avr	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc	Sum
DK1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24 sur 24
BL1	1	3	2	1	2	2	2	1	2	2	2	2	$22~{\rm sur}~24$
Atso	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24 sur 24
DK3	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	16 sur 16
DK4	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	16 sur 16
BL2	0	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	13 sur 16
BL3	0	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	13 sur 16
MER2	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	$16~{\rm sur}~16$
Mimer	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	$16 \mathrm{~sur~} 16$
Bif	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	$16~{\rm sur}~16$

Tableau 75 – Données NO3

	janv	févr	mars	avr	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc	Sum
DK1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24 sur 24
BL1	1	3	2	1	2	2	2	1	2	2	2	2	22 sur 24
Atso	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24 sur 24
DK3	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	16 sur 16
DK4	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	16 sur 16
BL2	0	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	13 sur 16
BL3	0	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	13 sur 16
MER2	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	16 sur 16
Mimer	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	16 sur 16
Bif	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	16 sur 16

Tableau 76 – Données NO3+NO2

	janv	févr	mars	avr	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc	Sum
DK1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24 sur 24
BL1	1	3	2	1	2	2	2	1	2	2	2	2	22 sur 24
Atso	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24 sur 24
DK3	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	16 sur 16
DK4	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	16 sur 16
BL2	0	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	13 sur 16
BL3	0	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	13 sur 16
MER2	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	16 sur 16
Mimer	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	16 sur 16
Bif	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	16 sur 16

Tableau 77 – Données OXYGENE

	janv	févr	mars	avr	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc	Sum
DK1	2	2	2	0	0	0	2	2	1	2	2	2	17 sur 24
BL1	1	3	2	0	2	2	2	1	2	1	2	2	20 sur 24
Atso	1	2	2	1	0	0	2	2	2	2	2	2	$18 \mathrm{sur} 24$
DK3	1	1	2	0	0	0	1	1	0	1	1	1	9 sur 16
DK4	1	1	2	0	0	0	1	1	0	1	1	1	9 sur 16
BL2	0	1	1	0	2	2	1	1	1	0	1	1	$11 \mathrm{~sur~} 16$
BL3	0	0	1	0	2	2	1	1	1	0	1	1	10 sur 16
MER2	1	1	2	1	0	0	1	1	1	1	1	1	$11 \mathrm{~sur~} 16$
Mimer	1	1	2	1	0	0	1	1	1	1	1	1	$11 \mathrm{~sur~} 16$
Bif	1	1	2	1	0	0	1	1	1	1	1	1	11 sur 16

Tableau 78 – Données PHEO

	janv	févr	mars	avr	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc	Sum
DK1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24 sur 24
BL1	1	3	2	1	2	2	2	1	2	2	2	2	22 sur 24
Atso	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24 sur 24
DK3	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	16 sur 16
DK4	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	16 sur 16
BL2	0	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	13 sur 16
BL3	0	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	13 sur 16
MER2	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	16 sur 16
Mimer	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	16 sur 16
Bif	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	16 sur 16

Tableau 79 – Données PO4

	janv	févr	mars	avr	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc	Sum
DK1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24 sur 24
BL1	1	3	2	1	2	2	2	1	2	2	2	2	22 sur 24
Atso	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	23 sur 24
DK3	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	16 sur 16
DK4	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	16 sur 16
BL2	0	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	13 sur 16
BL3	0	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	13 sur 16
MER2	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	16 sur 16
Mimer	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	16 sur 16
Bif	1	1	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	15 sur 16

Tableau 80 – Données SALI

	janv	févr	mars	avr	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	$\operatorname{d\acute{e}c}$	Sum
DK1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24 sur 24
BL1	1	3	2	1	2	2	2	1	2	2	2	2	22 sur 24
Atso	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24 sur 24
DK3	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	16 sur 16
DK4	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	16 sur 16
BL2	0	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	13 sur 16
BL3	0	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	13 sur 16
MER2	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	16 sur 16
Mimer	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	16 sur 16
Bif	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	16 sur 16

Tableau 81 – Données SIOH

	janv	févr	mars	avr	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc	Sum
DK1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24 sur 24
BL1	1	3	2	1	2	2	2	1	2	2	2	2	22 sur 24
Atso	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24 sur 24
DK3	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	16 sur 16
DK4	1	1	2	2	2	2	1	1	0	1	1	1	15 sur 16
BL2	0	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	13 sur 16
BL3	0	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	$13 \mathrm{~sur~} 16$
MER2	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	16 sur 16
Mimer	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	16 sur 16
Bif	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	$16~{\rm sur}~16$

Tableau 82 – Données TEMP

	janv	févr	mars	avr	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc	Sum
DK1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	23 sur 24
BL1	1	3	2	1	2	2	2	1	2	2	2	2	22 sur 24
Atso	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24 sur 24
DK3	1	1	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	15 sur 16
DK4	1	1	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	15 sur 16
BL2	0	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	13 sur 16
BL3	0	0	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	$12 \mathrm{sur} 16$
MER2	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	16 sur 16
Mimer	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	16 sur 16
Bif	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	16 sur 16

Tableau 83 – Données TURB

	janv	févr	mars	avr	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc	Sum
DK1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24 sur 24
BL1	1	3	2	1	2	2	2	1	2	2	2	2	22 sur 24
Atso	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24 sur 24
DK3	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	16 sur 16
DK4	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	16 sur 16
BL2	0	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	13 sur 16
BL3	0	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	13 sur 16
MER2	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	16 sur 16
Mimer	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	16 sur 16
Bif	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	16 sur 16

TABLEAU 84 – Données FLORTOT

	janv	févr	mars	avr	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	$\operatorname{d\acute{e}c}$	Sum
DK1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24 sur 24
BL1	1	3	2	1	2	2	2	1	2	2	2	2	22 sur 24
Atso	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24 sur 24
DK3	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	16 sur 16
DK4	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	16 sur 16
BL2	0	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	13 sur 16
BL3	0	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	13 sur 16
MER2	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	16 sur 16
Mimer	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	16 sur 16
Bif	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	16 sur 16

• GRADIENT CÔTE-LARGE

Radiale de Dunkerque

	Date	CHLOROA	MES	MESORG	NH4	NO3+NO2	OXYGENE	PO4	SALI	SIOH	TEMP	TURB
110	11/01/2024	-0.19	-10.7	-1.2	-2.54	-12.04	-0.82	-0.29	1.5	-10.15	1.8	-11.430
161	15/02/2024	-1.04	-15.0	-1.3	-1.51	-8.04	0.17	0.06	0.7	-4.90	-0.2	-12.050
147	14/03/2024	-2.76	-12.8	-1.2	-1.08	-7.75	0.30	-0.09	0.6	-5.15	-0.3	-5.620
284	25/03/2024	-6.78	-5.2	-1.0	0.31	0.21	-0.14	-0.02	0.6	-0.42	-0.2	-3.690
65	08/04/2024	-18.60	-5.5	-1.8	0.42	-0.54	NaN	0.01	0.5	-0.93	NaN	-4.040
264	23/04/2024	-2.45	-3.9	-1.2	-0.22	-1.15	NaN	0.02	0.3	-2.09	0.2	-3.392
52	07/05/2024	-5.57	-18.4	-2.2	-0.99	-4.60	NaN	0.15	0.3	-2.91	-0.6	-10.590
242	21/05/2024	-4.01	-15.8	-2.4	-0.76	0.51	NaN	0.10	0.3	-2.09	-1.0	-11.420
19	04/06/2024	-7.52	-12.3	-1.8	-0.05	-0.04	NaN	0.00	0.3	-3.09	-0.7	-7.290
288	25/06/2024	-1.18	-3.6	-0.5	0.31	-0.12	NaN	0.00	0.1	-1.80	-0.8	-3.140
70	08/07/2024	-6.15	-7.0	-0.3	-0.95	-0.02	-0.09	-0.06	0.2	-0.58	-0.7	-5.540
45	06/08/2024	0.06	-4.8	-1.0	0.37	0.04	-0.13	-0.08	0.1	0.74	-1.1	-2.250
12	03/09/2024	-2.46	-5.9	-0.7	0.11	0.60	NaN	0.10	0.2	NaN	-0.5	-4.470
20	04/10/2024	-2.04	-7.6	-5.8	-2.63	-2.31	-0.34	0.01	0.5	-3.16	0.7	-3.980
33	05/11/2024	-1.26	-2.0	0.1	-4.00	-17.53	-0.22	-0.35	0.4	-2.16	0.7	-2.470
8	02/12/2024	-0.53	-14.6	-1.2	-4.25	-5.70	-0.08	-0.05	0.6	-3.41	0.5	-11.420

Radiale de Boulogne-sur-mer

	Date	CHLOROA	MES	MESORG	NH4	NO3+NO2	OXYGENE	PO4	SALI	SIOH	TEMP	TURB
1	01/02/2024	-0.32	0.0	0.8	-0.62	-9.53	NaN	0.18	0.6	-4.74	NaN	-0.530
376	26/03/2024	-15.21	-3.5	-0.9	-0.23	-5.47	-0.02	0.03	0.7	0.08	0.0	-2.100
319	23/04/2024	-0.41	-7.5	-0.5	-6.27	-9.72	NaN	-0.22	0.5	-2.94	0.1	-5.730
57	06/05/2024	-4.09	-1.4	-0.6	0.35	-0.07	-0.18	0.30	0.0	-0.65	-0.1	-0.400
341	24/05/2024	-3.52	-1.6	-0.8	-0.15	-2.49	0.16	0.03	0.6	-0.15	-0.3	-1.015
29	04/06/2024	-0.20	-0.7	-0.4	-4.89	-1.45	0.78	-0.47	0.4	1.34	-0.3	-1.503
384	26/06/2024	-0.11	-0.4	-0.1	-1.65	-0.15	0.69	-0.09	0.8	-3.27	-1.4	-0.830
145	11/07/2024	-0.01	-2.4	-0.7	-2.35	-0.94	0.88	-0.15	0.8	-5.58	-0.8	-1.070
90	08/08/2024	-0.43	-2.5	-0.5	-0.20	-1.97	0.31	-0.28	0.7	-5.85	-0.9	-0.690
62	06/09/2024	-2.87	-0.7	-0.2	1.29	0.57	-0.26	0.17	0.5	0.17	-0.7	-1.690
211	15/10/2024	0.06	0.4	0.1	-1.59	-3.31	NaN	-0.04	0.7	-1.91	0.8	-0.690
196	14/11/2024	-0.12	-5.4	-0.3	-4.07	-4.55	-0.02	0.18	0.4	-2.18	0.6	-1.950
22	03/12/2024	-0.44	-3.5	-0.3	-1.43	-10.21	-0.17	-0.08	1.0	-2.28	1.4	-3.940

Radiale de la Baie de Somme

	Date	CHLOROA	MES	MESORG	NH4	NO3+NO2	OXYGENE	PO4	SALI	SIOH	TEMP	TURB
120	10/01/2024	-0.01	-7.5	-0.6	-0.56	-3.10	-0.17	0.09	0.2	5.06	0.3	-7.470
170	13/02/2024	-0.64	-2.9	0.0	-0.59	-5.59	0.12	0.15	0.4	-4.06	-0.1	-5.073
140	11/03/2024	-3.17	-1.7	0.0	-0.24	-3.34	-0.21	0.05	0.2	-0.66	0.0	-0.180
374	26/03/2024	-2.88	-3.5	-0.5	-0.24	-5.92	0.02	0.24	0.3	-0.14	0.0	-3.520
94	08/04/2024	-1.09	-7.8	-0.8	-0.54	-7.54	0.23	-0.01	0.2	-1.04	-0.2	-7.660
364	25/04/2024	-12.47	-0.3	-0.2	0.00	-3.25	NaN	NaN	0.4	-1.39	-0.1	-2.600
55	06/05/2024	-2.89	0.4	-0.2	-0.19	-1.44	NaN	0.24	0.3	-0.81	-0.2	-1.380
355	24/05/2024	-1.08	-1.9	-0.3	0.73	-1.78	NaN	-0.01	0.4	-0.67	-0.4	-1.820
24	03/06/2024	-0.37	1.1	0.3	0.14	-1.15	NaN	0.03	0.1	-0.17	0.0	0.520
359	24/06/2024	0.77	-2.3	-0.1	-0.45	-0.61	NaN	0.00	0.5	-1.60	-0.4	-3.000
111	09/07/2024	8.81	-6.1	-0.4	1.57	-3.38	0.82	0.14	0.3	-5.58	0.0	-5.630
48	05/08/2024	1.63	-5.2	-1.4	-0.83	-2.86	0.58	-0.02	0.3	0.11	-0.2	-2.970
36	04/09/2024	-0.42	-3.3	-0.4	0.86	-2.70	0.06	0.06	0.4	-1.09	0.0	-3.450
16	02/10/2024	2.48	-5.4	0.2	-1.24	-6.88	0.25	-0.11	0.3	-7.47	0.3	-5.880
38	04/11/2024	0.19	-2.3	0.3	-4.36	-4.06	-0.11	0.13	0.1	-1.92	0.5	-3.050
39	04/12/2024	0.32	-5.9	0.0	-1.33	-7.67	-0.08	0.04	0.5	-4.06	0.6	-6.560

• Annexe 2 Correspondance entre les intitulés de la base de données Quadrige 2 et la classe taxonomique pour toutes les radiales

Intitulé.Graphe	Libellé.taxon	Classe
Acanthoica	Acanthoica	Prymnesiophyceae
Achnanthaceae	Achnanthaceae	Bacillariophyceae
Achnanthes	Achnanthes	Bacillariophyceae
Achnanthes	Achnanthes brevipes	Bacillariophyceae
Actinocyclus	Actinocyclus	Bacillariophyceae
Actinoptychus	Actinoptychus	Bacillariophyceae
Actinoptychus	Actinoptychus senarius	Bacillariophyceae
Actinoptychus +	Actinoptychus senarius + campanulifer	Bacillariophyceae
Oxytoxaceae	Adenoides	Dinophyceae
Akashiwo	Akashiwo	Dinophyceae
Akashiwo	Akashiwo sanguinea	Dinophyceae
Alexandrium	Alexandrium	Dinophyceae
Alexandrium	Alexandrium affine	Dinophyceae
Alexandrium	Alexandrium andersonii	Dinophyceae
Alexandrium	Alexandrium catenella	Dinophyceae
Alexandrium	Alexandrium insuetum	Dinophyceae
Alexandrium	Alexandrium leei	Dinophyceae
Alexandrium	Alexandrium margalefii	Dinophyceae
Alexandrium	Alexandrium minutum	Dinophyceae
Alexandrium	Alexandrium ostenfeldii	Dinophyceae
Alexandrium	Alexandrium pseudogonyaulax	Dinophyceae
Alexandrium	Alexandrium tamarense	Dinophyceae
Alexandrium +	Alexandrium tamarense + catenella + tamutum	Dinophyceae
Alexandrium	Alexandrium tamutum	Dinophyceae
Oxytoxaceae	Amphidiniopsis	Dinophyceae
Amphidinium	Amphidinium	Dinophyceae
Amphidinium +	${\bf Amphidinium} + {\bf Katodinium}$	Dinophyceae
Amphidinium	Amphidinium carterae	Dinophyceae
Amphidinium	$\begin{array}{c} {\rm Amphidinium~carterae} \ + \\ {\rm operculatum} \end{array}$	Dinophyceae
Amphidinium	Amphidinium crassum	Dinophyceae
Amphidinium	Amphidinium sphenoides	Dinophyceae
Amphidoma	Amphidoma	Dinophyceae
Amphidoma	Amphidoma caudata	Dinophyceae
Amphidomataceae	Amphidomataceae	Dinophyceae
Amphiprora	Amphiprora	Bacillariophyceae

Intitulé.Graphe	Libellé.taxon	Classe
Amphora	Amphora	Bacillariophyceae
Amylax	Amylax	Dinophyceae
Amylax	Amylax triacantha	Dinophyceae
Amylax +	Amylax triacantha + buxus	Dinophyceae
Anabaena	Anabaena	Cyanophyceae
Chlorophyceae	Ankistrodesmus	Chlorophyceae
Apedinella	Apedinella radians	Dictyochophyceae
Peridiniales	Archaeperidinium minutum	Dinophyceae
Asterionella	Asterionella	Bacillariophyceae
Asterionella +	Asterionella + Asterionellops + Asteroplanus	is Bacillariophyceae
Asterionella	Asterionella formosa	Bacillariophyceae
Asterionellopsis	Asterionellopsis	Bacillariophyceae
Asterionellopsis glacialis	Asterionellopsis glacialis	Bacillariophyceae
Asterolampra	Asterolampra	Bacillariophyceae
Asterolampraceae	Asterolampraceae	Bacillariophyceae
Asteromphalus	Asteromphalus	Bacillariophyceae
Asteroplanus	Asteroplanus	Bacillariophyceae
Asteroplanus	Asteroplanus karianus	Bacillariophyceae
Attheya	Attheya	Bacillariophyceae
Attheya	Attheya armata	Bacillariophyceae
Coscinodiscales	Aulacodiscus	Bacillariophyceae
Aulacoseira	Aulacoseira	Bacillariophyceae
Auricula	Auricula	Bacillariophyceae
Azadinium	Azadinium	Dinophyceae
Azadinium	Azadinium caudatum	Dinophyceae
Bacillaria	Bacillaria	Bacillariophyceae
Bacillaria	Bacillaria paxillifera	Bacillariophyceae
Bacillariaceae	Bacillariaceae	Bacillariophyceae
Bacillariophyceae	Bacillariophyceae	Bacillariophyceae
Bacteriastrum	Bacteriastrum	Bacillariophyceae
Bacteriastrum	Bacteriastrum hyalinum	Bacillariophyceae
Bellerochea	Bellerochea	Bacillariophyceae
Biddulphia	Biddulphia	Bacillariophyceae
Biddulphia	Biddulphia membranacea	Bacillariophyceae
Biddulphia	Biddulphia rhombus	Bacillariophyceae
Biddulphiaceae	Biddulphiaceae	Bacillariophyceae
Bleakeleya	Bleakeleya	Bacillariophyceae
Blepharocysta	Blepharocysta	Dinophyceae
		Bacillariophyceae

Intitulé.Graphe	Libellé.taxon	Classe
Cymatosiraceae	Brockmanniella brockmannii	Bacillariophyceae
Caloneis	Caloneis	Bacillariophyceae
Campyloneis	Campyloneis	Bacillariophyceae
Cymatosiraceae	Campylosira	Bacillariophyceae
Cymatosiraceae	Campylosira cymbelliformis	Bacillariophyceae
Centriques	Centriques	Bacillariophyceae
Centrodinium	Centrodinium	Dinophyceae
Cerataulina	Cerataulina	Bacillariophyceae
Cerataulina	Cerataulina pelagica	Bacillariophyceae
Ceratiaceae	Ceratiaceae	Dinophyceae
Ceratiaceae	Ceratium	Dinophyceae
Ceratiaceae	Ceratium + Neoceratium	Dinophyceae
Ceratium	Ceratium fusus var. fusus	Dinophyceae
Ceratiaceae	Ceratium tripos + Ceratium à cornes recourbées	^à Dinophyceae
Ceratocorys	Ceratocorys	Dinophyceae
Cylindrotheca	Ceratoneis closterium	Bacillariophyceae
Ceratoperidinium	Ceratoperidinium	Dinophyceae
Ceratoperidinium	Ceratoperidinium falcatum	Dinophyceae
Chaetoceros	Chaetoceros	Bacillariophyceae
Chaetoceros	Chaetoceros affinis	Bacillariophyceae
Chaetoceros	Chaetoceros anastomosans	Bacillariophyceae
Chaetoceros	Chaetoceros armatus	Bacillariophyceae
Chaetoceros	Chaetoceros compressus	Bacillariophyceae
Chaetoceros	Chaetoceros curvisetus	Bacillariophyceae
Chaetoceros +	Chaetoceros curvisetus + debilis + pseudocurvisetus	Bacillariophyceae
Chaetoceros	Chaetoceros danicus	Bacillariophyceae
Chaetoceros	Chaetoceros debilis	Bacillariophyceae
Chaetoceros	Chaetoceros decipiens	Bacillariophyceae
Chaetoceros +	Chaetoceros decipiens + lorenzianus	Bacillariophyceae
Chaetoceros	Chaetoceros densus	Bacillariophyceae
Chaetoceros +	Chaetoceros densus + eibenii + borealis + castracanei	Bacillariophyceae
Chaetoceros	Chaetoceros diadema	Bacillariophyceae
Chaetoceros	Chaetoceros didymus	Bacillariophyceae
Chaetoceros +	Chaetoceros didymus + protuberans	Bacillariophyceae
Chaetoceros	Chaetoceros diversus	Bacillariophyceae
Chaetoceros	Chaetoceros eibenii	Bacillariophyceae

Intitulé.Graphe	Libellé.taxon	Classe
Chaetoceros	Chaetoceros fragilis	Bacillariophyceae
Chaetoceros +	Chaetoceros fragilis + wighamii + diversus	Bacillariophyceae
Chaetoceros	Chaetoceros lauderi	Bacillariophyceae
Chaetoceros	Chaetoceros lorenzianus	Bacillariophyceae
Chaetoceros	Chaetoceros peruvianus	Bacillariophyceae
Chaetoceros	Chaetoceros protuberans	Bacillariophyceae
Chaetoceros	Chaetoceros pseudocurvisetus	Bacillariophyceae
Chaetoceros	Chaetoceros rostratus	Bacillariophyceae
Chaetoceros	Chaetoceros similis	Bacillariophyceae
Chaetoceros	Chaetoceros simplex	Bacillariophyceae
Chaetoceros	Chaetoceros socialis	Bacillariophyceae
Chaetoceros +	Chaetoceros socialis + socialis f. radians	Bacillariophyceae
Chaetoceros	Chaetoceros socialis f. radians	Bacillariophyceae
Chaetoceros	Chaetoceros subtilis	Bacillariophyceae
Chaetoceros	Chaetoceros subtilis var. abnormis	Bacillariophyceae
Chaetoceros	Chaetoceros tenuissimus	Bacillariophyceae
Chaetoceros	Chaetoceros teres	Bacillariophyceae
Chaetoceros	Chaetoceros tortissimus	Bacillariophyceae
Chaetoceros	Chaetoceros wighamii	Bacillariophyceae
Chaetocerotaceae	Chaetocerotaceae	Bacillariophyceae
Raphidophyceae	Chattonella	Raphidophyceae
Raphidophyceae	Chattonellales	Raphidophyceae
Chlorophyceae	Chlorophyceae	Chlorophyceae
Choanofila	Choanofila	
Chromista	Chromista	
Chrysochromulina	Chrysochromulina	Prymnesiophyceae
Chrysophyceae	Chrysophyceae	Chrysophyceae
Ciliophora	Ciliophora	
Climaconeis	Climaconeis	Bacillariophyceae
Climaconeis	Climaconeis inflexa	Bacillariophyceae
Coccolithaceae	Coccolithaceae	Prymnesiophyceae
Coccolithaceae	Coccolithus	Prymnesiophyceae
Cocconeis	Cocconeis	Bacillariophyceae
Coccosphaerales	Coccosphaerales	Prymnesiophyceae
Cochlodinium	Cochlodinium	Dinophyceae
Cochlodinium	Cochlodinium polykrikoides	Dinophyceae
Coolia	Coolia	Dinophyceae

Intitulé.Graphe	Libellé.taxon	Classe
Corethron	Corethron	Bacillariophyceae
Corethron	Corethron pennatum	Bacillariophyceae
Prymnesiophyceae	Corymbellus	Prymnesiophyceae
Oxytoxaceae	Corythodinium	Dinophyceae
Coscinodiscales	Coscinodiscaceae	Bacillariophyceae
Coscinodiscales	Coscinodiscales	Bacillariophyceae
Coscinodiscales	Coscinodiscophycidae	Bacillariophyceae
Coscinodiscus	Coscinodiscus	Bacillariophyceae
Coscinodiscus +	Coscinodiscus + Stellarima	Bacillariophyceae
Coscinodiscus +	Coscinodiscus asteromphalus + oculus-iridis + perforatus	Bacillariophyceae
Coscinodiscus	Coscinodiscus granii	Bacillariophyceae
Coscinodiscus	Coscinodiscus oculus-iridis	Bacillariophyceae
Coscinodiscus	Coscinodiscus radiatus	
Coscinodiscus +	Coscinodiscus radiatus + marginatus	Bacillariophyceae
Coscinodiscus	Coscinodiscus wailesii	Bacillariophyceae
Cryptophyceae	Cryptomonadales	Cryptophyceae
Cryptophyceae	Cryptophyceae	Cryptophyceae
Cyanophyceae	Cyanobacteria	Cyanophyceae
Cyanophyceae	Cyanophyceae	Cyanophyceae
Cyclotella	Cyclotella	Bacillariophyceae
Cylindrotheca	Cylindrotheca	Bacillariophyceae
Cylindrotheca	Cylindrotheca closterium	Bacillariophyceae
Cylindrotheca +	Cylindrotheca closterium + Nitzschia longissima	Bacillariophyceae
Cylindrotheca	Cylindrotheca gracilis	Bacillariophyceae
Cymatosiraceae	Cymatosiraceae	Bacillariophyceae
Cymbella	Cymbella	Bacillariophyceae
Cymbellaceae	Cymbellaceae	Bacillariophyceae
Dactyliosolen	Dactyliosolen	Bacillariophyceae
Dactyliosolen	Dactyliosolen fragilissimus	Bacillariophyceae
Dactyliosolen	Dactyliosolen phuketensis	Bacillariophyceae
Delphineis	Delphineis	Bacillariophyceae
Detonula	Detonula	Bacillariophyceae
Detonula	Detonula pumila	Bacillariophyceae
Diatoma	Diatoma	Bacillariophyceae
Dictyocha	Dictyocha	Dictyochophyceae
Dictyocha	Dictyocha fibula	Dictyochophyceae
Dictyocha	Dictyocha speculum	Dictyochophyceae

Intitulé.Graphe	Libellé.taxon	Classe
Dictyochaceae	Dictyochaceae	Dictyochophyceae
Dictyochales	Dictyochales	Dictyochophyceae
Dictyochophyceae	Dictyochophyceae	Dictyochophyceae
Dinobryon	Dinobryon	Chrysophyceae
Dinoflagellata	Dinoflagellata	Dinophyceae
Dinophyceae	Dinophyceae	Dinophyceae
Dinophysiaceae	Dinophysiaceae	Dinophyceae
Dinophysis	Dinophysis	Dinophyceae
Dinophysis +	Dinophysis + phalacroma	Dinophyceae
Dinophysis	Dinophysis acuminata	Dinophyceae
Dinophysis	Dinophysis acuta	Dinophyceae
Dinophysis	Dinophysis caudata	Dinophyceae
Dinophysis	Dinophysis fortii	Dinophyceae
Dinophysis	Dinophysis norvegica	Dinophyceae
Dinophysis	Dinophysis sacculus	Dinophyceae
Dinophysis	Dinophysis tripos	Dinophyceae
Diploneis	Diploneis	Bacillariophyceae
Diplopsalis	Diplopsalis	Dinophyceae
Diplopsalis +	Diplopsalis + Diplopelta + Diplopsalopsis + Preperidinium + Oblea	Dinophyceae
Diplopsalis +	${\bf Diplops a lis+Diplopelta+Dipl}$	ops Diopopishy Case peridinium+Oblea
Diplopsalis	Diplopsalopsis	Dinophyceae
Discosphaera	Discosphaera	Prymnesiophyceae
Pyrocystaceae	Dissodinium	Dinophyceae
Pyrocystaceae	Dissodinium + Pyrocystis	Dinophyceae
Ditylum	Ditylum	Bacillariophyceae
Ditylum	Ditylum brightwellii	Bacillariophyceae
Ditylum	Ditylum sol	Bacillariophyceae
Donkinia	Donkinia	Bacillariophyceae
Ebria	Ebria	Ebriophyceae
Ebria	Ebria tripartita	Ebriophyceae
Ebriaceae	Ebriaceae	Ebriophyceae
Ensiculifera	Ensiculifera	Dinophyceae
Entomoneidaceae	Entomoneidaceae	Bacillariophyceae
Entomoneis	Entomoneis	Bacillariophyceae
Eucampia	Eucampia	Bacillariophyceae
Eucampia $+$	Eucampia + Climacodium	Bacillariophyceae
Eucampia	Eucampia zodiacus	Bacillariophyceae
Euglenia	Euglena	Euglenoidea

Intitulé.Graphe	Libellé.taxon	Classe
Euglenia	Euglenaceae	Euglenoidea
Euglenia	Euglenia	Euglenoidea
Euglenoidea	Euglenoidea	Euglenoidea
Anaulales	Eunotogramma	Bacillariophyceae
Eutreptia	Eutreptia	Euglenoidea
Eutreptiida	Eutreptiaceae	Euglenoidea
Eutreptiella	Eutreptiella	Euglenoidea
Eutreptiida	Eutreptiida	Euglenoidea
Fibrocapsa	Fibrocapsa	Raphidophyceae
Fibrocapsa	Fibrocapsa japonica	Raphidophyceae
Fragilaria	Fragilaria	Bacillariophyceae
Fragilariaceae	Fragilariaceae	Bacillariophyceae
Fragilariopsis	Fragilariopsis	Bacillariophyceae
Fragilidium	Fragilidium	Dinophyceae
Gambierdiscus	Gambierdiscus	Dinophyceae
Cymbellales	Gomphonema	Bacillariophyceae
Cymbellales	Gomphonema+Gomphone is	Bacillariophyceae
Cymbellales	Gomphonemataceae	Bacillariophyceae
Goniodoma	Goniodoma	Dinophyceae
Goniodoma	Goniodoma polyedricum	Dinophyceae
Goniodomataceae	Goniodomataceae	Dinophyceae
Gonyaulacaceae	Gonyaulacaceae	Dinophyceae
Gonyaulacales	Gonyaulacales	Dinophyceae
Gonyaulax	Gonyaulax	Dinophyceae
Gonyaulax +	Gonyaulax complexe spinifera (diegensis + digitale + spinifera)	Dinophyceae
Gonyaulax	Gonyaulax digitalis	Dinophyceae
Gonyaulax	Gonyaulax grindleyi	Dinophyceae
Gonyaulax	Gonyaulax polygramma	Dinophyceae
Gonyaulax	Gonyaulax spinifera	Dinophyceae
Gonyaulax	Gonyaulax verior	Dinophyceae
Grammatophora	Grammatophora	Bacillariophyceae
Grammatophora	Grammatophora oceanica	Bacillariophyceae
Grammatophora	Grammatophora serpentina	Bacillariophyceae
Guinardia	Guinardia	Bacillariophyceae
Guinardia	Guinardia delicatula	Bacillariophyceae
Guinardia	Guinardia flaccida	Bacillariophyceae
Guinardia	Guinardia striata	Bacillariophyceae
Gymnodiniales	Gymnodiniaceae	Dinophyceae

Intitulé.Graphe	Libellé.taxon	Classe
Gymnodiniales	Gymnodiniales	Dinophyceae
Gymnodiniales	Gymnodiniida	Dinophyceae
Gymnodinium	Gymnodinium	Dinophyceae
Gymno. + Gyro.	Gymnodinium + Gyrodinium	Dinophyceae
Gymnodinium	Gymnodinium catenatum	Dinophyceae
Gymnodinium	Gymnodinium impudicum	Dinophyceae
Gyrodinium	Gyrodinium	Dinophyceae
Gyrodinium	Gyrodinium fusiforme	Dinophyceae
Gyrodinium	Gyrodinium spirale	Dinophyceae
Gyrosigma	Gyrosigma	Bacillariophyceae
Gyrosigma	Gyrosigma fasciola	Bacillariophyceae
Halosphaera	Halosphaera	Prasinophyceae
Nitzschia + Hantz.	Hantzschia	Bacillariophyceae
Prymnesiophyceae	Haptolina hirta + ericina + Chrysochromulina spinifera	Prymnesiophyceae
Haslea	Haslea	Bacillariophyceae
Haslea	Haslea ostrearia	Bacillariophyceae
Haslea	Haslea wawrikae	Bacillariophyceae
Ciliophora	Helicostomella	
Helicotheca	Helicotheca	Bacillariophyceae
Helicotheca	Helicotheca tamesis	Bacillariophyceae
Coscinodiscales	Heliopeltaceae	Bacillariophyceae
Hemiaulus	Hemiaulus	Bacillariophyceae
Hemiaulus	Hemiaulus hauckii	Bacillariophyceae
Hemiaulus	Hemiaulus membranaceus	Bacillariophyceae
Hemiaulus	Hemiaulus sinensis	Bacillariophyceae
Coscinodiscales	Hemidiscaceae	Bacillariophyceae
Hermesinum	Hermesinum	Ebriophyceae
Heterocapsa	Heterocapsa	Dinophyceae
Heterocapsa	Heterocapsa niei	Dinophyceae
Heterocapsa	Heterocapsa rotundata	Dinophyceae
Heterocapsa	Heterocapsa triquetra	Dinophyceae
Heterocapsaceae	Heterocapsaceae	Dinophyceae
Heterosigma	Heterosigma	Raphidophyceae
Heterosigma	Heterosigma akashiwo	Raphidophyceae
Hyalodiscaceae	Hyalodiscaceae	Bacillariophyceae
Isthmia	Isthmia	Bacillariophyceae
Karenia	Karenia	Dinophyceae
Karenia	Karenia brevis	Dinophyceae
Karenia	Karenia brevis + papilionacea	Dinophyceae

Intitulé.Graphe	Libellé.taxon	Classe
Karenia	Karenia mikimotoi	Dinophyceae
Karenia	Karenia papilionacea	Dinophyceae
Kareniaceae	Kareniaceae	Dinophyceae
Gymnodiniales	Karlodinium	Dinophyceae
Gymnodiniales	Karlodinium veneficum	Dinophyceae
Gymnodiniales	Katodinium	Dinophyceae
Gymnodiniales	Katodinium glaucum	Dinophyceae
Kryptoperidinium	Kryptoperidinium	Dinophyceae
Kryptoperidinium	Kryptoperidinium foliaceum	Dinophyceae
Ciliophora	Laboea	
Lauderia	Lauderia	Bacillariophyceae
Lauderia +	Lauderia + Detonula	Bacillariophyceae
Lauderia	Lauderia annulata	Bacillariophyceae
Lepidodinium	Lepidodinium	Dinophyceae
Lepidodinium	Lepidodinium chlorophorum	Dinophyceae
Leptocylindraceae	Leptocylindraceae	Bacillariophyceae
Leptocylindrus	Leptocylindrus	Bacillariophyceae
Leptocylindrus	Leptocylindrus danicus	Bacillariophyceae
Leptocylindrus +	Leptocylindrus danicus + curvatus	Bacillariophyceae
Leptocylindrus	Leptocylindrus mediterraneus	Bacillariophyceae
Leptocylindrus	Leptocylindrus minimus	Bacillariophyceae
Leptocylindrus +	Leptocylindrus, complexe danicus groupe des larges (danicus + curvatus + mediterraneus + aporus + convexus + hargravesii + adriaticus)	Bacillariophyceae
Leptocylindrus +	Leptocylindrus, complexe minimus groupe des fines (L. minimus + Tenuicylindrus belgicus)	Bacillariophyceae
Lessardia	Lessardia	Dinophyceae
Levanderina	Levanderina fissa	Dinophyceae
Licmophora	Licmophora	Bacillariophyceae
Lingulodinium	Lingulodinium	Dinophyceae
Lingulodinium	Lingulodinium polyedra	Dinophyceae
Lingulodinium	Lingulodinium polyedrum	Dinophyceae
Lioloma	Lioloma	Bacillariophyceae
Lithodesmiaceae	Lithodesmiaceae	Bacillariophyceae
Lithodesmium	Lithodesmium	Bacillariophyceae
Lithodesmium	Lithodesmium undulatum	Bacillariophyceae

Intitulé.Graphe	Libellé.taxon	Classe
Lyrella	Lyrella	Bacillariophyceae
Mediopyxis	Mediopyxis	Bacillariophyceae
Mediopyxis	Mediopyxis helysia	Khakista incertae sedis
Melosira	Melosira	Bacillariophyceae
Melosira	Melosira moniliformis	Bacillariophyceae
Melosira	Melosira nummuloides	Bacillariophyceae
Melosiraceae	Melosiraceae	Bacillariophyceae
Meringosphaera	Meringosphaera	Xanthophyceae
Merismopedia	Merismopedia	Cyanophyceae
Mesodinium	Mesodinium	Litostomatea
Mesodinium	Mesodinium rubrum	Litostomatea
Prorocentraceae	Mesoporos	Dinophyceae
Dinophysiaceae	Metaphalacroma	Dinophyceae
Meuniera	Meuniera	Bacillariophyceae
Meuniera	Meuniera membranacea	Bacillariophyceae
Prymnesiophyceae	Michaelsarsia adriaticus	Prymnesiophyceae
Gonyaulacales	Micracanthodinium	Dinophyceae
Cyanophyceae	Microcystis	Cyanophyceae
Cymatosiraceae	Minutocellus	Bacillariophyceae
Cnidaria	Modeeria	Hydrozoa
Naviculales	Navicula	Bacillariophyceae
Naviculales	Navicula + Fallacia + Haslea + Lyrella + Petroneis	Bacillariophyceae
Naviculales	Navicula gregaria	Bacillariophyceae
Naviculales	Navicula gregaria + cryptocephala	Bacillariophyceae
Naviculales	Navicula pelagica	Bacillariophyceae
Naviculales	Naviculaceae	Bacillariophyceae
Naviculales	Naviculales	Bacillariophyceae
Warnowiaceae	Nematodinium	Dinophyceae
Neocalyptrella	Neocalyptrella	Dinophyceae
Rhizosoleniaceae	Neocalyptrella robusta	Bacillariophyceae
Neoceratium	Neoceratium	Dinophyceae
Ceratiaceae	Neoceratium arietinum	Dinophyceae
Ceratiaceae	Neoceratium azoricum	Dinophyceae
Ceratiaceae	Neoceratium candelabrum	Dinophyceae
Ceratiaceae	Neoceratium concilians	Dinophyceae
Ceratiaceae	Neoceratium declinatum	Dinophyceae
Ceratiaceae	Neoceratium furca	Dinophyceae
Ceratiaceae	Neoceratium fusus	Dinophyceae

Intitulé.Graphe	Libellé.taxon	Classe
Ceratiaceae	Neoceratium horridum	Dinophyceae
Ceratiaceae	Neoceratium lineatum	Dinophyceae
Ceratiaceae	Neoceratium lineatum $+$ minutum	Dinophyceae
Ceratiaceae	Neoceratium macroceros	Dinophyceae
Ceratiaceae	Neoceratium pentagonum	Dinophyceae
Ceratiaceae	Neoceratium ranipes	Dinophyceae
Ceratiaceae	Neoceratium symmetricum	Dinophyceae
Ceratiaceae	Neoceratium teres	Dinophyceae
Ceratiaceae	Neoceratium tripos	Dinophyceae
Nitzschia	Nitzschia	Bacillariophyceae
Nitzschia + Hantz.	Nitzschia + Hantzschia	Bacillariophyceae
Nitzschia	Nitzschia bicapitata	Bacillariophyceae
Nitzschia	Nitzschia longissima	Bacillariophyceae
Noctilucales	Noctiluca	Noctilucea
Noctilucales	Noctiluca scintillans	Noctilucea
Noctilucales	Noctilucaceae	Noctilucea
Noctilucales	Noctilucales	Noctilucea
Noctilucales	Noctilucida	Noctilucea
Oblea	Oblea	Dinophyceae
Octactis	Octactis	Dictyochophyceae
Odontella	Odontella	Bacillariophyceae
Odontella	Odontella aurita	Bacillariophyceae
Odontella	Odontella granulata	Bacillariophyceae
Odontella	Odontella mobiliensis	Bacillariophyceae
Odontella	Odontella regia	Bacillariophyceae
Odontella	Odontella sinensis	Bacillariophyceae
Ophiaster	Ophiaster	Syracosphaeraceae
Ornithocercus	Ornithocercus	Dinophyceae
Cyanophyceae	Oscillatoria	Cyanophyceae
Ostreopsis	Ostreopsis	Dinophyceae
Ostreopsis	Ostreopsis ovata	Dinophyceae
Oxyrrhis	Oxyrrhis	Dinophyceae
Oxyrrhis	Oxyrrhis marina	Dinophyceae
Oxytoxaceae	Oxytoxaceae	Dinophyceae
Oxytoxum	Oxytoxum	Dinophyceae
Oxytoxum +	Oxytoxum + Corythodinium	Dinophyceae
Oxytoxum	Oxytoxum scolopax	Dinophyceae
Oxytoxum	Oxytoxum variabile	Dinophyceae
Gonyaulacales	Palaeophalacroma	Dinophyceae

Intitulé.Graphe	Libellé.taxon	Classe
Paralia	Paralia	Bacillariophyceae
Paralia	Paralia sulcata	Bacillariophyceae
Pediastrum	Pediastrum	Chlorophyceae
Pedinellales	Pedinellales	Dictyochophyceae
Pennées	Pennées	Bacillariophyceae
Peridiniales	Peridiniaceae	Dinophyceae
Peridiniales	Peridiniales	Dinophyceae
Gonyaulacales	Peridiniella	Dinophyceae
Peridiniales	Peridiniida	Dinophyceae
Peridiniida	Peridiniida incertae sedis	Dinophyceae
Peridinium	Peridinium	Dinophyceae
Peridinium	Peridinium quinquecorne	Dinophyceae
Phaeocystis	Phaeocystis	Prymnesiophyceae
Phalacroma	Phalacroma	Dinophyceae
Phalacroma	Phalacroma cuneus	Dinophyceae
Phalacroma	Phalacroma rapa	Dinophyceae
Phalacroma	Phalacroma rotundata	Dinophyceae
Phalacroma	Phalacroma rotundatum	Dinophyceae
Chromista	Phytoflagelles excepte dinoflagelles	
Pinnularia	Pinnularia	Bacillariophyceae
Plagiogramma	Plagiogramma	Bacillariophyceae
Plagiogrammopsis	Plagiogrammopsis	Bacillariophyceae
Plagiogrammopsis	Plagiogrammopsis vanheurckii	Bacillariophyceae
Plagiolemma	Plagiolemma	Bacillariophyceae
Plagiolemma	Plagiolemma distortum	Bacillariophyceae
Plagiolemma	Plagiolemma sp. nov.	Bacillariophyceae
Plagiotropidaceae	Plagiotropidaceae	Bacillariophyceae
Plagiotropis	Plagiotropis	Bacillariophyceae
Pleurosigmataceae	Pleurosigma	Bacillariophyceae
Pleurosigmataceae	Pleurosigma + Gyrosigma	Bacillariophyceae
Podocystis	Podocystis	Bacillariophyceae
Podolampas	Podolampas	Dinophyceae
Podolampas	Podolampas palmipes	Dinophyceae
Podosira	Podosira	Bacillariophyceae
Podosira +	Podosira + Hyalodiscus	Bacillariophyceae
Podosira	Podosira stelligera	Bacillariophyceae
Polykrikaceae	Polykrikaceae	Dinophyceae
Polykrikaceae	Polykrikos	Dinophyceae
Polykrikaceae	Polykrikos schwarzii	Dinophyceae

Porosira Porosira Bacillariophyceae Prasinophyceae Prasinophyceae Proboscia Proboscia Bacillariophyceae Proboscia Proboscia Bacillariophyceae Proboscia Proboscia alata Bacillariophyceae Proboscia Proboscia alata Bacillariophyceae Proboscia Proboscia alata f. alata Bacillariophyceae Proboscia Proboscia indica Bacillariophyceae Proboscia Proboscia truncata Bacillariophyceae Proboscia Proboscia truncata Bacillariophyceae Proboscia Procentruma Bacillariophyceae Procentruse Prorocentrume Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum dentatum Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum mexicanum Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum mexicanum Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum micans Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum triestinum Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum triestinum Dinophyceae Protoceratium Protoceratium Dinophyceae Protoceratium Protoceratium Dinophyceae Protoceratium Protoceratium Dinophyceae Protoceridinium Protoceratium Dinophyceae Protoperidinium Protoceratium Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium caladicans Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium caladicans Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium diabolum Dinophyceae	Intitulé.Graphe	Libellé.taxon	Classe
Proboscia Proboscia Bacillariophyceae Proboscia Proboscia alata Bacillariophyceae Proboscia Proboscia alata f. alata Bacillariophyceae Proboscia Proboscia truncata Bacillariophyceae Proboscia Proboscia truncata Bacillariophyceae Proscentrus Dinophyceae Prorocentrules Pronocentrules Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum compressum Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum compressum Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum compressum Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum compressum Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum condutum Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum gracile Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum mexicanum Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum mexicanum Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum mexicanum Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum scutellum Dinophyceae <td>Porosira</td> <td>Porosira</td> <td>Bacillariophyceae</td>	Porosira	Porosira	Bacillariophyceae
Proboscia Proboscia alata Bacillariophyceae Proboscia Proboscia alata f. alata Bacillariophyceae Proboscia Proboscia indica Bacillariophyceae Proboscia Proboscia truncata Bacillariophyceae Noctilucales Pronocetilua Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum compressum Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum compressum Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum condatum Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum condatum Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum dentatum Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum gracile Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum micans Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum micans Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum micans Pinophyceae Prorocentrum Prorocentrum scutellum Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum triestimum	Prasinophyceae	Prasinophyceae	Prasinophyceae
Proboscia Proboscia indica Bacillariophyceae Proboscia Proboscia indica Bacillariophyceae Proboscia Proboscia truncata Bacillariophyceae Prorocentrales Pronocentrales Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum balticum + cordatum Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum compressum Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum cordatum Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum compressum Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum cordatum Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum gracile Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum gracile Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum mexicanum Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum micans Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum micans Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum scutellum Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum triestinum Dinophyceae Protoceratium Protocer	Proboscia	Proboscia	Bacillariophyceae
Proboscia Proboscia indica Bacillariophyceae Proboscia Proboscia truncata Bacillariophyceae Noctilucales Pronoctiluca Dinophyceae Prorocentrales Prorocentrum Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum Dinophyceae Prorocentrum + Prorocentrum balticum + cordatum Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum cordatum Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum dentatum Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum gracile Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum mexicanum Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum mexicanum Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum micans Dinophyceae Prorocentrum + Prorocentrum scutellum Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum scutellum Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum triestinum Dinophyceae Protoceratium Protoceratium Dinophyceae Protoceratium Protoceratium reticulatum Dinophyceae Protoperidinium Protoperidin	Proboscia	Proboscia alata	Bacillariophyceae
Proboscia Proboscia truncata Bacillariophyceae Noctilucales Pronoctiluca Dinophyceae Prorocentrales Prorocentrum Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum balticum + cordatum Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum compressum Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum cordatum Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum dentatum Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum gracile Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum lima Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum mexicanum Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum micans + arcuatum + gibbosum + scutellum Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum scutellum Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum triestinum Dinophyceae Protoceratium Protoceratium Dinophyceae Protoceratium Protoceratium reticulatum Dinophyceae Protoperidinium + Protoperidinium bipes Dinophyceae Protoperidinium	Proboscia	Proboscia alata f. alata	Bacillariophyceae
Noctilucales Pronoctiluca Dinophyceae Prorocentrales Dinophyceae Prorocentrum Dinophyceae Prorocentrum Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum balticum + cordatum Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum compressum Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum dentatum Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum gracile Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum lima Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum mexicanum Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum micans Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum micans Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum scutellum Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum scutellum Dinophyceae Protoceratium Protoceratium Dinophyceae Protoceratium Protoceratium Dinophyceae Protoceratium Protoperidinium Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium bipes </td <td>Proboscia</td> <td>Proboscia indica</td> <td>Bacillariophyceae</td>	Proboscia	Proboscia indica	Bacillariophyceae
Prorocentrum Prorocentrum balticum + cordatum Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum balticum + cordatum Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum compressum Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum compressum Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum dentatum Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum gracile Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum gracile Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum mexicanum Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum mexicanum Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum micans Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum micans Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum micans + arcuatum + gibbosum + scutellum Prorocentrum Prorocentrum scutellum Dinophyceae Protoceratium Prorocentrum triestinum Dinophyceae Protoceratium Protoceratium Dinophyceae Protoceratium Protoceratium Dinophyceae Protoceratium Protoceratium Dinophyceae Protoceratium Protoperidinium Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium caudicans Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium caudicans Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium cassipes Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium depressum Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium depressum Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium diabolum Dinophyceae	Proboscia	Proboscia truncata	Bacillariophyceae
ProrocentrumProrocentrumDinophyceaeProrocentrum +Prorocentrum balticum + cordatumDinophyceaeProrocentrumProrocentrum compressumDinophyceaeProrocentrumProrocentrum cordatumDinophyceaeProrocentrumProrocentrum dentatumDinophyceaeProrocentrumProrocentrum gracileDinophyceaeProrocentrumProrocentrum micanDinophyceaeProrocentrumProrocentrum mexicanumDinophyceaeProrocentrumProrocentrum micansDinophyceaeProrocentrum +Prorocentrum micans + arcuatum + gibbosum + scutellumDinophyceaeProrocentrumProrocentrum scutellumDinophyceaeProrocentrumProrocentrum triestinumDinophyceaeProtoceratiumProtoceratiumDinophyceaeProtoceratiumProtoceratium reticulatumDinophyceaeProtoperidiniumProtoperidiniumDinophyceaeProtoperidiniumProtoperidinium bipesDinophyceaeProtoperidiniumProtoperidinium bipesDinophyceaeProtoperidiniumProtoperidinium claudicansDinophyceaeProtoperidiniumProtoperidinium conicumDinophyceaeProtoperidiniumProtoperidinium conicumDinophyceaeProtoperidiniumProtoperidinium diabolumDinophyceaeProtoperidiniumProtoperidinium diabolumDinophyceaeProtoperidiniumProtoperidinium diabolumDinophyceaeProtoperidiniumProtoperidinium diabolumDinophyceaeProtoperidinium </td <td>Noctilucales</td> <td>Pronoctiluca</td> <td>Dinophyceae</td>	Noctilucales	Pronoctiluca	Dinophyceae
Prorocentrum + Prorocentrum balticum + cordatum Prorocentrum Prorocentrum compressum Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum cordatum Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum dentatum Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum gracile Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum mican Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum micans Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum scutellum Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum triestinum Dinophyceae Protoceratium Protoceratium Dinophyceae Protoceratium Protoceratium Dinophyceae Protoceratium Protoceratium Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium bipes Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium brevipes Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium candicians Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium conicum Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium conicum Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium diabolum Dinophyceae	Prorocentrales	Prorocentrales	Dinophyceae
Prorocentrum + cordatum Prorocentrum compressum Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum compressum Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum dentatum Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum gracile Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum lima Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum mexicanum Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum micans Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum micans Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum micans Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum micans Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum scutellum Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum triestinum Dinophyceae Protoceratium Protoceratium Dinophyceae Protoceratium Protoceratium Dinophyceae Protoceratium Protoceratium Protoceratium Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium bipes Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium brevipes Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium caladicans Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium cassipes Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium depressum Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium depressum Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium diabolum Dinophyceae	Prorocentrum	Prorocentrum	Dinophyceae
Prorocentrum Prorocentrum cordatum Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum dentatum Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum gracile Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum lima Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum mexicanum Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum micans Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum micans Dinophyceae Prorocentrum + Prorocentrum micans + arcuatum + gibbosum + scutellum Prorocentrum Prorocentrum scutellum Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum triestinum Dinophyceae Protoceratium Protoceratium Dinophyceae Protoceratium Protoceratium Dinophyceae Protoceratium Protoceratium Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium bipes Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium brevipes Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium claudicans Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium conicum Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium conicum Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium depressum Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium depressum Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium diabolum Dinophyceae	Prorocentrum +		Dinophyceae
Prorocentrum Prorocentrum dentatum Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum gracile Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum lima Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum mexicanum Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum micans Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum micans Dinophyceae Prorocentrum micans +	Prorocentrum	Prorocentrum compressum	Dinophyceae
Prorocentrum Prorocentrum gracile Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum lima Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum mexicanum Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum micans Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum micans Dinophyceae Prorocentrum + Prorocentrum micans + arcuatum + gibbosum + scutellum Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum triestinum Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum triestinum Dinophyceae Protoceratium Protoceratium Dinophyceae Protoceratium Protoceratium Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium Protoperidinium Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium brevipes Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium caudicans Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium conicum Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium conicum Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium depressum Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium depressum Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium diabolum Dinophyceae	Prorocentrum	Prorocentrum cordatum	Dinophyceae
Prorocentrum Prorocentrum lima Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum mexicanum Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum micans Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum micans Dinophyceae Prorocentrum + Prorocentrum micans + arcuatum + gibbosum + binophyceae Prorocentrum Prorocentrum scutellum Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum triestinum Dinophyceae Protoceratium Protoceratium Dinophyceae Protoceratium Protoceratium Protoceratium Dinophyceae Protoceratium Protoperidinium Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium Protoperidinium Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium brevipes Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium brevipes Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium conicum Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium conicum Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium crassipes Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium depressum Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium diabolum Dinophyceae Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium diabolum Dinophyceae	Prorocentrum	Prorocentrum dentatum	Dinophyceae
Prorocentrum Prorocentrum mexicanum Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum micans Dinophyceae Prorocentrum + Prorocentrum micans + arcuatum + gibbosum + binophyceae Prorocentrum Prorocentrum scutellum Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum scutellum Dinophyceae Protoceratium Protoceratium Dinophyceae Protoceratium Protoceratium Dinophyceae Protoceratium Protoceratium Dinophyceae Protoceratium Protoceratium Dinophyceae Protoceratium Protoperidinium Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium bipes Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium brevipes Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium claudicans Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium conicum Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium conicum Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium depressum Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium diabolum Dinophyceae	Prorocentrum	Prorocentrum gracile	Dinophyceae
Prorocentrum micans Dinophyceae Prorocentrum micans + arcuatum + gibbosum + scutellum Prorocentrum Prorocentrum scutellum Dinophyceae Prorocentrum Prorocentrum scutellum Dinophyceae Protoceratium Protoceratium Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium Peridinium Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium bipes Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium brevipes Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium claudicans Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium conicum Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium conicum Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium depressum Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium diabolum Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium diabolum Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium diabolum Dinophyceae Protoperidinium + Protoperidinium diabolum Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium diabolum Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium diabolum Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium diabolum Dinophyceae	Prorocentrum	Prorocentrum lima	Dinophyceae
Prorocentrum micans + arcuatum + gibbosum + binophyceae Prorocentrum Prorocentrum scutellum Prorocentrum Prorocentrum triestinum Protoceratium Protoperidinium Protoperidinium Protoperidinium + Peridinium Protoperidinium Protoperidinium bipes Protoperidinium Protoperidinium brevipes Protoperidinium Protoperidinium claudicans Protoperidinium Protoperidinium conicum Protoperidinium Protoperidinium conicum Protoperidinium Protoperidinium crassipes Protoperidinium Protoperidinium diabolum	Prorocentrum	Prorocentrum mexicanum	Dinophyceae
Prorocentrum +arcuatum + gibbosum + scutellumDinophyceaeProrocentrumProrocentrum scutellumDinophyceaeProrocentrumProtoceratium triestinumDinophyceaeProtoceratiumProtoceratiumDinophyceaeProtoceratiumProtoceratium reticulatumDinophyceaeProtoctistaProtoctistaProtoperidiniumProtoperidiniumDinophyceaeProtoperidinium +Protoperidinium + PeridiniumDinophyceaeProtoperidiniumProtoperidinium bipesDinophyceaeProtoperidiniumProtoperidinium claudicansDinophyceaeProtoperidiniumProtoperidinium conicumDinophyceaeProtoperidiniumProtoperidinium crassipesDinophyceaeProtoperidiniumProtoperidinium depressumDinophyceaeProtoperidiniumProtoperidinium diabolumDinophyceaeProtoperidiniumProtoperidinium diabolumDinophyceaeProtoperidiniumProtoperidinium diabolumDinophyceaeProtoperidiniumProtoperidinium diabolumDinophyceaeProtoperidiniumProtoperidinium diabolumDinophyceaeProtoperidiniumProtoperidinium divergensDinophyceae	Prorocentrum	Prorocentrum micans	Dinophyceae
Protoceratium Protoceratium Dinophyceae Protoceratium Protoceratium Dinophyceae Protoceratium Protoceratium Dinophyceae Protoceratium Protoceratium reticulatum Dinophyceae Protoceratium Protoceratium reticulatum Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium Protoperidinium Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium bipes Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium brevipes Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium claudicans Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium conicum Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium crassipes Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium depressum Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium diabolum Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium divergens Dinophyceae	Prorocentrum +	arcuatum + gibbosum +	Dinophyceae
Protoceratium Protoceratium Dinophyceae Protoceratium Protoceratium reticulatum Dinophyceae Protoceratium Protoceratium reticulatum Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium bipes Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium brevipes Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium claudicans Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium conicum Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium crassipes Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium depressum Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium diabolum Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium divergens Dinophyceae	Prorocentrum	Prorocentrum scutellum	Dinophyceae
Protoceratium Protoceratium reticulatum Dinophyceae Protoctista Protoctista Protoperidinium Protoperidinium Dinophyceae Protoperidinium + Protoperidinium Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium bipes Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium brevipes Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium claudicans Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium conicum Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium crassipes Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium depressum Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium diabolum Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium diabolum Dinophyceae Protoperidinium + Protoperidinium diabolum + Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium divergens Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium divergens Dinophyceae	Prorocentrum	Prorocentrum triestinum	Dinophyceae
Protoctista Protoperidinium Protoperidinium Protoperidinium Protoperidinium Protoperidinium Protoperidinium Protoperidinium Protoperidinium Protoperidinium bipes Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium brevipes Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium claudicans Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium conicum Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium crassipes Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium depressum Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium diabolum Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium diabolum Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium diabolum Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium diabolum Protoperidinium diabolum Protoperidinium diabolum Protoperidinium divergens Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium divergens Dinophyceae	Protoceratium	Protoceratium	Dinophyceae
ProtoperidiniumProtoperidiniumDinophyceaeProtoperidinium +Protoperidinium + Peridinium DinophyceaeProtoperidiniumProtoperidinium bipesDinophyceaeProtoperidiniumProtoperidinium brevipesDinophyceaeProtoperidiniumProtoperidinium claudicansDinophyceaeProtoperidiniumProtoperidinium conicumDinophyceaeProtoperidiniumProtoperidinium crassipesDinophyceaeProtoperidiniumProtoperidinium depressumDinophyceaeProtoperidiniumProtoperidinium diabolumDinophyceaeProtoperidinium +Protoperidinium diabolum + longipesDinophyceaeProtoperidiniumProtoperidinium divergensDinophyceaeProtoperidiniumProtoperidinium graniiDinophyceae	Protoceratium	Protoceratium reticulatum	Dinophyceae
Protoperidinium +Protoperidinium + Peridinium DinophyceaeProtoperidiniumProtoperidinium bipesDinophyceaeProtoperidiniumProtoperidinium brevipesDinophyceaeProtoperidiniumProtoperidinium claudicansDinophyceaeProtoperidiniumProtoperidinium conicumDinophyceaeProtoperidiniumProtoperidinium crassipesDinophyceaeProtoperidiniumProtoperidinium depressumDinophyceaeProtoperidiniumProtoperidinium diabolumDinophyceaeProtoperidiniumProtoperidinium diabolum +DinophyceaeProtoperidiniumProtoperidinium divergensDinophyceaeProtoperidiniumProtoperidinium graniiDinophyceae	Protoctista	Protoctista	
Protoperidinium bipes Dinophyceae Protoperidinium brevipes Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium claudicans Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium conicum Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium crassipes Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium crassipes Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium depressum Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium diabolum Dinophyceae Protoperidinium + Protoperidinium diabolum + Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium divergens Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium divergens Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium granii Dinophyceae	Protoperidinium	Protoperidinium	Dinophyceae
Protoperidinium Protoperidinium brevipes Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium claudicans Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium conicum Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium crassipes Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium depressum Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium diabolum Dinophyceae Protoperidinium + Protoperidinium diabolum + Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium divergens Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium divergens Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium granii Dinophyceae	Protoperidinium +	Protoperidinium + Peridinium	Dinophyceae
ProtoperidiniumProtoperidinium claudicansDinophyceaeProtoperidiniumProtoperidinium conicumDinophyceaeProtoperidiniumProtoperidinium crassipesDinophyceaeProtoperidiniumProtoperidinium depressumDinophyceaeProtoperidiniumProtoperidinium diabolumDinophyceaeProtoperidinium +Protoperidinium diabolum + longipesDinophyceaeProtoperidiniumProtoperidinium divergensDinophyceaeProtoperidiniumProtoperidinium graniiDinophyceae	Protoperidinium	Protoperidinium bipes	Dinophyceae
Protoperidinium Protoperidinium conicum Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium crassipes Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium depressum Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium diabolum Dinophyceae Protoperidinium + Protoperidinium diabolum + Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium divergens Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium granii Dinophyceae	Protoperidinium	Protoperidinium brevipes	Dinophyceae
Protoperidinium Protoperidinium crassipes Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium depressum Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium diabolum Dinophyceae Protoperidinium + Protoperidinium diabolum + Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium divergens Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium granii Dinophyceae	Protoperidinium	Protoperidinium claudicans	Dinophyceae
ProtoperidiniumProtoperidinium depressumDinophyceaeProtoperidiniumProtoperidinium diabolumDinophyceaeProtoperidinium +Protoperidinium diabolum + longipesDinophyceaeProtoperidiniumProtoperidinium divergensDinophyceaeProtoperidiniumProtoperidinium graniiDinophyceae	Protoperidinium	Protoperidinium conicum	Dinophyceae
ProtoperidiniumProtoperidinium diabolumDinophyceaeProtoperidinium +Protoperidinium diabolum + longipesDinophyceaeProtoperidiniumProtoperidinium divergensDinophyceaeProtoperidiniumProtoperidinium graniiDinophyceae	Protoperidinium	Protoperidinium crassipes	Dinophyceae
Protoperidinium + Protoperidinium diabolum + Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium divergens Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium granii Dinophyceae	Protoperidinium	Protoperidinium depressum	Dinophyceae
Protoperidinium Protoperidinium divergens Dinophyceae Protoperidinium Protoperidinium granii Dinophyceae	Protoperidinium	Protoperidinium diabolum	Dinophyceae
Protoperidinium Protoperidinium granii Dinophyceae	Protoperidinium +		Dinophyceae
	Protoperidinium	Protoperidinium divergens	Dinophyceae
Protoperidinium Protoperidinium oblongum Dinophyceae	Protoperidinium	Protoperidinium granii	Dinophyceae
	Protoperidinium	Protoperidinium oblongum	Dinophyceae

Intitulé.Graphe	Libellé.taxon	Classe
Protoperidinium	Protoperidinium obtusum	Dinophyceae
Protoperidinium	Protoperidinium pallidum	Dinophyceae
Protoperidinium	Protoperidinium quinquecorne	Dinophyceae
Protoperidinium	Protoperidinium steinii	Dinophyceae
Protoperidinium +	Protoperidinium steinii + pyriforme	Dinophyceae
Prymnesiophyceae	Prymnesiaceae	Prymnesiophyceae
Prymnesiophyceae	Prymnesiales	Prymnesiophyceae
Prymnesiophyceae	Prymnesiophyceae	Prymnesiophyceae
Prymnesiophyceae	Prymnesium	Prymnesiophyceae
Pseliodinium	Pseliodinium	Dinoflagellata incertae sedis
Pseudo-nitzschia	Pseudo-nitzschia	Bacillariophyceae
Pseudo-nitzschia	Pseudo-nitzschia americana	Bacillariophyceae
Pseudo-nitzschia	Pseudo-nitzschia australis	Bacillariophyceae
Pseudo-nitzschia	Pseudo-nitzschia delicatissima	Bacillariophyceae
Pseudo-nitzschia	Pseudo-nitzschia fraudulenta	Bacillariophyceae
Pseudo-nitzschia	Pseudo-nitzschia multistriata	Bacillariophyceae
Pseudo-nitzschia	Pseudo-nitzschia pseudodelicatissima	Bacillariophyceae
Pseudo-nitzschia	Pseudo-nitzschia seriata	Bacillariophyceae
Pseudo-nitzschia	Pseudo-nitzschia subpacifica	Bacillariophyceae
Pseudo-nitzschia +	Pseudo-nitzschia, complexe americana (americana + brasiliana)	Bacillariophyceae
Pseudo-nitzschia +	Pseudo-nitzschia, complexe delicatissima, groupe des fines (calliantha + delicatissima + pseudodelicatissima + subcurvata)	Bacillariophyceae
Pseudo-nitzschia +	Pseudo-nitzschia, complexe seriata, groupe des effilées (multiseries + pungens)	Bacillariophyceae
Pseudo-nitzschia +	Pseudo-nitzschia, complexe seriata, groupe des larges (australis + fraudulenta + seriata + subpacifica)	Bacillariophyceae
Pseudo-nitzschia +	Pseudo-nitzschia, groupe des larges asymétriques (australis + seriata + subpacifica)	Bacillariophyceae
Pseudo-nitzschia +	Pseudo-nitzschia, groupe des larges symétriques (fraudulenta)	Bacillariophyceae
Pseudo-nitzschia +	Pseudo-nitzschia, groupe des sigmoïdes (multistriata)	Bacillariophyceae
Pedinellales	Pseudopedinella	Dictyochophyceae

Intitulé.Graphe	Libellé.taxon	Classe
Pseudosolenia	Pseudosolenia	Bacillariophyceae
Pseudosolenia	Pseudosolenia calcar-avis	Bacillariophyceae
Pyramimonas	Pyramimonas	Prasinophyceae
Pyramimonas	Pyramimonas longicauda	Prasinophyceae
Pyrocystaceae	Pyrocystaceae	Dinophyceae
Pyrocystaceae	Pyrocystis	Dinophyceae
Pyrocystaceae	Pyrocystis robusta	Dinophyceae
Pyrophacaceae	Pyrophacaceae	Dinophyceae
Pyrophacus	Pyrophacus	Dinophyceae
Raphidophyceae	Raphidophyceae	Raphidophyceae
Prymnesiophyceae	Rhabdolithes	Prymnesiophyceae
Rhabdonema	Rhabdonema	Bacillariophyceae
Rhabdonema	Rhabdonema adriaticum	Bacillariophyceae
Rhaphoneis	Rhaphoneis	Bacillariophyceae
Rhaphoneis +	Rhaphoneis + Delphineis	Bacillariophyceae
Rhaphoneis	Rhaphoneis amphiceros	Bacillariophyceae
Rhizosolenia	Rhizosolenia	Bacillariophyceae
Rhizosolenia	Rhizosolenia hebetata	Bacillariophyceae
Rhizosolenia	Rhizosolenia hyalina	
Rhizosolenia	Rhizosolenia imbricata	Bacillariophyceae
Rhizosolenia +	Rhizosolenia imbricata + styliformis	Bacillariophyceae
Rhizosolenia	Rhizosolenia robusta	Bacillariophyceae
Rhizosolenia	Rhizosolenia setigera	Bacillariophyceae
Rhizosolenia +	Rhizosolenia setigera + setigera f. pungens	Bacillariophyceae
Rhizosolenia	Rhizosolenia setigera f. pungens	Bacillariophyceae
Rhizosolenia	Rhizosolenia styliformis	Bacillariophyceae
Rhizosoleniaceae	Rhizosoleniaceae	Bacillariophyceae
Scenedesmus	Scenedesmus	Chlorophyceae
Scenedesmus	Scenedesmus quadricauda	Chlorophyceae
Schroederella	Schroederella	Bacillariophyceae
Scrippsiella	Scrippsiella	Dinophyceae
Scrippsiella +	Scrippsiella + Ensiculifera + Pentapharsodinium	Dinophyceae
Chlorophyceae	Selenastrum	Chlorophyceae
Skeletonema	Skeletonema	Bacillariophyceae
Skeletonema	Skeletonema costatum	Bacillariophyceae
Noctilucales	Spatulodinium	Dinophyceae
	1	1 0

Stauroneis Stauroneis Bacillariophyceae Stephanopyxis Stephanopyxis Bacillariophyceae Stephanopyxis Stephanopyxis Bacillariophyceae Striatella Striatella Bacillariophyceae Striatella Striatella Bacillariophyceae Striatella Striatella Bacillariophyceae Striatella Striatella Bacillariophyceae Surirellaceae Surirellaceae Bacillariophyceae Surirellaceae Surirellaceae Bacillariophyceae Synedra Synedra Bacillariophyceae Synedra Synedra Bacillariophyceae Synedra Hoynomesiophyceae Synedra Synedra Bacillariophyceae Prymnesiophyceae Syracosphaera Prymnesiophyceae Prymnesiophyceae Tabellaria Tabellaria Bacillariophyceae Tetraselmis Tetraselmis Prasinocladus Tetraselmis Prasinocladus Tetraselmis Hotalassionema Thalassionema Bacillariophyceae Thalassionema Thalassionema Bacillariophyceae Thalassionema Thalassionema Bacillariophyceae Thalassionema Thalassionema Bacillariophyceae Thalassionema Thalassionema frauenfeldii Bacillariophyceae Thalassionema Thalassionema frauenfeldii Bacillariophyceae Thalassionema Thalassionema frauenfeldii Bacillariophyceae Thalassionema Thalassionema bacillare Thalassionema Thalassionema Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira angulata Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira angulata Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira angulata Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira decipiens Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira decipiens Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira decipiens Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira levanderi Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira levanderi Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira levanderi Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira minima Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira mordenskioeldii Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira Thalassiosira Dacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira Thalassiosira Dacillariophyceae	Intitulé.Graphe	Libellé.taxon	Classe
Stephanopyxis Stephanopyxis Bacillariophyceae Stephanopyxis Stephanopyxis Unris Bacillariophyceae Striatella Striatella Bacillariophyceae Striatella Striatella Bacillariophyceae Striatella Striatella Bacillariophyceae Surirellaceae Surirella Bacillariophyceae Surirellaceae Surirellaceae Bacillariophyceae Synedra Synedra Bacillariophyceae Synedra Synedra Bacillariophyceae Synedra Hoxarium Bacillariophyceae Synedra Prymnesiophyceae Syracosphaera Prymnesiophyceae Prymnesiophyceae Tabellaria Tabellaria Bacillariophyceae Tetraselmis Tetraselmis Prasinophyceae Tetraselmis Prasinophyceae Thalassionema Bacillariophyceae Thalassionema Bacillariophyceae Thalassionema Bacillariophyceae Thalassionema Thalassionema Bacillariophyceae Thalassionema Thalassionema Bacillariophyceae Thalassionema Thalassionema Bacillariophyceae Thalassionema Thalassionema nitzschioides Thalassionema Thalassionema Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira angustae Ineata Thalassiosira Thalassiosira Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira angustae Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira angustae Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira angustae Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira gravida Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira levanderi Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira levanderi Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira nordenskioeldii Bacillariophyceae Thalassiosira Thalass	Noctilucales		Dinophyceae
Stephanopyxis Stephanopyxis turris Bacillariophyceae Striatella Striatella Striatella Bacillariophyceae Striatella Striatella unipunctata Bacillariophyceae Surirellaceae Surirellaceae Surirellaceae Surirellaceae Bacillariophyceae Synedra Synedra Bacillariophyceae Synedra Synedra Bacillariophyceae Synedra Hacillariophyceae Synedra Hacillariophyceae Synedra Hacillariophyceae Synedra Hacillariophyceae Synedra Hacillariophyceae Prymnesiophyceae Synedra Hacillaria Bacillariophyceae Tabellaria Bacillariophyceae Tabellaria Bacillariophyceae Tetraselmis Hacillaria Bacillariophyceae Tetraselmis Hacillaria Bacillariophyceae Tetraselmis Hacillaria Bacillariophyceae Thalassionema Thalassionema Bacillariophyceae Thalassionema Hacillare Bacillariophyceae Thalassionema Thalassionema Bacillare Bacillariophyceae Thalassionema Thalassionema frauenfeldii Bacillariophyceae Thalassionema Thalassionema mitzschioides Bacillariophyceae Thalassiosira Bacillariophyceae Thalassiosira Bacillariophyceae Thalassiosira Bacillariophyceae Thalassiosira Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira Bacillariophyceae Thalassiosira Halassiosira Bacillariophyceae Thalassiosira Halassiosira Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira Bacillariophyceae Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira Thalassiosira Bacillariophyceae Bacillariophyceae Thalassiosira Thal	Stauroneis	Stauroneis	Bacillariophyceae
Striatella Striatella Bacillariophyceae Striatella Striatella unipunctata Bacillariophyceae Surirellaceae Surirellaceae Bacillariophyceae Synedra Synedra Bacillariophyceae Synedra Synedra Bacillariophyceae Synedra Hymnesiophyceae Synedra Hymnesiophyceae Syracosphaera Prymnesiophyceae Tabellaria Bacillariophyceae Tetraselmis Tetraselmis Prasinophyceae Tetraselmis Tetraselmis Prasinophyceae Tetraselmis Halassionema Bacillariophyceae Thalassionema Thalassionema frauenfeldii Thalassionema Thalassionema frauenfeldii Thalassionema Thalassionema mitzschioides Thalassiosira Thalassiosira Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira angulata Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira angulate Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira angulate Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira angulate Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira antarctica Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira gravida Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira gravida Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira levanderi Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira levanderi Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira nordenskioeldii Bacillariophyceae	Stephanopyxis	Stephanopyxis	Bacillariophyceae
Striatella Striatella unipunctata Bacillariophyceae Surirellaceae Surirellaceae Surirellaceae Surirellaceae Surirellaceae Surirellaceae Surirellaceae Bacillariophyceae Synedra Synedra Bacillariophyceae Synedra + Synedra + Toxarium Bacillariophyceae Prymnesiophyceae Syracosphaera Prymnesiophyceae Tabellaria Tabellaria Bacillariophyceae Tetraselmis Tetraselmis Prasinocladus Tetraselmis + Tetraselmis + Prasinocladus Thalassionema Bacillariophyceae Thalassionema + Thalassionema + Thalassionema + Thalassionema + Thalassionema Bacillariophyceae Thalassionema Thalassionema frauenfeldii Bacillariophyceae Thalassionema Thalassionema frauenfeldii Bacillariophyceae Thalassionema Thalassionema traceae Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira angulata Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira angulata Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira angulata Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira decipiens Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira Gecentrica Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira decipiens Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira pavida Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira levanderi Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira levanderi Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira levanderi Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira minima Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira minima Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira nordenskioeldii Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira punctigera Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira rotula Bacillariophyceae	Stephanopyxis	Stephanopyxis turris	Bacillariophyceae
Surirellaceae Synedra Synedra Synedra Bacillariophyceae Synedra + Synedra + Toxarium Bacillariophyceae Prymnesiophyceae Syracosphaera Prymnesiophyceae Tabellaria Tabellaria Bacillariophyceae Tetraselmis Tetraselmis Prasinocladus Prasinophyceae Tabellaria Tabellaria Bacillariophyceae Tabellaria Tabellaria Bacillariophyceae Tabellaria Tabellaria Bacillariophyceae Tabellassionema Thalassionema Bacillariophyceae Bacillariophyceae Thalassionema Thalassionema Bacillariophyceae Bacillariophyceae Thalassionema Thalassionema bacillare Bacillariophyceae Bacillariophyceae Thalassionema Thalassionema Tabellaria Bacillariophyceae Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira Bacillariophyceae Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira angulata Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira angulata Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira angulata Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira angulata Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira decipiens Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira Gecipiens Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira Gecentrica Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira Pacelepiens Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira Pacelepien Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira Bacillariophyceae Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira Pacelepien Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira Thalassiosira Devanderi Bacillariophyceae Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira Thalassiosira Devanderi Bacillariophyceae Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira Thalassiosira Devanderi Bacillariophyceae Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira Devanderi Bacillariophyceae Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira Devanderi Bacillariophyc	Striatella	Striatella	Bacillariophyceae
Surirellaceae Surirellaceae Bacillariophyceae Synedra Synedra Bacillariophyceae Synedra + Synedra + Toxarium Bacillariophyceae Prymnesiophyceae Syracosphaera Prymnesiophyceae Tabellaria Tabellaria Bacillariophyceae Tetraselmis Tetraselmis Prasinophyceae Tetraselmis + Tetraselmis Prasinophyceae Thalassionema Thalassionema Bacillariophyceae Thalassionema + Thalassionema Bacillariophyceae Thalassionema + Thalassionema Bacillariophyceae Thalassionema Thalassionema Bacillariophyceae Thalassionema Thalassionema Bacillariophyceae Thalassionema Thalassionema Bacillariophyceae Thalassionema Thalassionema frauenfeldii Bacillariophyceae Thalassionema Thalassionema nitzschioides Thalassionema Thalassionema Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira anguste-lineata Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira eccentrica Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira eccentrica Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira levanderi Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira levanderi Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira levanderi Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira minima Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira minima Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira minima Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira punctigera Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira rotula Bacillariophyceae	Striatella	Striatella unipunctata	Bacillariophyceae
Synedra Synedra Bacillariophyceae Synedra + Synedra + Toxarium Bacillariophyceae Prymnesiophyceae Syracosphaera Prymnesiophyceae Tabellaria Tabellaria Bacillariophyceae Tetraselmis Tetraselmis Prasinocladus Tetraselmis + Tetraselmis + Prasinocladus Thalassionema Bacillariophyceae Thalassionema + Thalassionema Bacillariophyceae Thalassionema + Thalassionema Bacillariophyceae Thalassionema + Thalassionema bacillare Thalassionema Thalassionema frauenfeldii Bacillariophyceae Thalassionema Thalassionema frauenfeldii Bacillariophyceae Thalassionema Thalassionema nitzschioides Thalassionema Thalassionema traceae Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira Bacillariophyceae Thalassiosira Halassiosira Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira angulata Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira anguste-lineata Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira anguste-lineata Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira decipiens Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira ceccentrica Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira gravida Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira gravida Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira levanderi Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira minima Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira nordenskioeldii Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira nordenskioeldii Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira rotula Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira rotula Bacillariophyceae	Surirellaceae	Surirella	Bacillariophyceae
Synedra + Synedra + Toxarium Bacillariophyceae Prymnesiophyceae Syracosphaera Prymnesiophyceae Tabellaria Tabellaria Bacillariophyceae Tetraselmis Tetraselmis Prasinocladus Prasinophyceae Tetraselmis + Tetraselmis Prasinocladus Prasinophyceae Thalassionema Thalassionema Bacillariophyceae Thalassionema + Thalassionema Bacillariophyceae Thalassionema + Thalassionema bacillare Bacillariophyceae Thalassionema Thalassionema bacillare Bacillariophyceae Thalassionema Thalassionema frauenfeldii Bacillariophyceae Thalassionema Thalassionema nitzschioides Bacillariophyceae Thalassionema Thalassionema ataceae Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira angulata Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira anguste-lineata Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira anatretica Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira decipiens Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira decipiens Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira gravida Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira gravida Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira pravida Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira levanderi Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira levanderi Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira ninima Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira minima Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira minima Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira minima Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira nordenskioeldii Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira rotula Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira rotula Bacillariophyceae	Surirellaceae	Surirellaceae	Bacillariophyceae
Prymnesiophyceae Tabellaria Tetraselmis Tetraselmis Tetraselmis Tetraselmis Tetraselmis Thalassionema trauenfeldii Bacillariophyceae Thalassionema Thalassionema trauenfeldii Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira Thalassiosira Thalassiosira Thalassiosira Thalassiosira Thalassiosira Thalassiosira Thalassiosira anguste-lineata Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira Thalassiosira decipiens Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira gravida Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira Thalassiosira Thalassiosira thalassiosira levanderi Bacillariophyceae Thalassiosira	Synedra	Synedra	Bacillariophyceae
Tabellaria Tabellaria Bacillariophyceae Tetraselmis Tetraselmis Prasinophyceae Tetraselmis + Tetraselmis Prasinophyceae Thalassionema Thalassionema Bacillariophyceae Thalassionema + Thalassionema + Thalassionema Bacillariophyceae Thalassionema + Thalassionema bacillare Bacillariophyceae Thalassionema Thalassionema bacillare Bacillariophyceae Thalassionema Thalassionema frauenfeldii Bacillariophyceae Thalassionema Thalassionema intzschioides Bacillariophyceae Thalassionema Thalassionema nitzschioides Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira anguste-lineata Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira anguste-lineata Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira decipiens Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira eccentrica Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira gravida Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira hendeyi Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira levanderi Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira levanderi Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira minima Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira minima Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira minima Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira minima Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira nordenskioeldii Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira punctigera Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira rotula Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira rotula Bacillariophyceae	Synedra +	Synedra + Toxarium	Bacillariophyceae
Tetraselmis Tetraselmis Prasinophyceae Tetraselmis + Tetraselmis + Prasinophyceae Thalassionema Thalassionema Bacillariophyceae Thalassionema + Thalassionema Hacillariophyceae Thalassionema + Thalassionema Bacillariophyceae Thalassionema Thalassionema bacillare Bacillariophyceae Thalassionema Thalassionema frauenfeldii Bacillariophyceae Thalassionema Thalassionema frauenfeldii Bacillariophyceae Thalassionema Thalassionema nitzschioides Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira anguste-lineata Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira anguste-lineata Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira anguste-lineata Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira decipiens Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira gravida Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira gravida Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira hendeyi Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira levanderi Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira levanderi Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira minima Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira minima Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira minima Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira mordenskioeldii Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira punctigera Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira rotula Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira rotula Bacillariophyceae	Prymnesiophyceae	Syracosphaera	Prymnesiophyceae
Tetraselmis + Tetraselmis + Prasinocladus Thalassionema Bacillariophyceae Thalassionema + Thalassionema + Thalassionema + Thalassionema + Thalassionema bacillare Thalassionema Thalassionema bacillare Thalassionema Thalassionema frauenfeldii Bacillariophyceae Thalassionema Thalassionema nitzschioides Thalassionema Thalassionema nitzschioides Thalassionema Thalassionema nitzschioides Thalassionema Thalassionema nitzschioides Thalassionema Thalassionema Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira angulata Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira anguste-lineata Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira decipiens Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira decipiens Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira gravida Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira gravida Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira levanderi Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira levanderi Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira levanderi Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira minima Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira nordenskioeldii Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira nordenskioeldii Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira rotula Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira rotula Bacillariophyceae	Tabellaria	Tabellaria	Bacillariophyceae
Thalassionema	Tetraselmis	Tetraselmis	Prasinophyceae
Thalassionema + Thalassionema + Thalassionema + Thalassionema bacillare Thalassionema Thalassionema bacillare Thalassionema Thalassionema bacillare Thalassionema Thalassionema frauenfeldii Thalassionema Thalassionema nitzschioides Thalassionema taceae Thalassionemataceae Thalassiosira Thalassiosira Thalassiosira Thalassiosira Thalassiosira Thalassiosira + Thalassiosira angulata Thalassiosira Thalassiosira anguste-lineata Thalassiosira Thalassiosira antarctica Thalassiosira Thalassiosira decipiens Thalassiosira Thalassiosira eccentrica Thalassiosira Thalassiosira gravida Thalassiosira Thalassiosira thalassiosira hendeyi Thalassiosira Thalassiosira Thalassiosira hendeyi Thalassiosira Thalassiosira levanderi Thalassiosira Thalassiosira minima Thalassiosira Thalassiosira minima Thalassiosira Thalassiosira Thalassiosira punctigera Thalassiosira Thalassiosira rotula Thalassiosira rotula Thalassiosira rotula pacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira rotula Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira rotula Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira rotula Bacillariophyceae	Tetraselmis +	Tetraselmis + Prasinocladus	Prasinophyceae
Thalassionema + Thalassionema bacillare Bacillariophyceae Thalassionema Thalassionema bacillare Bacillariophyceae Thalassionema Thalassionema frauenfeldii Bacillariophyceae Thalassionema Thalassionema nitzschioides Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira angulata Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira antarctica Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira antarctica Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira decipiens Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira eccentrica Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira gravida Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira gravida Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira levanderi Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira levanderi Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira levanderi Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira minima Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira mordenskioeldii Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira punctigera Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira rotula Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira rotula Bacillariophyceae	Thalassionema	Thalassionema	Bacillariophyceae
Thalassionema Thalassionema frauenfeldii Bacillariophyceae Thalassionema Thalassionema nitzschioides Thalassionema taceae Thalassionemataceae Thalassiosira Thalassiosira Thalassiosira Thalassiosira Thalassiosira Thalassiosira Thalassiosira Thalassiosira Thalassiosira angulata Thalassiosira Thalassiosira anguste-lineata Thalassiosira Thalassiosira antarctica Thalassiosira Thalassiosira decipiens Thalassiosira Thalassiosira Thalassiosira gravida Thalassiosira Thalassiosira Thalassiosira Thalassiosira hendeyi Thalassiosira Thalassiosira Thalassiosira levanderi Thalassiosira Thalassiosira Thalassiosira Thalassiosira minima Thalassiosira punctigera Thalassiosira Thalassiosira rotula Bacillariophyceae	Thalassionema +		Bacillariophyceae
Thalassionema Thalassionema nitzschioides Bacillariophyceae Thalassionemataceae Thalassiosira Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira Horosira Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira angulata Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira anguste-lineata Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira antarctica Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira decipiens Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira eccentrica Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira gravida Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira gravida Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira hendeyi Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira levanderi Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira levanderi Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira minima Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira nordenskioeldii Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira punctigera Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira rotula Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira rotula Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira rotula Bacillariophyceae	Thalassionema	Thalassionema bacillare	Bacillariophyceae
Thalassionemataceae Thalassionemataceae Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira Bacillariophyceae Thalassiosira + Thalassiosira angulata Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira anguste-lineata Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira antarctica Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira decipiens Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira decipiens Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira gravida Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira gravida Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira hendeyi Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira levanderi Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira levanderi Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira levanderi Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira minima Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira nordenskioeldii Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira punctigera Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira rotula Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira rotula Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira rotula Bacillariophyceae	Thalassionema	Thalassionema frauenfeldii	Bacillariophyceae
Thalassiosira Thalassiosira Bacillariophyceae Thalassiosira + Thalassiosira Horosira Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira angulata Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira anguste-lineata Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira antarctica Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira decipiens Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira eccentrica Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira gravida Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira hendeyi Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira levanderi Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira levanderi Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira minima Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira nordenskioeldii Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira punctigera Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira rotula Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira rotula Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira rotula Bacillariophyceae	Thalassionema	Thalassionema nitzschioides	Bacillariophyceae
Thalassiosira + Thalassiosira + Porosira Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira angulata Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira anguste-lineata Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira antarctica Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira decipiens Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira eccentrica Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira gravida Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira hendeyi Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira levanderi Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira levanderi + Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira minima Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira mordenskioeldii Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira punctigera Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira rotula Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira rotula Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira rotula Bacillariophyceae	Thalassionemataceae	Thalassionemataceae	Bacillariophyceae
Thalassiosira Thalassiosira angulata Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira anguste-lineata Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira antarctica Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira decipiens Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira eccentrica Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira gravida Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira hendeyi Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira levanderi Bacillariophyceae Thalassiosira + Thalassiosira levanderi + Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira minima Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira nordenskioeldii Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira punctigera Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira rotula Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira rotula Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira rotula Bacillariophyceae	Thalassiosira	Thalassiosira	Bacillariophyceae
Thalassiosira Thalassiosira anguste-lineata Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira antarctica Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira decipiens Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira eccentrica Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira gravida Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira hendeyi Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira levanderi Bacillariophyceae Thalassiosira + Thalassiosira levanderi + Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira minima Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira nordenskioeldii Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira punctigera Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira rotula Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira rotula Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira rotula Bacillariophyceae	Thalassiosira +	Thalassiosira $+$ Porosira	Bacillariophyceae
Thalassiosira Thalassiosira antarctica Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira decipiens Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira eccentrica Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira gravida Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira hendeyi Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira levanderi Bacillariophyceae Thalassiosira + Thalassiosira levanderi + Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira minima Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira nordenskioeldii Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira punctigera Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira rotula Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira rotula Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira rotula Bacillariophyceae	Thalassiosira	Thalassiosira angulata	Bacillariophyceae
Thalassiosira Thalassiosira decipiens Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira eccentrica Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira gravida Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira hendeyi Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira levanderi Bacillariophyceae Thalassiosira + Thalassiosira levanderi + Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira minima Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira nordenskioeldii Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira punctigera Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira rotula Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira rotula Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira rotula Bacillariophyceae	Thalassiosira	Thalassiosira anguste-lineata	Bacillariophyceae
Thalassiosira Thalassiosira eccentrica Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira gravida Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira hendeyi Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira levanderi Bacillariophyceae Thalassiosira + Thalassiosira levanderi + Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira minima Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira nordenskioeldii Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira punctigera Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira rotula Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira rotula Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira rotula Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira rotula Bacillariophyceae	Thalassiosira	Thalassiosira antarctica	Bacillariophyceae
Thalassiosira Thalassiosira gravida Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira hendeyi Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira levanderi Bacillariophyceae Thalassiosira + Thalassiosira levanderi + Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira minima Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira nordenskioeldii Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira punctigera Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira rotula Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira rotula Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira rotula Bacillariophyceae	Thalassiosira	Thalassiosira decipiens	Bacillariophyceae
Thalassiosira Thalassiosira hendeyi Bacillariophyceae Thalassiosira Halassiosira levanderi Bacillariophyceae Thalassiosira Halassiosira levanderi Halassiosira Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira minima Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira nordenskioeldii Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira punctigera Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira rotula Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira rotula Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira rotula Bacillariophyceae	Thalassiosira	Thalassiosira eccentrica	Bacillariophyceae
Thalassiosira Thalassiosira levanderi Bacillariophyceae Thalassiosira + Thalassiosira levanderi + Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira minima Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira nordenskioeldii Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira punctigera Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira rotula Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira rotula Bacillariophyceae Thalassiosira rotula + gravida Bacillariophyceae	Thalassiosira	Thalassiosira gravida	Bacillariophyceae
Thalassiosira + Thalassiosira levanderi + minima Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira minima Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira nordenskioeldii Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira punctigera Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira rotula Bacillariophyceae Thalassiosira + Thalassiosira rotula + gravida Bacillariophyceae	Thalassiosira	Thalassiosira hendeyi	Bacillariophyceae
Thalassiosira + minima Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira minima Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira nordenskioeldii Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira punctigera Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira rotula Bacillariophyceae Thalassiosira + Thalassiosira rotula + gravida Bacillariophyceae	Thalassiosira	Thalassiosira levanderi	Bacillariophyceae
Thalassiosira Thalassiosira nordenskioeldii Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira punctigera Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira rotula Bacillariophyceae Thalassiosira + Thalassiosira rotula + gravida Bacillariophyceae	Thalassiosira +		Bacillariophyceae
Thalassiosira Thalassiosira punctigera Bacillariophyceae Thalassiosira Thalassiosira rotula Bacillariophyceae Thalassiosira + Thalassiosira rotula + gravida Bacillariophyceae	Thalassiosira	Thalassiosira minima	Bacillariophyceae
Thalassiosira Thalassiosira rotula Bacillariophyceae Thalassiosira + Thalassiosira rotula + gravida Bacillariophyceae	Thalassiosira	Thalassiosira nordenskioeldii	Bacillariophyceae
Thalassiosira + Thalassiosira rotula + gravida Bacillariophyceae	Thalassiosira	Thalassiosira punctigera	Bacillariophyceae
· ·	Thalassiosira	Thalassiosira rotula	Bacillariophyceae
Thalassiosira Thalassiosira subtilis Bacillariophyceae	Thalassiosira +	Thalassiosira rotula + gravida	Bacillariophyceae
	Thalassiosira	<u> </u>	- "

Intitulé.Graphe	Libellé.taxon	Classe
Thalassiosiraceae	Thalassiosiraceae	Bacillariophyceae
Thalassiosirales	Thalassiosirales	Bacillariophyceae
Thalassiothrix	Thalassiothrix	Bacillariophyceae
Thecadinium	Thecadinium	Dinophyceae
Ciliophora	Tiarina	Prostomatea
Ciliophora	Tintinnidae	Oligotrichea
Ciliophora	Tintinnina	Oligotrichea
Torodinium	Torodinium	Dinophyceae
Torodinium	Torodinium robustum	Dinophyceae
Dinophysis	tous Dinophysis ronds avec epitheque bien visible	Dinophyceae
Toxarium	Toxarium undulatum	Bacillariophyceae
Trachyneis	Trachyneis	Bacillariophyceae
Triadinium	Triadinium	Dinophyceae
Triceratiaceae	Triceratiaceae	Bacillariophyceae
Triceratium	Triceratium	Bacillariophyceae
Triceratium	Triceratium favus	Bacillariophyceae
Trieres	Trieres	Bacillariophyceae
Trieres	Trieres mobiliensis	Bacillariophyceae
Trieres	Trieres regia	Bacillariophyceae
Trigonium	Trigonium alternans	Bacillariophyceae
Tripos	Tripos	Dinophyceae
Tripos	Tripos falcatus	Dinophyceae
Tripos	Tripos furca	Dinophyceae
Tripos	Tripos fusus	Dinophyceae
Tripos	Tripos horridus	Dinophyceae
Tripos	Tripos limulus	Dinophyceae
Tripos	Tripos lineatus	Dinophyceae
Tripos +	Tripos lineatus $+$ minutus	Dinophyceae
Tripos	Tripos longipes	Dinophyceae
Tripos	Tripos muelleri	Dinophyceae
Tripos	Tripos symmetricus	Dinophyceae
Tripos	Tripos trichoceros	Dinophyceae
Vulcanodinium	Vulcanodinium	Dinophyceae
Vulcanodinium	Vulcanodinium rugosum	Dinophyceae
Warnowia	Warnowia	Dinophyceae
Warnowia +		Dinophyceae
Warnowiaceae	Warnowiaceae	Dinophyceae
	Aulacodiscaceae	Bacillariophyceae

Intitulé.Graphe	Libellé.taxon	Classe			
	Aulacoseiraceae	Bacillariophyceae			
	Ceratocorys armata	Dinophyceae			
	Chaetoceros atlanticus	Bacillariophyceae			
	Chaetoceros brevis	Bacillariophyceae			
	Chaetoceros laciniosus	Bacillariophyceae			
	Chaetoceros mitra	Bacillariophyceae			
	Climacosphenia	Bacillariophyceae			
	Closterium				
	Cystodinium	Dinophyceae			
	Dactyliosolen blavyanus	Bacillariophyceae			
	Dinophysis hastata + odiosa	Dinophyceae			
	Dinophysis odiosa	Dinophyceae			
	Entomoneis alata	Bacillariophyceae			
	Eucampia cornuta	Bacillariophyceae			
	Gyrodinium fusus	Dinophyceae			
	Oxytoxum sphaeroideum	Dinophyceae			
	Peridinium quadridentatum	Dinophyceae			
	Plagiotropis lepidoptera	Bacillariophyceae			
	Podolampas bipes	Dinophyceae			
	Protoperidinium oviforme	Dinophyceae			
	Protoperidinium pellucidum	Dinophyceae			
	Protoperidinium pyriforme	Dinophyceae			
	Pseudo-nitzschia galaxiae	Bacillariophyceae			
	Pyrocystis lunula	Dinophyceae			
	Rhizosolenia calcar-avis	Bacillariophyceae			
	Rhizosolenia striata	Bacillariophyceae			

 \bullet Annexe 3 Tableau de synthèse des limitations potentielles en nutriments pour l'ensemble des radiales en 2024

Tableau 86 – Limitation en nutriments en 2024.

	Jan	Fev	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aou	Sep	Oct	Nov	Dec
Point 1 Dunkerque	P,Si,N	Si,P,N P,Si,N	P,Si,N P,N,Si	P,Si,N P,N,Si N,P,Si	P,Si,N P,N,Si	P,N,Si N,P,Si			N,P,Si	P,Si,N	Si,P,N P,Si,N	P,Si,N
Point 1 Boulogne	P,N,Si	P,Si,N Si,P,N	P,Si,N	Si,P,N	P,Si,N Si,P,N	Si,P,N P,N,Si	N,P,Si	P,N,Si	N,P,Si P,Si,N	P,Si,N Si,P,N	P,Si,N Si,P,N	P,Si,N Si,P,N
SRN Somme mer 2	P,Si,N	' '	P,Si,N	Si,P,N	Si,P,N P,Si,N	Si,P,N Si,N,P	Si,N,P	P,N,Si	P,Si,N	Si,P,N	Si,P,N	Si,P,N
Point 4 SRN Dunkerque	Si,P,N	Si,P,N	Si,P,N P,Si,N	Si,P,N N,Si,P	Si,P,N	P,N,Si N,Si,P	N,P,Si	N,P,Si		Si,N,P	Si,P,N	Si,P,N
Point 3 SRN Dunkerque	P,Si,N	Si,P,N	Si,P,N Si,N,P	Si,N,P	Si,P,N Si,N,P	, ,	N,P,Si	N,P,Si	N,Si,P	Si,P,N	Si,P,N	Si,P,N
Mimer	P,Si,N	P,Si,N	P,Si,N	P,Si,N Si.P.N	Si,P,N	Si,P,N Si,N,P	P,Si,N	P,N,Si	Si,P,N	Si,P,N	P,Si,N	P,Si,N
Bif	P,Si,N	P,Si,N	P,Si,N	P,Si,N	Si,P,N	P,Si,N	P,Si,N	P,N,Si	P,Si,N	P,Si,N	P,Si,N	P,Si,N
Point 3 SRN Boulogne		Si,P,N	P,Si,N	Si,P,N	Si,N,P Si,P,N	P,Si,N N,P,Si	N,Si,P	P,N,Si	N,Si,P	Si,P,N	Si,P,N	Si,P,N
SRN Somme mer 1						, ,:2						
At so	P,Si,N	P,Si,N	P,Si,N	P,Si,N	P,Si,N	Si,P,N P,N,Si	P,N,Si	P,N,Si	P,Si,N	P,Si,N	P,Si,N	P,Si,N
Point 2 SRN Boulogne		Si,P,N	P,Si,N	Si,P,N	Si,N,P	P,N,Si N,P,Si	N,Si,P	P,N,Si	Si,N,P	Si,P,N	Si,P,N	Si,P,N